

فصل اول

بخش حساب

شاگردان عزیز!

قبل از حل سوالات بخش حساب به فورمول ها و روابط مربوط آن توجه فرمایید:

اعداد کسری:

$$1. \quad a + \frac{b}{c} = \frac{ac + b}{c}$$

$$2. \quad a - \frac{b}{c} = \frac{ac - b}{c}$$

$$3. \quad \frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

$$4. \quad \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

$$5. \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$6. \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

نسبت حسابی: نسبت حسابی بین اعداد a و b:

$$a - b$$

نسبت هندسی: نسبت هندسی بین اعداد a و b:

$$\frac{a}{b} \quad \frac{b}{a} \quad \text{یا}$$

اوسط حسابی: در صورتی که n تعداد اعداد باشد پس اوسط حسابی آنها عبارت است از:

$$\frac{a+b+c+\dots}{n}$$

تناسب: مساوی بودن دو نسبت را تناسب می گویند یعنی:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

خواص تناسب: با در نظر داشت تعریف ، خواص تناسب عبارت از:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$1) \quad a \cdot d = b \cdot c$$

$$7) \quad \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$2) \quad \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

$$8) \quad \frac{a}{b+a} = \frac{c}{d+c}$$

$$3) \quad \frac{d}{b} = \frac{c}{a}$$

$$9) \quad \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

$$4) \quad \frac{an}{b} = \frac{cn}{d}, n \neq 0$$

$$10) \quad \frac{a}{b-a} = \frac{c}{d-c}$$

$$5) \quad \frac{a}{bn} = \frac{c}{dn}, n \neq 0$$

$$11) \quad \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

$$6) \quad \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

$$12) \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots = n \Rightarrow \frac{a+c+e+\dots}{b+d+f+\dots} = n$$

قاعده اعداد: اعداد قابل استفاده در حیات روزمره به قاعده (10) می باشد، مثلاً:

$$\begin{aligned} 2347 &= 2000 & + & 300 & + & 40 & + & 7 \\ &= 2 \cdot 10^3 & + & 3 \cdot 10^2 & + & 4 \cdot 10^1 & + & 7 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

فکتوریل: حاصل ضرب اعداد طبیعی از یک الی n فکتوریل نامیده می شود، یعنی:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n$$

ترکیب اعداد: در حالیکه $n, r \in \mathbb{N}$ و $n \geq r$ است پس ترکیب اعداد عبارت است از:

$$C \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

اوسط هندسی: اگر در یک تناسب طرفین یا وسطین مساوی و نامعلوم باشد یعنی $\frac{a}{m} = \frac{m}{b}$ و یا $\frac{m}{a} = \frac{b}{m}$ پس
وسط هندسی آن عبارت از:

$$m = \sqrt{a \cdot b}$$

ربح ساده (بسیط): در صورتیکه S سرمایه، N نرخ (به فیصدی)، M مدت (به سال) و R ربح را نشان دهد،
فورمول ربح ساده عبارت از:

$$N = \frac{R \cdot 100}{S \cdot M}, \quad M = \frac{R \cdot 100}{N \cdot S}, \quad S = \frac{R \cdot 100}{M \cdot N}, \quad R = \frac{S \cdot M \cdot N}{100}$$

ربح مرکب: اگر A سرمایه اولی، P سرمایه بعدی، r نرخ (فیصدی)، n مدت به سال و B مفاد را نشان دهد،
فورمول ربح مرکب عبارت از:

$$P = A(1+r)^n$$

$$B = P - A$$

ست Set: مجموعه از عناصر دقیق را ست می گویند.

عناصر ست: اشیای که شامل یک ست باشد عناصر ست گفته می شوند، مثلاً: $A = \{2, 5, 8\}$ اعداد 2, 5, 8
عناصر ست A گفته می شود که چنین نمایش داده می شود.

$$2 \in A, \quad 5 \in A, \quad 8 \in A$$

ست خالی: ست که هیچ عنصر نداشته باشد ست خالی گفته می شود و به سمبول $\emptyset$ نشان داده می شود.

ست های معادل: ست های که تعداد عناصر شان با هم مساوی باشند، مانند:

$$A = \{1, 2, 8\}, \quad B = \{a, m, d\}$$

ست های مساوی: ست های که دارای عین عناصر باشند، مانند:

$$A = \left\{-3, 2, \frac{5}{3}\right\}, \quad B = \left\{2, 1\frac{2}{3}, -3\right\}$$

ست فرعی: ستی که تمام عناصر آن شامل یک ست دیگر باشد آنرا ست فرعی همان ست دومی می نامند.

مثلاً ست $A = \{a, b, c, d\}$ یک ست فرعی $B = \{\text{تمام حروف انگلیسی}\}$ می باشد و چنین نمایش داده می شود.

$$A \subset B$$

به خاطر داشته باشید که:

$$1. A \subset A$$

$$2. \emptyset \subset A$$

$$3. \text{در حالیکه } n \text{ تعداد عناصر یک ست را نشان دهند، تعداد ست های فرعی آن ست عبارت از: } 2^n$$

اتحاد ست ها: اتحاد چندین ست عبارت از ستی است که عناصر تمام ست های داده شده را دارا باشد.

مثلاً: اگر

$$A = \{2, 5\}, \quad B = \{1, 2, 3\}$$

$$\Rightarrow C = A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$$

به خاطر داشته باشید که:

$$1) A \cup A = A$$

$$2) A \cup \emptyset = A$$

تقاطع ست ها: تقاطع چندین ست عبارت از ستی است که فقط عناصر مشترک ست های داده شده را دارا باشد.

مثلاً:

$$A = \{4, 5, 7\}, \quad B = \{8, 4, 2\}$$

$$\Rightarrow A \cap B = \{4\}$$

به خاطر داشته باشید که:

$$1) A \cap A = A$$

$$2) A \cap \emptyset = \emptyset$$

مکمله یک ست: اگر ست A ست فرعی از ست B باشد مکمله ست A در B عبارت از ستی است که عناصر آن در B باشد اما شامل A نباشد که آنرا به A' و یا C_B^A نمایش می دهند.

مثلاً:

$$A = \{1, 2, 3\} \quad , \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$\Rightarrow A' = C_B^A = \{4, 5, 6, 7\}$$

تفاضل دو ست: دو ست A و B را در نظر می گیریم.

$$A \setminus B = \{\text{عناصر که در } A \text{ باشد و در } B \text{ نباشد}\}$$

$$B \setminus A = \{\text{عناصر که در } B \text{ باشد و در } A \text{ نباشد}\}$$

مثلاً:

$$A = \{1, 2, 5, 8\} \quad , \quad B = \{3, 4, 5, 7, 8\}$$

$$\Rightarrow A \setminus B = \{1, 2\}$$

$$\Rightarrow B \setminus A = \{3, 4, 7\}$$

ست اعداد:

(1) ست اعداد طبیعی:

$$IN = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

(2) ست اعداد کامل:

$$IN' = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

$$\Rightarrow IN \subset IN'$$

(3) ست اعداد تام:

$$I = Z = \{-\infty, \dots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \dots, +\infty\}$$

$$\Rightarrow IN' \subset Z$$

(4) ست اعداد ناطق (نسبتی): ست که تمام عناصر در شکل کسری باشد.

$$Q = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in Z, b \neq 0 \right\}$$

$$\Rightarrow Q = \left\{ \dots, -2.5, -\frac{3}{4}, -1\frac{1}{2}, 7.25, \frac{8}{11}, \dots \right\}$$

(5) ست اعداد غیر ناطق (غیر نسبتی): ست که عناصر آن به کسر تبدیل نگردد یعنی اعداد جذری که جذر کامل نداشته باشند و به Q' نمایش داده می شود.

(6) ست اعداد حقیقی: ستی که عناصر آن شامل تمام اعداد ناطق و غیر ناطق باشد، ست اعداد حقیقی گفته می شود و به IR نمایش داده می شود.

$$IR = Q \cup Q'$$

(7) ست اعداد موهومی: ست که عناصر آن اعداد منفی به حیث جذور به جذر های که دارای جذر نما جفت است، باشد یعنی:

$$Im = \{x_i / x \in IR, i = \sqrt{-1}\} \quad i = \sqrt{-1} \text{ واحد اعداد موهومی}$$

(8) ست اعداد مختلط: ستی که عناصر آن متشکل از اعداد حقیقی و موهومی باشد یعنی:

$$C = \{a \pm bi / a, b \in IR, i = \sqrt{-1}\}$$

سوالات

1. عدد 345 بالای کدام اعداد قابل تقسیم است؟
 (1) 5, 4, 3 (2) 5, 7, 3 (3) 5, 3 (4) 5, 7
2. هرگاه عدد 13^{14} بالای 4 تقسیم گردد باقی مانده آن مساوی است به؟
 (1) 0 (2) 2 (3) 1 (4) 4
3. هرگاه عدد a بالای 15 تقسیم گردد 12 باقی مانده در صورتیکه a بالای 12 پوره قابل تقسیم باشد پس کوچک ترین قیمت a عبارت است از؟
 (1) 48 (2) 68 (3) 72 (4) 132
4. عدد a بالای 12 تقسیم گردد 11 باقی مانده. هرگاه حاصل تقسیم آن 13 باشد. پس a مساوی است از؟
 (1) 134 (2) 145 (3) 156 (4) 167
5. کوچک ترین کسر های 0,002 ، 0,003 ، 0,00025 و 0,00035 عبارت است از؟
 (1) 0,00035 (2) 0,003 (3) 0,002 (4) 0,00025
6. هرگاه عدد a بالای هر یک از اعداد 6 ، 8 ، 12 تقسیم گردد 5 باقی می ماند پس a عبارت است از؟
 (1) 19 (2) 24 (3) 29 (4) 34
7. $2[(18) - (2)^4] \cdot 2[3 - (-5)]^0 + 50 = ?$
 (1) 52 (2) 64 (3) 58 (4) 4
8. $8! = ?$
 (1) 5420 (2) 40320 (3) 720 (4) 40520

9. در یک صندوق مکعبی که حجم آن $1m^3$ است چند عدد صندوقچه مکعبی $10m^3$ در آن جایجا کرده میتوانیم؟

- (1) 100000 (2) 300000 (3) 10000 (4) 200000

10. اوسط حسابی کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترک اعداد 30 , 40 , 60 مساوی است به ؟

- (1) 50 (2) 55 (3) 60 (4) 65

11.
$$\left\{2 - \left[-1 - \left(-\frac{1}{4}\right)\right]\right\} \cdot \{5 - [-1 - (-2)]\} = ?$$

(1) 11 (2) 12 (3) 13 (4) 14

12. در صورتیکه $\frac{a}{b}$ معادل $\frac{5}{11}$ و $a = 15$ باشد، پس قیمت b را دریابید ؟

(1) 11 (2) 22 (3) 33 (4) 44

13. کسرهای $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{8}{13}$ را مقایسه نمایید ؟

(1) $\frac{8}{13} < \frac{7}{12} < \frac{3}{4}$ (2) $\frac{7}{12} < \frac{8}{13} < \frac{3}{4}$

(3) $\frac{7}{12} > \frac{3}{4} > \frac{8}{13}$ (4) $\frac{3}{4} < \frac{7}{12} < \frac{8}{13}$

14. کسر الکسر $\frac{5 - \frac{5}{2} + \frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3}}$ عبارت است از ؟

(1) $\frac{11}{7}$ (2) $-\frac{13}{7}$ (3) $-\frac{17}{7}$ (4) -11

$$\left(2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{1+\frac{1}{2}}\right) : \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{1+\frac{1}{2}}\right) = ? \quad .15$$

$3\frac{1}{2}$ (4) $1\frac{1}{3}$ (3) $1\frac{2}{3}$ (2) $2\frac{1}{3}$ (1)

$$\left(1 - 0,2 : 0,4 + \frac{3}{5}\right) \cdot \frac{1}{0,1} = ? \quad \text{نتیجه افاده} \quad .16$$

-1 (4) 26 (3) $1,1$ (2) $0,11$ (1)

$$\left[\frac{(0,7 - \frac{1}{5}) \times \frac{2}{5}}{3,5 - 1\frac{1}{2}} \right] \div 0,5 = ? \quad \text{قیمت افاده} \quad .17$$

$\frac{1}{10}$ (4) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{1}{5}$ (1)

$$\frac{1}{\frac{0,1}{0,11} + \frac{0,2}{0,22} - \frac{0,4}{0,44}} \quad \text{نتیجه عملیه} \quad \text{عبارت است از ؟} \quad .18$$

-11 (4) $-\frac{11}{10}$ (3) 11 (2) $\frac{11}{10}$ (1)

$$\left(4\frac{2}{5}\right)^{-1} \div \frac{3\frac{1}{2} \div (-7) + 1}{-3 \div (-2\frac{1}{2}) + 1} = ? \quad \text{نتیجه عملیه} \quad \text{عبارت است از ؟} \quad .19$$

0 (4) 3 (3) 1 (2) 2 (1)

$$\frac{-3}{-2 - \frac{-2}{1 - (2^{-1}) + 1}} \div \frac{4}{4 - \frac{4}{4 - \frac{1}{4^{-2}}}} = ? \quad \text{مساوی است به ؟} \quad .20$$

$\frac{34}{35}$ (4) $\frac{37}{39}$ (3) $\frac{39}{32}$ (2) $\frac{32}{39}$ (1)

$$\left(\frac{1 - 1\frac{1}{3}}{1 + 1\frac{1}{3}}\right)^2 \left(\frac{7}{2}\right)^2 = ? \quad \text{نتیجه عملیه} \quad \text{عبارت است از ؟} \quad .21$$

4 (4) 1 (3) $\frac{1}{4}$ (2) $-\frac{1}{4}$ (1)

$$\frac{(2^{-1} - 3^{-1} + 4^{-1})^{-1}}{(5^{-1} - 6^{-1})^{-1}} = ? \quad \text{نتیجه عملیه} \quad \text{عبارت است از ؟} \quad .22$$

72 (4) $\frac{25}{2}$ (3) $\frac{2}{25}$ (2) $\frac{6}{19}$ (1)

23. $\left[2^{-1} + \left(1 + \frac{2}{3^{-1}} \right) \div \frac{2}{\left(\frac{3}{4} \right)^{-1}} - 2 \right]^{-1} = ?$
- (1) $\frac{6}{19}$ (2) $\frac{5}{6}$ (3) $\frac{19}{6}$ (4) $\frac{6}{17}$
24. هرگاه $A = \frac{0,01}{0,2} + \frac{0,02}{0,3} + \frac{0,03}{0,4}$ و $B = \frac{0,19}{0,2} + \frac{0,14}{0,15} + \frac{0,37}{0,4}$ باشد پس قیمت $A + B$ را در یابید؟
- (1) -1 (2) 1 (3) 2 (4) 3
25. عدد $10^4 (5,2)$ عبارت است از؟
- (1) 52000 (2) 5200 (3) 520 (4) 52
- پول جلال چهار برابر پول نسیم است هرگاه نسیم 40 افغانی داشته باشد پس معلوم نمایید که جلال چند افغانی دارد؟
- (1) 120 (2) 140 (3) 160 (4) 180
27. یک موتر راه مزار شریف - کابل را با سرعت $140 \frac{km}{h}$ در ظرف 7 ساعت طی می نماید معلوم نمایید که موتر مذکور این فاصله را با کدام یکی سرعت در ظرف 10 ساعت طی می نماید؟
- (1) $81 \frac{km}{h}$ (2) $84 \frac{km}{h}$ (3) $89 \frac{km}{h}$ (4) $98 \frac{km}{h}$
28. یک فامیل در دو ماه 20000 افغانی مصرف می نماید. حال در یابید که فامیل مذکور در یک سال چند افغانی مصرف خواهد نمود؟
- (1) 120000 (2) 150000 (3) 180000 (4) 200000
29. یک نل یک حوض را در 3 ساعت، نل دومی در 9 ساعت پر میکنند و نل سومی در 6 ساعت عین حوض را خالی میکند هرگاه هر سه نل همزمان باز گردد حوض مذکور در چند ساعت پر خواهد شد؟
- (1) 3,6 (2) 3,2 (3) 1,5 (4) 1,8
30. قرار است که 8000 مسافر توسط یک ریل که دارای 20 واگون است در 10 بار انتقال باید هرگاه بعد از 6 بار و 15 واگون ریل مذکور خراب شود. در یابید که مسافرین باقی مانده ریل مذکور در چند بار انتقال خواهد نمود؟

31. مبلغ 5070 افغانی را به نسبت های 1, 2, 3 عبارت است از ؟
- | | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 18 | (2) 10 | (3) 12 | (4) 16 |
| $\begin{cases} 840 \\ 2540 \\ 1690 \end{cases}$ | $\begin{cases} 2535 \\ 1690 \\ 845 \end{cases}$ | $\begin{cases} 1680 \\ 855 \\ 2535 \end{cases}$ | $\begin{cases} 2605 \\ 1620 \\ 855 \end{cases}$ |
| (1) 3, 6 | (2) 30, 60 | (3) 300, 600 | (4) 3000, 6000 |
32. 9000 به نسبت های 6, 3 عبارت است از ؟
33. احمد $24m$ تکه را به قیمت 720 خریده است پس با قیمت 1020 افغانی چند متر تکه را خریده میتواند ؟
- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (1) 28 | (2) 32 | (3) 34 | (4) 38 |
|--------|--------|--------|--------|
34. حمید روزانه که 5 ساعت درس میخواند در یک هفته 2800 سوال ریاضی را حل مینماید اگر روزانه 7 ساعت سوال حل نماید 2800 سوال را در چند روز حل خواهد نمود ؟
- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| (1) 3 | (2) 4 | (3) 5 | (4) 6 |
|-------|-------|-------|-------|
35. قرار است که 8000 مسافر توسط یک ریل که دارای 20 واگون است در 10 بار انتقال باید هرگاه بعد از 6 بار و 15 واگون ریل مذکور خراب شود . در یابید که مسافرین باقی مانده ریل مذکور در چند بار انتقال خواهد نمود ؟
- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (1) 18 | (2) 10 | (3) 12 | (4) 16 |
|--------|--------|--------|--------|
36. در سرمایه 2000000 افغانی محمود 30% سهم دارد مقدار سرمایه محمود مساوی است به ؟
- | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|
| (1) 600 | (2) 6000 | (3) 60000 | (4) 600000 |
|---------|----------|-----------|------------|
37. هرگاه 5 نل هم قطر در جریان 4 روز یک حوض را پر نموده بتوانند 4 نل مشابه حوض مذکور را در چند روز پر خواهد نمود ؟
- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| (1) 6 | (2) 5 | (3) 4 | (4) 3 |
|-------|-------|-------|-------|

38. اگر وزن 20 کارتن صابون 300 کیلو گرام باشد پس وزن چند کارتن صابون 120 کیلو گرام است ؟

- (1) 9 (2) 8 (3) 10 (4) 7

39. اگر 25% یک عدد 80 باشد، خود عدد چند است ؟

- (1) 320 (2) 640 (3) 860 (4) 1280

40. قیمت فروش یک جنس با 35% فایده 2700 افغانی میباشد ، پس قیمت خرید جنس چند افغانی است ؟

- (1) 1500 (2) 2000 (3) 2350 (4) 2500

41. $\frac{3}{7}$ حصه یک عدد 6 است پس $\frac{5}{14}$ حصه عدد مذکور را معلوم نمایید ؟

- (1) 28 (2) 10 (3) 14 (4) 5

42. تاجری با 60% تخفیف یک جنس را بالای مشتری خود به مبلغ 140 افغانی به فروش می رساند پس قیمت اصلی جنس مساوی است به ؟

- (1) 1500 (2) 1200 (3) 150 (4) 120

43. محصول گمرگی یک جنسی از قرار 10% مساوی به 50 افغانی است قیمت جنس به افغانی عبارت است از ؟

- (1) 500 (2) 250 (3) 550 (4) 100

44. شخصی یک جنس را که 5300 افغانی قیمت دارد بعد از تخفیف به 4985 افغانی خریداری کرد ، خریدار جنس مذکور را به چند فیصد تخفیف خریده است ؟

- (1) 17% (2) 13% (3) 6% (4) 7%

45. مفاد مبلغ 2000 \$ به نرخ 12% در مدت دو سال عبارت است از ؟

- (1) 420 (2) 360 (3) 530 (4) 480

46. هرگاه مبلغ 10000 افغانی به نرخ 10% به ربح مرکب گذاشته شود، در چند سال مبلغ 3310 افغانی مفاد میکند؟
 (1) 1 سال (2) 3 سال (3) 4 سال (4) 3 سال
47. تقاطع ست های $A = \{M, N, P, T, S\}$ و $B = \{O, P, N, T, S\}$ مساوی است به ؟
 (1) $\{N, P, T, S\}$ (2) $\{N, P, T\}$
 (3) $\{M, P, T\}$ (4) $\{N, P, T, S, T\}$
48. اگر 25% یک عدد 80 باشد، خود عدد چند است ؟
 (1) 320 (2) 640 (3) 860 (4) 1280
49. $\frac{3}{7}$ حصه یک عدد 6 است پس $\frac{5}{14}$ حصه عدد مذکور را معلوم نمایید ؟
 (1) 28 (2) 10 (3) 14 (4) 5
50. تعداد داخله یک صنف درسی 20 نفر است که 4 نفر آن غیر حاضر است فیصدی شاگردان حاضر در صنف مساوی است به ؟
 (1) 90% (2) 80% (3) 70% (4) 60%
51. جنسی به ارزش 5800 افغانی با 15% تخفیف به فروش می رسد پس قیمت خرید عبارت است از ؟
 (1) 5050 (2) 4700 (3) 4930 (4) 48100
52. جنس به ارزش 2700 افغانی به تخفیف 10% به فروش می رسد قیمت فروش عبارت است از ؟
 (1) 1500 (2) 2430 (3) 6000 (4) 9000
53. جنسی به ارزش 3240 افغانی به تخفیف 15% به فروش می رسد قیمت فروش را معلوم نمایید ؟
 (1) 3000 (2) 2907 (3) 2917 (4) 2927
54. اگر ست های $A = \{1, 3, x\}$ و $B = \{1, 2, 3, x\}$ باهم مساوی باشند x چند است ؟
 (1) 2 (2) 3 (3) 2 (4) $\emptyset$

55. نظر به ست های $A = \{1,2,3,4,6\}$ ، $B = \{1,3,4,6\}$ و $(A \cap B) \cup C = \{8,4,6\}$ عبارت است از ؟

- (1) $\{1,3,4,6\}$ (2) $\{1,3,4,6,8\}$ (3) $\{1,3,4,5,6,8\}$ (4) $\{4,6\}$

56. اگر $A = \{1,3,5,7\}$ و $B = \{2,4,6\}$ باشد $(A \cup B)/(A \cap B) = ?$

(1) $\{2,4,6\}$ (2) $\{1,3,5,7\}$ (3) $\{1,3,5,6\}$ (4) $\{1,2,3,4,5,6,7\}$

57. سرمایه 2500 دالر در مدت سه سال از قرار نرخ 20% به ربح مرکب چند می گردد:

- (1) 3140 (2) 4320 (3) 4130 (4) 3870

58. ست ارقام عدد "3400803" عبارت است از:

- (1) $\{4,3,8\}$ (2) $\{8,4,3,0\}$ (3) $\{3,4,0,0,0,8,3\}$ (4) $\{0,3,6\}$

59. نظر به ست $A = \{1,2,3,4,5\}$ کدام یکی از جوابات ذیل صحت دارد؟

- (1) $1 \subset A$ (2) $2 \subseteq A$ (3) $3 \notin A$ (4) $4 \in A$

60. اگر $A = \{1,2,\dots,10\}$ و $B = \{2,3,5,7,9\}$ باشد پس مکمله ست B نظر به A یعنی B' عبارت از:

- (1) ست A (2) $\{1,2,3,4,5,7,9\}$

- (3) $\{3,4,5,6,7,8,9\}$ (4) $\{1,4,6,8,10\}$

61. تقاطع ست های $A = \{1,15,7,9\}$ و $B = \{0,3,9,2\}$ عبارت از:

- (1) $\{1,15\}$ (2) $\{1,2\}$ (3) $\{2,9\}$ (4) $\{9\}$

62. اگر $A = \{0,1,2,3,4\}$ ، $B = \{0,2,4,6,8\}$ و $C = \{1,5,6,7\}$ سه ست باشند تعداد عناصر

اتحاد آنها $n(A \cup B \cup C) = ?$ عبارت است از:

- (1) 5 (2) 6 (3) 9 (4) 14

63. ست تقاطع ست های $A = \{a, b, c, (a), (a, b)\}$ و $B = \{a, (a, c), (b), (a, b)\}$ عبارت است از:

- (1) $A \cap B = \{a, (a, c)\}$ (2) $A \cap B = \{a, (a, b)\}$

- (3) $A \cap B = \{a, (c, b)\}$ (4) $A \cap B = \{a, b, c\}$

64. اگر $A = \{a, b, c, d\}$, $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$ و $A - B = \{a, b\}$ باشد در این صورت ست $B - (A \cap B)$ عبارت از:

- (1) $\{c, d\}$ (2) $\{e, f\}$ (3) $\{c, d, e, f\}$ (4) $\emptyset$

65. تعداد ست های فرعی ست $\{1, 2, \{1\}, \{1, 2\}, \{2\}\}$ عبارت است از:

- (1) 16 (2) 32 (3) 64 (4) 128

66. برای $A = \{2, 4, 6\}$ و $B = \{3, 4, 5, 7\}$ کدام یکی از جوابات ذیل صحت دارد؟

- (1) $A \setminus B = \{2, 3\}$ (2) $A \setminus B = \{2, 5\}$
(3) $A \setminus B = \{2, 6\}$ (4) $A \setminus B = \{3, 5, 7\}$

67. اگر $A = \{x / x < 8, x \in k\}$ در این صورت $n(A) = ?$

- (1) 8 (2) 7 (3) 9 (4) ∞

68. اگر $B = \{0, 1, (1), \phi, (1, 0)\}$ باشد پس تعداد عناصر ست B عبارت است از:

- (1) 4 (2) 3 (3) 5 (4) 6

69. اگر $A = \{a, b, c, d, e\}$ و $B = \{b, d, f, g\}$ باشد قیمت $B - A = ?$ عبارت است از:

- (1) $\{a, c, e\}$ (2) $\{a, b, g\}$ (3) $\{b, d\}$ (4) $\{f, g\}$

فصل دوم

افاده های الجبری

طاقت: هرگاه یک عدد یا حد مانند a, n مراتبه در خودش ضرب گردد در شکل طاق چنین تعریف گردیده است.

$$a \cdot a \cdot a \cdots a = a^n$$

a به نام قاعده و n به نام نما (طاقت نما) یاد می گردد.

قوانین طاقت:

$$1) \quad a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$5) \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$2) \quad a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

$$6) \quad a^0 = 1$$

$$3) \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$7) \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$4) \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$8) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

پولینوم الجبری: آن افاده یک یا چندین حده الجبری که حروف آن دارای طاقت نما های اعداد کامل باشد

پولینوم الجبری نامیده می شود.

مانند:

$$x^3 - 2x + 4, 2x^2 + x - 2, x - 1, \dots\dots\dots$$

پولینوم کامل: پولینومی که تمام طاقت نما های حدود آن از بالا تا پایین موجود باشد.

مانند:

$$x^4 + 5x^3 - x^2 + x, x^3 + 5x^2 - x + 4, \dots\dots\dots$$

پولینوم ناقص: پولینوم که بعضی از طاقت نما های حدود آن موجود نباشد.

مانند:

$$2x^5 + x^3 + 3x^2 - 5$$

پولینوم منظم و غیر منظم: پولینوم که طاقت نما حروف آن از زیاد به طرف کم (نزولی) و یا از کم به طرف زیاد (صعودی) ترتیب شده باشد منظم و در غیر آن غیر منظم نامیده می شود.

مثلاً:

منظم نزولی $2y^3 - 3y^2 + 4y - 1$

منظم صعودی $2 - z + z^2 - 2z^3 + 5z^4$

غیر منظم $8x^4 - x + 5 + 2x^3 + x^2$

پولینوم های معادل: پولینوم های که عین متحول داشته و حدود مشابه آن دارای ضریب های مساوی باشند.

مانند:

$$h(y+1)^2 + p(y+1) + m, 2y^2 - 3y + 5, 2y^2 - 3y + 5$$

انواع پولینوم ها: پولینوم یک حده یا مونوم، دو حده یا بینوم و سه حده یا ترینوم از جمله انواع پولینوم ها گفته می شوند. مانند:

مونوم $mb + n$ ، بینوم $5x^3 + 3x - 1$ ، ترینوم $5x$

به خاطر داشته باشید که افاده الجبری مانند $\sqrt{3x} - \frac{2}{y} + 5$ را مولتی نوم می نامند.

درجه پولینوم: بلند ترین طاقت نما حرف یک پولینوم درجه پولینوم نامیده می شود. مانند:

$$5x^3 - 2x^2 + x + 1 \text{ پولینوم درجه سوم}$$

و پولینوم $a^5 + 3a^2b^6 - 8b^{11}$ از جنس a درجه 5 از جنس b درجه 11 و از جنس ab درجه $(2+6)=8$ نامیده می شود.

پولینوم ثابت: پولینوم که درجه آن صفر باشد یا ضرایب حدود آن صفر باشد پولینوم ثابت نامیده می شود. مثلاً m را دریابید در صورت که $(5m-15)x^2 + 7$ یک پولینوم ثابت باشد.

$$5m - 15 = 0 \Rightarrow 5m = 15 \Rightarrow m = 3$$

پولینوم صفری: پولینوم که حد ثابت آن صفر باشد. مانند: $P(x) = 0$ ، و پولینوم صفری درجه ندارد.

پولینوم متجانس: پولینوم که توان های تمام حدود آن با هم مساوی باشد، مانند:

$$5m^2 - 6n^2 + p^2$$

قیمت یک پولینوم: هرگاه به عوض متحول در یک پولینوم یک عدد حقیقی وضع گردد و یک عدد حقیقی به دست آید، همین عدد به دست آمده قیمت پولینوم گفته می شود. مثلاً:

$$P(x) = x^3 - 5x^2 + 4$$

$$x = 2$$

$$P(2) = (2)^3 - 5(2)^2 + 4 = 8 - 20 + 4 = -8$$

مطابقت ها: مساوات افاده های الجبری که بنابر تمام قیمت های متحول مربوط با هم مساوی باشند مطابقت گفته می شود.

برای $n=1,2,3,\dots$

$$1- \quad (x \pm y)^n = x^n \pm nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}y^2 \pm \frac{n(n-1)(n-2)}{3}x^{n-3}y^3 + \dots + y^n$$

- $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
- $(x+y+z+\dots)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + \dots + 2(xy+xz+yz+\dots)$

برای $n=1,2,3,\dots$

$$2- \quad x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + y^{n-1})$$

برای $n=2,4,6,\dots$ (اعداد جفت)

$$3- \quad x^n - y^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots - y^{n-1})$$

- $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$
- $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$
- $x^4 - y^4 = (x-y)(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)$
- $x^4 - y^4 = (x+y)(x^3 - x^2y + xy^2 - y^3)$
- $x^5 - y^5 = (x-y)(x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4)$

برای $n=1,3,5,7,\dots$ (اعداد طاق)

$$4- \quad x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + y^{n-1})$$

- $x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2)$
- $x^5 + y^5 = (x+y)(x^4 - x^3y + x^2y^2 - xy^3 + y^4)$
- $x^7 + y^7 = (x+y)(x^6 - x^5y + x^4y^2 - x^3y^3 + x^2y^4 - xy^5 + y^6)$

برای $n = 2, 4, 6, \dots$ (اعداد جفت)

$$5 - \quad x^n + y^n = \left[x^{\frac{n}{2}} + y^{\frac{n}{2}} + \sqrt{2(xy)^{\frac{n}{2}}} \right] \left[x^{\frac{n}{2}} + y^{\frac{n}{2}} - \sqrt{2(xy)^{\frac{n}{2}}} \right]$$

- $x^2 + y^2 = (x + y + \sqrt{2xy})(x + y - \sqrt{2xy})$
- $x^4 + y^4 = (x^2 + y^2 + \sqrt{2xy})(x^2 + y^2 - \sqrt{2xy})$

$$6 - \quad (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

$$(a - b)^2 - (a + b)^2 = -4ab$$

$$7 - \quad (a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$(a - b)^2 + (a + b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

تجزیه افاده های الجبری: عبارت از دریافت عوامل ضربی یک افاده الجبری می باشد که قرار ذیل اند:

تجزیه نوع اول:

$$ax + ay = a(x + y)$$

تجزیه نوع دوم:

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

تجزیه نوع سوم:

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$$

$$= (x + y)(x + y)$$

$$x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$$

$$= (x - y)(x - y)$$

تجزیه نوع چهارم:

$$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$$

تجزیه نوع پنجم:

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$x^2 - (a + b)x + ab = (x - a)(x - b) \text{ ویا}$$

$$x^2 + (a-b)x - ab = (x+a)(x-b) \text{ ویا}$$

$$x^2 + (b-a)x - ab = (x-a)(x+b) \text{ ویا}$$

تجزیه نوع ششم:

$$ax^2 + bx + c = \left(x - \frac{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left(x - \frac{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)$$

جذور: هرگاه يك طاقت به نما كسری قرار داشته در شكل افاده جذری چنین تعریف گردیده است.

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

قوانین جذور:

$$1) \quad \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$5) \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$2) \quad \sqrt[n]{a^p} \cdot \sqrt[n]{a^q} = \sqrt[n]{a^{p+q}}$$

$$6) \quad \frac{\sqrt[n]{a^p}}{\sqrt[n]{a^q}} = \sqrt[n]{a^{p-q}}$$

$$3) \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a^p}} = \sqrt[n \cdot m]{a^p}$$

$$7) \quad \frac{\sqrt[n]{a^p}}{\sqrt[m]{a^q}} = \sqrt[n \cdot m]{a^{pm - qn}}$$

$$4) \quad \sqrt[n]{a^p} \cdot \sqrt[m]{a^q} = \sqrt[n \cdot m]{a^{pm + qn}}$$

$$8) \quad \sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

سوالات

1. هرگاه $P(x)$ یک پولینوم باشد و
 $P(x) = ax^6 + (a - b + 3)x^{-3} + (a + b - 9)x^{-2} + bx$ داده شده باشد پولینوم
 $P(x)$ عبارت است از:
 $2x^6 + 5x$ (4) $5x^6 + 4x$ (3) $3x^6 + 6x$ (2) $2x^6 + 3x$ (1)
2. در پولینوم $P(x) = 3x^{n-2} + 5x^{2-n} + 9x$ قیمت $p(3)$ عبارت است از:
 37 (4) 35 (3) 32 (2) 30 (1)
3. هرگاه $n \in Z^+$ و پولینوم $p(x) = 5(x - 2)^{2n} - 7(2 - x)^{2n-1}$ باشد قیمت $p(1)$ عبارت
از:
 1 (4) 0 (3) -1 (2) -2 (1)
4. هرگاه $P(x) = 3x^2 + 5x^3 - 4x$ و $Q(x) = 4x^2 + x^3 - 3x$ در این صورت $P(x) + Q(x)$
عبارت است از:
 4 (4) 3 (3) 6 (2) 5 (1)
5. هرگاه پولینوم $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ تقسیم $(x + 1)^2$ گردد باقیمانده آن عبارت از:
 $10x + 6$ (4) $8x + 3$ (3) $10x + 3$ (2) $6x + 5$ (1)
6. مجموعه ضرایب پولینوم $A = (3x - 1)^6 + (4x - 3)^{200}$ مساوی است به:
 4 (4) 67 (3) 66 (2) 65 (1)
7. اگر $p(x) = Q(x)(x - a) + R(x)$ و $R(x) = 0$ باشد، پس برای جواب ذیل درست است:
 $p(a) = Q(a)$ (2) $p(a) = Q(a) + a$ (1)
(3) عامل ضربی $p(x)$ است (4) عامل ضربی $p(x)$ نیست

8.

اگر پولىنوم $p(x) = 4x^2 - 7x$ بالای پولىنوم $x - 2$ تقسیم شود، باقی مانده آن مساوی است به:

$$(1) 4 \quad (2) 2 \quad (3) -2 \quad (4) -4$$

9. هرگاه حدود $25x^{2n}y^{20}z^m$ و $\frac{1}{10}x^{10}y^{2m}z^{10}$ مشابه باشند، درینصورت مقادیر m و n عبارت

است از:

$$(1) \begin{cases} m = 10 \\ n = -5 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} m = -5 \\ n = -10 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} m = 5 \\ n = 10 \end{cases} \quad (4) \begin{cases} m = 10 \\ n = 5 \end{cases}$$

10. باقیمانده $\frac{x^4 + 12x^2 + 8x + 20}{x - 2}$ مساوی است به:

$$(1) -100 \quad (2) 100 \quad (3) 200 \quad (4) -200$$

11. اگر $(x + 10)$ یک فکتور پولىنوم $p(x)$ باشد، پس:

$$\begin{array}{ll} (1) p(-10) \neq 1 & (2) p(-10) \neq 1 \\ (3) p(-10) = -1 & (4) p(-10) = 0 \end{array}$$

12. اگر افاده $y^3 - 4y^2 + ky + 24$ بالای $(y - 2)$ تقسیم شود، و باقی مانده آن 8 باشد، پس قیمت

k مساوی است به:

$$(1) -6 \quad (2) -4 \quad (3) 4 \quad (4) 6$$

13. اگر عرض مستطیل $(n - 3)$ و طول آن $(n + 2)$ باشد، پس مساحت آن مساوی است به:

$$(1) n^2 + n - 6 \quad (2) n^2 + n + 6 \quad (3) n^2 - n + 6 \quad (4) n^2 - n - 6$$

14. اگر $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ و $g(-1) = 3$ ، $g(1) = 4$ باشد، قیمت های a و b

مساوی است به:

$$(1) \begin{cases} a = -1 \\ b = -1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} a = -1 \\ b = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (3) \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (4) \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

15. اگر $(x - 10)$ یک فکتور پولىنوم $p(x)$ باشد، پس کدام یک از روابط زیر درست است:

$$(1) p(-10) = 0 \quad (2) p(10) = 0 \quad (3) p(-10) = 1 \quad (4) p(1-) \neq 0$$

16. به کدام قیمت k پولینوم $A = 2x^3 - kx^2 + 4$ با پولینوم $B = 2x^3 + 4x^2 + 4$ مساوی است:

$k = 4$ (1) $k = -4$ (2) $k = 2$ (3) $k = -2$ (4)

17. در پولینوم $p(x) = 10x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 10$ قیمت a_3 مساوی است به:

صفر (1) 4 (2) 2 (3) 10 (4)

18. اگر $p(x) = Q(x)(x - a)$ و $p(x) = 0$ باشد، در اینصورت $(x - a)$:

(1) عامل ضربی $P(x)$ نیست $p(a) = Q(a) + a$ (2)
(3) $p(a) = Q(a) - a$ (4) عامل ضربی $p(x)$ است

19. اگر پولینوم $p(x) = (x + 1)^{100}$ بالای دو حده $x + 1$ تقسیم شود، باقیمانده آن برابر است به:

10 (1) 1 (2) 100 (3) 0 (4)

20. اگر $(x + 5)$ یک فکتور پولینوم $P(x) = x^3 + kx + 125$ باشد، پس قیمت k عبارت است از:

$k = 2$ (1) $k = -1$ (2) $k = 0$ (3) $k = -2$ (4)

21.

افاده الجبری $\frac{a^{n+2} - a^{2-n}}{a^{n+3} - a^{3-n}} = ?$ عبارت است از:

a^{-n} (1) a^n (2) a^{2n-1} (3) $\frac{1}{a}$ (4)

22.

حاصل افاده $\frac{0.000125 \cdot 10^{47} - 0.61 \cdot 10^{43}}{1.5 \cdot 10^{42} - 0.7 \cdot 10^{42}} = ?$ عبارت است از:

64 (1) 32 (2) 16 (3) 8 (4)

23. مجموعه ضرایب پولینوم $p(x) = (x - 3)^5 + 6(4 - x)^3 + 7x$ مساوی است به:

137 (1) 135 (2) 125 (3) 127 (4)

24. اگر P یک عدد طبیعی باشد درجه پولینوم $A = 4x^{p-1} + 2x^{2p+4} - 5x^{p+1}$ مساوی است به:

$p + 1$ (1) $2p + 4$ (2) $p - 1$ (3) $2p$ (4)

25. در پولینوم $p(x) = 10x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 10$ قیمت a_3 مساوی است به:

- (1) 10 (2) 4 (3) صفر (4) 2

26. اگر $A = 4x^m y^4 - 6x^{n-1} y^4 + y^8$ یک پولینوم متجانس باشد، قیمت های m و n مساوی است به:

- (1) $\begin{cases} m=6 \\ n=2 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} m=4 \\ n=4 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} m=5 \\ n=4 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} m=4 \\ n=5 \end{cases}$

27. حاصل ضرب $\left(\frac{a^p}{a^{-q}}\right)^{p-q} \cdot \left(\frac{a^q}{a^{-r}}\right)^{q-r} \cdot \left(\frac{a^r}{a^{-p}}\right)^{r-p}$ مساوی است به:

- (1) 1 (2) -1 (3) صفر (4) هر سه جواب درست است

28. اگر $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-100)$ باشد قیمت $f(0)$ عبارت از:

- (1) 99! (2) 100! (3) -(100!) (4) -(99!)

29. اگر $(x^3 - 4x^2 + 3x)(x^2 - 5x + 1) = \dots + ax^4 + \dots$ باشد قیمت $a = ?$ عبارت است از:

- (1) -10 (2) -8 (3) -9 (4) -7

30. $P(x-2) = x^2 + x - 6$ باشد قیمت $P(x+2) = ?$ عبارت است از:

- (1) $x^2 + 7x + 7$ (2) $x^2 + 9x + 14$ (3) $x^2 - 9x - 14$ (4) $x^2 + x - 2$

31. اگر $P(x-3) = 2(x-3)^6 - 2x^2 + 6x - 28$ انگاه مجموع ضرایب ضرایب پولینوم $P(x)$ عبارت است از:

- (1) -34 (2) -32 (3) -16 (4) 16

32. اگر $f(x) = 2^{3x}$ باشد در این صورت $f(x+3) = ?$ عبارت از:
- (1) $2^9 f(x)$ (2) $2^3 f(x)$ (3) $-2^3 f(x)$ (4) $-2^9 f(x)$
33. هرگاه $P(2-3x) = -2x^7 + 5x^3 + 2x^2 + 8$ باشد، قیمت $P(5) = ?$ عبارت است از:
- (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 7
34. اگر $Q(5x) = 125x^2 - 12$ باشد باقیمانده تقسیم $Q(x)$ بر $x - 3$ عبارت است از:
- (1) 36 (2) 33 (3) 30 (4) 27
35. اگر پولینوم $P(x) = x^{16} - 2 \cdot x^{11} + 6x^6 + 3$ بالای پولینوم $x^5 + 2$ تقسیم گردد باقیمانده عبارت است از:
- (1) $21x + 18$ (2) $-17x + 21$ (3) $4x + 9$ (4) $-28x + 3$
36. هرگاه $a = 20, b = 10, c = 15$ باشد، قیمت $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc = ?$ عبارت است از:
- (1) 225 (2) 25 (3) 125 (4) 75
37. اگر $x - \frac{1}{x} = 3$ باشد قیمت $x^2 + \frac{1}{x^2}$ عبارت از:
- (1) 10 (2) 11 (3) 12 (4) 13
38. هرگاه $a + \frac{1}{a} = 3\sqrt{2}$ باشد، قیمت $a^2 + \frac{1}{a^2} = ?$ عبارت است از:
- (1) 9 (2) 12 (3) 16 (4) 24
39. اگر $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ باشد، قیمت $x + \frac{1}{x} = ?$ عبارت است از:
- (1) $\sqrt{7}$ (2) $\sqrt{6}$ (3) $2\sqrt{6}$ (4) $2\sqrt{7}$

40. هرگاه $x = 3\sqrt[3]{2} + 1$ باشد، قیمت $x^3 - 3x^2 + 3x = ?$ عبارت است از:

- (1) 27 (2) 47 (3) 55 (4) 65

41. افاده $\frac{(4y-24)^3 + (2y-12)^3}{(y-6)^3}$ مساوی است به:

- (1) $\frac{72}{y-6}$ (2) -72 (3) $72(y-6)^0$ (4) $72(y-6)$

42. تجزیه افاده $a^4 + a^2b^2 + b^4$ عبارت است از:

- (1) $(a^2 - b^2 + ab)(a^2 + b^2 + ab)$
 (2) $(a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$
 (3) $(a^2 - b^2 + ab)(a^2 - b^2 - ab)$
 (4) $(a^2 + b^2 - ab)(a^2 - b^2 - ab)$

43. در انکشاف بینوم ذیل $(x+5)^6 = \dots + Ax^4$ قیمت A عبارت است از:

- (1) 125 (2) 250 (3) 350 (4) 375

44. هرگاه $A = a^3 + b^3$ و $B = a^3 - b^3$ باشد، درینصورت $A + B$ مساوی است به:

- (1) $-2b^3$ (2) $2a^3$ (3) $2b^3$ (4) $-2a^3$

45. حاصل ضرب $(x+y)(x^3 - x^2y + xy^2 - y^3)$ مساوی است به:

- (1) $(x+y)^4$ (2) $(x-y)^4$ (3) $x^4 + y^4$ (4) $x^4 - y^4$

46. هرگاه $P(x) = x^3 + 8x^2 + 12x + 6$ و $Q(x) = 4x^2 + x - 4$ باشد، پس $P(x) +$

$Q(1)$ مساوی است به:

- (1) $x^3 + 8x^2 + 2x$ (2) $x^3 + 8x^2 + 12x + 7$
 (3) $24x^3 + 8x + 7$ (4) $x^2 + 8x + 7$

47. حاصل ضرب $(x-y)(x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4)$ مساوی است به:

- (1) $x^3 - y^3$ (2) $x^5 + y^5$ (3) $x^5 - y^5$ (4) $(x-y)^5$

48. اگر $x + y = 5$ و $x \cdot y = 6$ باشد، پس $x^3 + y^3$ مساوی است به:

- 35 (1) -35 (2) -19 (3) 20 (4)

49. تجزیه افاده $a^4 + a^2b^2 + b^4$ عبارت است از:

$$(1) (a^2 - b^2 + ab)(a^2 + b^2 + ab)$$

$$(2) (a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$$

$$(3) (a^2 - b^2 + ab)(a^2 - b^2 - ab)$$

$$(4) (a^2 + b^2 - ab)(a^2 - b^2 - ab)$$

50. انکشاف بینوم $(a + b)^2$ به کمک $\binom{n}{k}$ عبارت است از:

$$(1) (a + b)^2 = \binom{2}{2}a^2 + \binom{2}{0}ab + \binom{2}{1}b^2$$

$$(2) (a + b)^2 = \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2$$

$$(3) (a + b)^2 = \binom{2}{3}a^2 + \binom{2}{2}ab + \binom{2}{0}b^2$$

$$(4) (a + b)^2 = \binom{2}{0}a^2 - \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2$$

51. اگر $a + b = 9$ و $a - b = 15$ باشد پس قیمت $a^2 + b^2$ مساوی است به:

- 151 (1) 152 (2) 153 (3) 154 (4)

52. افاده $\frac{(4y-24)^3 + (2y-12)^3}{(y-6)^3}$ مساوی است به:

- $\frac{72}{y-6}$ (1) -72 (2) $72(y-6)^0$ (3) $72(y-6)$ (4)

53. $\frac{2x^3}{x^2-1} \div \frac{x^3}{x-1}$ مساوی است به:

- $\frac{2}{x^2-1}$ (1) $\frac{2}{x+1}$ (2) $\frac{1}{x^3}$ (3) $\frac{2}{x-1}$ (4)

54. حاصل $(a^5 + b^5) \div (a + b)$ مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} a^4 + b^4 + a^2b^2 & (1) \\ a^4 + b^4 + a^2b^2 & (2) \\ a^4 + b^4 + a^2b^2 & (3) \\ a^4 + b^4 + a^2b^2 & (4) \end{array}$$

55. جذور حقیقی پولینوم $f(x) = x + 4x^2 + 4$ مساوی است به:

$$\begin{array}{lll} \sqrt{2} & (1) \text{ جذور حقیقی ندارد} & \pm\sqrt{2} \quad (3) \\ -\sqrt{2} & (4) & \end{array}$$

56. خارج قسمت $\frac{6+\sqrt{-36}}{3+\sqrt{-9}}$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} 1 & (1) & 2 & (2) \\ 3i & (3) & -2 & (4) \end{array}$$

57. معکوس ضربی $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}i$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} \frac{15}{6} - \frac{15}{6}i & (1) & \frac{1}{5}i - \frac{1}{5} & (2) \\ 5 - 5i & (3) & 5i - 5 & (4) \end{array}$$

58. اگر $z_1 = 2 + 3x$ و $z_2 = 4 + 5x$ باشد، پس رابطه ذیل درست میباشد:

$$\begin{array}{ll} |z_1| = |z_2| & (1) \\ z_1 + z_2 = z_2 - z_1 & (2) \\ z_1 - z_2 = z_2 - z_1 & (3) \\ z_1 = 2z_2 & (4) \end{array}$$

59. اگر $z = x + yi$ باشد، قیمت $|z - 2|$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} y^2 & (1) & \sqrt{x^2 + y^2} & (2) \\ x & (3) & \sqrt{(x-2)^2 + y^2} & (4) \end{array}$$

60. هرگاه $z = 3 - 3i$ باشد در این صورت $\bar{z}$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} 3 + 3i & (1) & -3 + 3 & (2) \\ -3 - 3i & (3) & 3 - 3i & (4) \end{array}$$

61. اگر $z = 5 - i$ پس قیمت $|\bar{z}|$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} \sqrt{25} & (1) & \sqrt{26} & (2) \\ -\sqrt{25} & (3) & -\sqrt{26} & (4) \end{array}$$

62. هرگاه $z_1 = 2 - (m+3)i$ و $z_2 = 2n - 4 + 3i$ با هم مساوی باشند، در این صورت مقادیر

n, m مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} n = 3, m = -6 & (1) \\ n = -3, m = 6 & (3) \\ -n = 2, m = 5 & (2) \\ n = 3, m = 6 & (4) \end{array}$$

63. هرگاه $\bar{z}$ مزدوج عدد مختلط z باشد، در این صورت حاصل تفریق شان عبارت است از:

- (1) عدد مختلط صفری
(2) عدد خالص موهومی
(3) مربع عدد مختلط
(4) عدد خالص حقیقی

64. اگر $z = 2 - 3i$ باشد، پس z^2 مساوی است به:

- (1) $-12i$ (2) $-(5 + 12i)$ (3) $(5 - 12i)$ (4) $12i$

65. حاصل $\frac{i^{200} + i^{100}}{2i^{1000}}$ مساوی است به:

- (1) 1 (2) $-i$ (3) -1 (4) i

66. هرگاه $z = i + 2$ باشد، در این صورت $\frac{\bar{z}}{z + \bar{z}}$ مساوی است به:

- (1) $\frac{i-4}{4}$ (2) $-\frac{(2i-1)}{2}$ (3) $\frac{2-i}{4}$ (4) $\frac{2+i}{2}$

فصل سوم

بخش معادلات

معادله الجبری: به مساوات الجبری گفته می شود که بنابر بعضی از قیمت های مجهول مربوط صدق نماید.

خواص معادله:

$$x \equiv x$$

(1) خاصیت انعکاسی

$$x = y \Leftrightarrow y = x$$

(2) خاصیت تناظری

$$\left. \begin{array}{l} x = y \\ y = z \end{array} \right\} \Rightarrow x = z$$

(3) خاصیت انتقالی

$$x + a = y + a$$

$$x - a = y - a$$

(4) اگر $x = y$ باشد ، پس

انواع معادلات الجبری: معادلات الجبری نظر به تعداد مجهول و درجه آن انواع مختلف دارند که بعضی آن

ها قرار ذیل اند.

معادله یک مجهوله درجه اول: هرگاه a و b اعداد ثابت باشند (طوری که $a \neq 0$):

$$ax + b = 0$$

$$x = -\frac{b}{a}$$

معادلات قیمت مطلقه: در این نوع معادلات با استفاده تعریف قیمت مطلقه معادله را یکبار برای مثبت و بار دیگر منفی مطالعه می نماییم.

معادله دو مجهوله درجه اول: هرگاه a, b, c اعداد ثابت باشند (طوری که $a, b \neq 0$):

$$ax + by = c$$

سیستم معادلات دو مجهوله درجه اول (معادلات خطی):

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

توجه نمایید که گراف این نوع معادلات یک خط مستقیم می باشد.

مناقشه

1. هرگاه $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ باشد، سیستم معادلات حل مشخص دارد. (خطوط مذکور در یک نقطه متقاطع اند)
 2. هرگاه $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ باشد، سیستم معادلات حل مشخص ندارد.
- هرگاه $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ باشد، سیستم معادلات هیچ حل ندارد. (خطوط مذکور با هم موازی اند).
 - هرگاه $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ باشد، سیستم معادلات بی نهایت حل دارد. (خطوط مذکور با هم منطبق اند).

سیستم معادلات سه مجهوله درجه اول:

هرگاه a, b, c و d اعداد ثابت باشند، سیستم معادلات سه مجهوله درجه اول به طور عموم قرار ذیل تعریف گردیده است.

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

حل سیستم معادلات دو مجهوله و سه مجهوله: می توان سیستم معادلات فوق الذکر را به طریقه های مساوی ساختن ضرایب (افنا)، تعویض، مساوات، گراف، متریکس و دیترمینانت حل نمود.

متریکس ها Matrixes: اشیاء اعداد و حروفی که به شکل سطری و ستونی به یک جدول مستطیلی ترتیب گردیده باشند متریکس نامیده می شود.

ترتیب متریکس: متریکسی که دارای m سطر و n ستون باشد متریکس $(m \times n)$ نامیده میشود. قابل یاد آورست که متریکس $n \times m \neq m \times n$ است مانند متریکس های ذیل:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \Rightarrow A_{2 \times 3}$$

$$B = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \Rightarrow B_{3 \times 2}$$

انواع متریکس ها:

(1) **متریکس سطری:** متریکس که تنها و تنها یک سطر داشته باشد، متریکس سطری نامیده می شود مانند.

$$A = (3 \ 5 \ 8)_{1 \times 3}$$

(2) **متریکس ستونی:** متریکس که تنها و تنها یک ستون داشته باشد، متریکس ستونی نامیده می شود مانند.

$$A = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

(3) **متریكس صفري:** متریكس كه تمام عناصر آن صفر ها باشد ، متریكس صفري یاد می گردد، مانند.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

(4) **متریكس مربعی:** متریكس كه سطر و ستونهای آن با هم مساوی باشد ، متریكس مربعی نامیده میشود. مانند.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

به خاطر داشته باشید كه هر متریكس مربعی دارای دو قطر میباشد. یعنی در متریكس $A_{2 \times 2}$ عناصر (3,5) قطر اصلی ، عناصر (2, -1) قطر فرعی نامیده می شوند.

(5) **متریكس قطری:** متریكس كه تمام عناصر آن به غیر از عناصر قطر اصلی صفر ها باشد مانند.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

(6) **متریكس اسكالر:** آن متریكس قطری كه عناصر قطر اصلی آن با هم مساوی باشند. مانند.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

(7) **متریكس واحد:** متریكس اسكالر كه عناصر قطر اصلی آن عدد يك باشند مانند.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

(8) **متریكس متقابل (متضاد):** متریكس كه دارای عین سطر و ستون اما عناصر آن متضاد همدیگر باشند مانند.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \\ -7 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \Rightarrow -A = \begin{pmatrix} -5 & +1 \\ -2 & -3 \\ +7 & +2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

عملیات بالای متریكس ها

(1) جمع و تفریق متریكس ها: متریكس های که دارای ترتیب های مساوی باشند با هم جمع یا تفریق میگردند طوریكه هر يك از عناصر همان سطر و ستون با هم جمع و تفریق میگردد.

$$A_{m \times n} + B_{m \times n} = C_{m \times n}$$

$$A_{m \times n} - B_{m \times n} = C_{m \times n}$$

(2) ضرب اسكالر با متریكس: هرگاه $K \in IR$ يك اسكالر را با هر يك از عناصر يك متریكس ضرب نماییم ضرب اسكالر با متریكس میباشد. مثلاً

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2 \times 2} \Rightarrow KA = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

(3) ضرب دو متریكس: حاصل ضرب دو متریكس يك متریكس بوده به شرط كه تعداد عناصر ستونهای متریكس اول مساوی به تعداد عناصر سطر های متریكس دوم باشد. یعنی:

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

ترتیب اجرا عملیه ضرب طوریست كه سطر اول متریكس اول را به تمام عناصر ستون های متریكس دوم به نوبت ضرب نموده و با هم جمع می نمایم و به حیث سطر متریكس حاصل ضرب قرار میدهیم و این عملیه را تا اخیر ادامه میدهیم. به خاطر داشته باشید عملیه ضرب متریكس ها خاصیت تبدیلی ندارد.

ترانسپوز متریكس Transpose of Matrix: هرگاه سطر و ستون يك متریكس تبدیل گردد متریكس $A_{m \times n}$ به متریكس ترانسپوز متریكس $A^T_{n \times m}$ تبدیل می گردد. در نتیجه هرگاه يك متریكس به متریكس ترانسپوز مساوی باشند به نام متریكس متناظر یاد میگردد.

به خاطر داشته باشید كه ترانسپوز يك متریكس خواص ذیل را دارا می باشد.

$$1) \quad (A^T)^T = A$$

$$2) \quad (A \pm B)^T = A^T \pm B^T$$

$$3) \quad (A \cdot B)^T = \pm B^T \cdot A^T, \quad (\alpha \cdot B)^T = \alpha \cdot A^T$$

$$4) \quad (-A)^T = -A^T$$

متوصلهٔ متریکس Adjoint Matrix: متریکس مربعی که جای عناصر قطر اساسی آن تبدیل و اشاره قطر فرعی آن تغییر نماید، متریکس حاصله را متوصلهٔ یک متریکس مینامند. یعنی:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Adj } A = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

معکوس ضربی یک متریکس: هرگاه حاصل ضرب دو متریکس مربعی یک متریکس واحد گردد متریکس یکدیگر نامیده می شوند.

$$A \cdot A^{-1} = I \quad \text{طوری که}$$

که متریکس معکوس به اساس رابطه $A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|}$ به دست می آید طوری که $|A| \neq 0$ ، دترمینانت یک متریکس نامیده می شود. همچنان اگر $|A| = 0$ متریکس مربعی مذکور منفرد و $|A| \neq 0$ باشد، غیر منفرد یاد می گردد.

دترمینانت 2×2 : به ترتیب اعدادی گفته می شود که دارای دو سطر و دو ستون باشد و همچنان دارای یک قطر اصلی a_1 ، b_2 و یک قطر فرعی a_2 ، b_1 می باشد که قیمت این دترمینانت عبارت است از:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

دترمینانت 3×3 : به ترتیب اعدادی گفته می شود که دارای سه سطر و سه ستون بوده و همچنان دارای سه قطر اصلی و سه قطر فرعی می باشد که قیمت آن عبارت از:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 - b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - (a_3 b_2 c_1 + b_3 c_2 a_1 + c_3 a_2 b_1)$$

هرگاه A یک متریکس $m \times n$ باشد برای $|A|$ خواص ذیل را در نظر داشته باشید:

(1) هرگاه تمام عناصر یک سطر یا ستون صفر باشد، پس $|A| = 0$

(2) هرگاه دو سطر یا دو ستون یکسان یا متناسب باشند، پس $|A| = 0$

(3) یک دترمینانت با ترانسپوز خود مساوی است. یعنی $|A| = |A^T|$

حل سیستم معادلات دو مجهوله به طریقه دیترمینانت: با در نظر داشت تعریف سه دیترمینانت $\Delta x, \Delta y, \Delta$ می توان قیمت مجهول x و y را قرار فورمول های ذیل دریافت نمود. و در صورتیکه $\Delta = 0$ باشد سیستم معادلات حل ندارد.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \Rightarrow \Delta \neq 0$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta x &= \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} \\ \Delta y &= \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} \end{aligned} \right\} x = \frac{\Delta x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta y}{\Delta}$$

حل سیستم معادلات سه مجهوله به طریقه دیترمینانت: با در نظر داشت تعریف چهار دیترمینانت $\Delta z, \Delta y, \Delta x, \Delta$ می توان قیمت مجهول x, y و z را قرار فورمول های ذیل دریافت نمود.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \Rightarrow \Delta \neq 0$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta x &= \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ \Delta y &= \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ \Delta z &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix} \end{aligned} \right\} x = \frac{\Delta x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta y}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta z}{\Delta}$$

اگر $\Delta = 0$ باشد سیستم معادلات حل ندارد.

معادلات نمائی: به معادله گفته می شود که مجهول در نما (طاقة نما) قرار داشته باشد گرچه به طور عموم می توان چنین معادلات را به کمک لوگاریتم حل نمود اما می توان به طور خاص معادلات که در اطراف مساوات قاعده ها با هم مساوی باشد پس طاقة نما ها نیز مساوی است ، استفاده نموده به حل این گونه معادلات می پردازیم.

معادلات عبارتی یا فکری: به معادلاتی گفته می شود که رابطه بین معلوم و مجهول به شکل جملات غیر الجبری ارائه گردیده باشد که می توان با استعمال حروف و درک مجهول اصلی مسایل مذکور را در شکل افاده های الجبری ارائه نموده و از طریق مساوات به حل آنها اقدام نمود.

به خاطر داشته باشید که برای ارائه اعداد در شکل افاده های الجبری می توان چنین نوشت.

(1) اعداد مسلسل طبیعی

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots, n$$

$\dots, 2, x + 2$ عدد سوم , $x + 1$ عدد دوم , x عدد اول

(2) اعداد مسلسل طبیعی جفت

$$2, 4, 6, 8, \dots, 2n$$

$\dots, 4, 2x + 4$ عدد سوم , $2x + 2$ عدد دوم , $2x$ عدد اول

(3) اعداد مسلسل طبیعی طاق

$$1, 3, 5, 7, \dots, 2n + 1$$

$\dots, 5, 2x + 5$ عدد سوم , $2x + 3$ عدد دوم , $2x + 1$ عدد اول

(4) اعداد از نظر طبقه بندی : در حالیکه x, y و $z \dots$ ارقام را ارائه نماید .

x عدد یک رقمی , $10y + x$ عدد دو رقمی , $100z + 10y + x$ عدد سه رقمی , $\dots$

معادلات یک مجهوله درجه دوم: در حالیکه $a \neq 0, b, c$ اعداد ثابت اند ، شکل عمومی معادلات فوق عبارت از : $ax^2 + bx + c = 0$ بوده که می توان معادلات فوق را به طریق تجزیه و یا به کمک فورمول محمد بن موسی قرار روابط ذیل حل نمود.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

مناقشه

$$(1) \text{ اگر } \Delta > 0 \text{ باشد، معادله دو جذر حقیقی مختلف دارد.} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

$$(2) \text{ اگر } \Delta = 0 \text{ باشد، معادله دو جذر حقیقی مساوی } x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} \text{ دارد.}$$

$$(3) \text{ اگر } \Delta < 0 \text{ باشد، معادله جذر حقیقی ندارد. (دو جذر موهومی دارد)}$$

رابطه بین جذور معادله درجه دوم از جنس ضرایب آن:

$$(1) \text{ حاصل جمع جذور} \quad S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$(2) \text{ حاصل ضرب جذور} \quad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$(3) \text{ حاصل تفریق جذور} \quad x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{\Delta}}{a}$$

$$(4) \text{ حاصل جمع معکوس جذور} \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{b}{c}$$

$$(5) \text{ معکوس حاصل جمع جذور} \quad \frac{1}{x_1 + x_2} = -\frac{a}{b}$$

$$(6) \text{ معکوس حاصل ضرب جذور} \quad \frac{1}{x_1 \cdot x_2} = \frac{a}{c}$$

$$(7) \text{ حاصل جمع مربعات جذور} \quad x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$$

$$(8) \text{ حاصل جمع مکعبات جذور} \quad x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS$$

تشکیل معادله درجه دوم: در صورت x_1 و x_2 جذور معادله یا حاصل جمع جذور S و حاصل ضرب جذور P موجود باشد، میتوان معادله درجه دوم را چنین تشکیل نمود.

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2 = 0$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

یادداشت

(1) معادله درجه دوم که جذور آن m چند جذور معادله $ax^2 + bx + c = 0$ باشد عبارت است از:

$$ax^2 + bmx + cm^2 = 0$$

(2) معادله درجه دوم که جذور آن معکوس جذور معادله $ax^2 + bx + c = 0$ باشد عبارت است از:

$$cx^2 + bx + a = 0$$

(3) معادله درجه دوم که جذور آن مختلف الاشاره جذور معادله $ax^2 + bx + c = 0$ باشد، عبارت است از:

$$ax^2 - bx + c = 0$$

تعیین اشاره جذور معادلات درجه دوم

(1) **روش دیکارت:** در صورتیکه $\Delta \geq 0$ باشد.

- هرگاه بین حدود معادله هیچ تحول علامه نباشد، معادله دو جذر هم علامه منفی دارد.
- هرگاه بین حدود معادله یک تحول علامه باشد، معادله دو جذر مختلف علامه دارد.
- هرگاه بین حدود معادله دو تحول علامه باشد، معادله دو جذر هم علامه مثبت دارد.

(2) **روش نسبت ضرایب:** در صورتیکه $\Delta \geq 0$ باشد.

(1) $\frac{c}{a} < 0$ دو جذر مختلف علامه دارد در این صورت:

- $\frac{b}{a} > 0$ جذر بزرگ مثبت و جذر کوچک منفی
- $\frac{b}{a} < 0$ جذر بزرگ منفی و جذر کوچک مثبت
- $\frac{b}{a} = 0$ دو جذر مساوی مختلف علامه

(2) $\frac{c}{a} > 0$ دو جذر هم علامه دارد در این صورت:

• $-\frac{b}{a} > 0$ دو جذر هم علامه مثبت

• $-\frac{b}{a} < 0$ دو جذر هم علامه منفی

$$(3) \quad x_1 = 0, \frac{c}{a} = 0 \quad \text{و} \quad \begin{array}{l} \text{جذر دوم مثبت است} \quad -\frac{b}{a} > 0 \\ \text{جذر دوم منفی است} \quad -\frac{b}{a} < 0 \end{array} \quad x_2 =$$

معادلات پارامتریک یک مجهوله درجه دوم

به معادلات گفته می شود که بر علاوه مجهول مربوط در آن یک یا چند حرف اضافی دیگر که قیمتهای عددی آن تعیین نگردیده ، موجود باشد ، مانند.

$$(2m + 1)x^2 - 3mx + 2 = 0$$

که در معادله فوق m پارامتر نامیده می شود و میتوان با استفاده از شرطی که در سوال مطرح گردیده و در مسایل مربوط معادلات درجه دوم راجع به آنها معلومات داریم به حل آن اقدام نمود.

اعداد موهومی

طوری که میدانیم معادلات مانند $x^2 + 49 = 0$ در ساحه اعداد حقیقی دارای حل نمیشد. یعنی $x = \sqrt{-49}$ میگردد ، بناً این گونه اعداد را موهومی مینامند. پس به طور عموم عدد a_i یک عدد موهومی است اگر $a \in IR$ و $i = \sqrt{-1}$ واحد اعداد موهومی باشد مثلاً

$$\sqrt{-49} = \sqrt{49} \cdot \sqrt{-1} = \pm 7i$$

به خاطر داشته باشید که:

$$i = \sqrt{-1}$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -\sqrt{-1}$$

$$i^4 = +1$$

$$\vdots$$

و همچنان اعداد موهومی قابلیت اجرای عملیات اساسی را دارا میباشد.

اعداد مختلط

مجموعه الجبری اعداد حقیقی و موهومی را اعداد مختلط مینامند. طوریکه :

$$C = \{z / z = a + bi \text{ و } b \in IR, i = \sqrt{-1}\}$$

بخطرات داشته باشید که اگر $Z = a + bi$ یک عدد مختلط باشد مزدوج آن $\bar{Z} = a - bi$ می باشد.

به همین ترتیب معکوس ضربی $Z = a + bi$ عبارت از $Z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{bi}{a^2 + b^2}$ می باشد.

مطالعه اشاره بینوم ها ، ترینوم ها و ساحه حل نامساوات ها

تعیین اشاره بینوم ها

شکل عمومی بینوم $y = ax + b$ بوده که به قیمت $x = -\frac{b}{a}$ بی اشاره گردیده و هدف اینست که بینوم مذکور به کدام قیمت های x دارای اشاره مثبت و به کدام قیمت های x دارای اشاره مثبت می باشد، برای این منظور دو حالت ذیل وجود دارد.

حالت اول

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$y = ax + b$		0	
	-		+

حالت دوم

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$y = ax + b$		0	
	+		-

تعیین اشاره ترینوم ها

شکل عمومی ترینوم های درجه دوم $y = ax^2 + bx + c$ بوده و هدف اینست که ترینوم مذکور به کدام قیمت های x دارای اشاره مثبت و به کدام قیمت های x دارای اشاره منفی می باشد. بناً برای این منظور با تشکیل Δ سه حالت ذیل وجود دارد:

1) هرگاه $\Delta < 0$ باشد ترینوم اشاره a را دارا است یعنی:

- اگر $a > 0$ باشد ترینوم به تمام قیمت های x اشاره مثبت دارد.
- اگر $a < 0$ باشد ترینوم به تمام قیمت های x اشاره منفی دارد.

2) هرگاه $\Delta = 0$ باشد به جز از قیمت $x = -\frac{b}{2a}$ که در آن بی اشاره می گردد، به سایر قیمت های x ترینوم اشاره a را دارا می باشد. یعنی:

- اگر $a > 0$ باشد ترینوم به جز از $x = -\frac{b}{2a}$ به تمام قیمت های x اشاره مثبت دارد.
- اگر $a < 0$ باشد ترینوم به جز از $x = -\frac{b}{2a}$ به تمام قیمت های x اشاره منفی دارد.

3) هرگاه $\Delta < 0$ باشد ترینوم به جز از جذور خویش یعنی x_1 و x_2 که در آن بی اشاره می گردد به سایر قیمت های x نظر به اشاره a می توان دریافت نمود که داخل جذور خلاف اشاره a و خارج جذور هم اشاره a می باشد. یعنی:

- هرگاه $a > 0$ باشد، داخل جذور اشاره منفی و خارج جذور اشاره مثبت دارد.
- هرگاه $a < 0$ باشد، داخل جذور اشاره مثبت و خارج جذور اشاره منفی دارد.

نامساوات

هرگاه a و b دو مقدار یا کمیت را ارائه نماید، افاده $a > b$ یا $a < b$ را نامساوات یا غیر تساوی می نامند.

خواص نامساوات:

1) هرگاه $a > b$ یا $a < b$ بوده $n \in \mathbb{R}$ را در داشته باشیم، پس خواهیم داشت:

$$a < b$$

$$a + n < b + n$$

$$a > b$$

$$a + n > b + n$$

(2) هرگاه $a > b$ یا $a < b$ بوده و $n > 0$ باشد.

$$a < b$$

$$a \cdot n < b \cdot n$$

$$\frac{a}{n} < \frac{b}{n}$$

$$a > b$$

$$a \cdot n > b \cdot n$$

$$\frac{a}{n} > \frac{b}{n}$$

(3) هرگاه $a > b$ یا $a < b$ بوده و $n < 0$ باشد.

$$a > b$$

$$a \cdot n < b \cdot n$$

$$\frac{a}{n} < \frac{b}{n}$$

$$a > b$$

$$a \cdot n < b \cdot n$$

$$\frac{a}{n} < \frac{b}{n}$$

(4) در صورتیکه $a > b$ باشد پس $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ خواهد بود، همچنان هرگاه $a < b$ باشد، پس $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ خواهد بود.

انواع نامساوی ها: بطور عموم نامساوی ها را در سه حالت ذیل مطالعه می نمایم.

(1) ساحه حل نامساوی های یک مجهوله درجه اول

شکل عمومی نامساوی یک مجهوله درجه اول $ax + b > 0$ یا $ax + b < 0$ بوده که با استفاده از خواص نامساوی های می توان انتروال حل آنها را روی خط اعداد تعیین نمود.

(2) ساحه حل نامساوی های دو مجهوله درجه اول

طوریکه می دانیم معادله $ax + by = c$ روی سیستم کمیات وضعیه قایم یک خط مستقیم را ترسیم می نماید بنأ ساحه حل نامساوی دو مجهوله درجه اول عبارت از بی نهایت جوړه مرتب (x, y) بوده که بنأ بر آن یک جهت ساحه خط مستقیم که روی سیستم کمیات قرار دارد، را صدق نماید که این امر برای سیستم نامساوی های دو مجهوله درجه اول نیز قابل تطبیق می باشد.

(3) ساحه حل نامساوی های درجه دوم

شکل عمومی نامساوی های درجه دوم $ax^2 + bx + c > 0$ بوده جهت دریافت ساحه حل نامساوی مذکور به تشکیل Δ میتوان سه حالت ذیل را در نظر داشت.

- $\Delta > 0$ ، جذور x_1 و x_2 را دریافته. علامه a و اشاره نامساوی مطالعه می‌گردد
 - ❖ مخالف – در داخل جذور حل دارد
 - ❖ موافق – در خارج جذور حل دارد.
- $\Delta = 0$ ، به استثنای $x = -\frac{b}{2a}$. علامه a و اشاره نامساوی مطالعه می‌گردد
 - ❖ مخالف – به هیچ قیمت x حل ندارد.
 - ❖ موافق – به تمام قیمت های x حل دارد..
- $\Delta < 0$ ، علامه a و اشاره نامساوی مطالعه می‌گردد
 - ❖ مخالف – به هیچ قیمت x حل ندارد.
 - ❖ موافق – به تمام قیمت های x حل دارد.

سوالات

در معادله $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{4} \cdots \sqrt{n} = 2\sqrt{30}$ قیمت n عبارت است از:

1. (1) 2 (2) 3 (3) 5 (4) 8

2. سیستم مساوات دو مجهوله
$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 3 \\ \frac{3}{x} - \frac{1}{y} = \frac{8}{3} \end{cases}$$
 چند حل دارد:

- (1) یک حل (2) دو حل
(3) بی نهایت (4) حل ندارد

3. در سیستم معادلات
$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{4}{y} = 11 \\ \frac{3}{x} + \frac{1}{y} = 24 \end{cases}$$
 مقدار $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ عبارت است از:

- (1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8

4. حل سیستم سه معادله و سه مجهوله
$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ 3x + y + z = 12 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases}$$
 عبارت از:

- (1) $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases}$
(3) $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 2 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$

$$5. \quad \begin{cases} x - 2y + 5z = 3 \\ x + 4y + 5z = 1 \\ 3x - 6y + 15z = 2 \end{cases} \quad \text{سیستم معادلات چند حل دارد؟}$$

- (1) یک حل
(2) دو حل
(3) حل ندارد
(4) بی نهایت حل

$$6. \quad \text{اگر دترمینانت ضرایب معادلات خطی سه مجهوله } \Delta = 3 \text{ و دترمینانت مجهول های آنها } N_x = 12, N_y = -15, N_z = -11 \text{ باشد پس:}$$

- (1) $(12, -15, -11)$
(2) $\left(-5, 4, -\frac{11}{3}\right)$
(3) $\left(4, -5, -\frac{11}{3}\right)$
(4) $\left(4, -5, \frac{11}{3}\right)$

$$7. \quad \text{اگر } B = \begin{pmatrix} 3x & 2 \\ 5x & 6 \end{pmatrix} \text{ باشد، پس } B^{-1} \text{ باری کدام قیمت } x \text{ تعریف نشده است:}$$

- (1) $x = 0$ (2) $x = 8$ (3) $x = 2$ (4) $x = 1$

$$8. \quad \text{اگر } A = (a_{ij})_{4 \times 4} = (3i - 5j)_{4 \times 4} \text{ یک متریکس باشد، پس مجموعه سطر اول این متریکس عبارت از:}$$

- (1) 71 (2) -36 (3) -38 (4) 38

$$9. \quad \text{اگر } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \text{ و } B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ باشد، پس } (B \cdot A)^T \text{ مساوی است به:}$$

- (1) $\begin{pmatrix} 29 & 9 \\ 26 & 10 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 29 & 26 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 26 & 10 \\ 29 & 9 \end{pmatrix} (4)$$

$$\begin{pmatrix} 26 & 19 \\ 10 & 9 \end{pmatrix} (3)$$

10. کدام یک از متریكس های ذیل يك متریكس متناظر است:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} (2)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix} (1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} (4)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 5 & 4 & 6 \end{pmatrix} (3)$$

11. اگر $A = \begin{pmatrix} a & 3 \\ 3 & a \end{pmatrix}$ و $\det(A) = 0$ باشد، پس قیمت a مساوی است به:

$$a = \pm 3 (2)$$

$$a = \pm 2 (1)$$

$$a = \pm \frac{1}{3} (4)$$

$$a = \pm 9 (3)$$

12. در متریكس $A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{5} & \sqrt{7} \\ 8 & 10 & 13 \\ x & \sqrt{20} & \sqrt{28} \end{bmatrix}$ قیمت x را طوری تعیین کنید که متریكس A معكوس پذیر نباشد:

$$x = \sqrt{5} (2)$$

$$x = 10 (1)$$

$$x = \sqrt{8} (4)$$

$$x = \sqrt{7} (3)$$

13. اگر $A = \begin{bmatrix} 8 & 2 & 8 \\ 1 & 5 & 1 \\ 9 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ باشد، پس $|A|$ مساوی است به:

$$-9 (4)$$

$$0 (3)$$

$$9 (2)$$

$$9 (1)$$

14. متریکس $A = \begin{pmatrix} 10 & 2x \\ 2 & 4x + 1 \end{pmatrix}$ برای کدام قیمت x متریکس منفرد است:

$$\begin{aligned} x &= \frac{18}{5} \quad (2) & x &= \frac{5}{18} \quad (1) \\ x &= -\frac{5}{18} \quad (4) & x &= -\frac{18}{5} \quad (3) \end{aligned}$$

15. اگر $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 7 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ و $B = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ باشد، پس کدام یکی از روابط ذیل درست است:

$$\begin{aligned} |A| &= 3|B| \quad (2) & |A| &= -|B| \quad (1) \\ |A| &= 4|B| \quad (4) & |A|^3 &= |B|^3 \quad (3) \end{aligned}$$

16. اگر مرتبه متریکس A ، 1×5 و متریکس B ، 5×4 باشد، پس مرتبه متریکس $A \cdot B$ مساوی است به:

$$5 \times 1 \quad (4) \qquad 4 \times 1 \quad (3) \qquad 1 \times 5 \quad (2) \qquad 1 \times 4 \quad (1)$$

17. کدام یک از متریکس های زیر یک متریکس مربعی است:

$$\begin{aligned} A &= (a_{ij})_{5 \times 7} \quad (2) & A &= (a_{ij})_{3 \times 5} \quad (1) \\ A &= (a_{ij})_{3 \times 9} \quad (4) & A &= (a_{ij})_{k \times k} \quad (3) \end{aligned}$$

18. اگر A یک متریکس باشد، پس بین $|A|$ و $|A^T|$ کدام یکی از رابطه های ذیل وجود دارد:

$$|A^T| = -|A| \quad (2) \qquad |A^T| > |A| \quad (1)$$

$$|A^T| = |A| \quad (4)$$

$$|A^T| < |A| \quad (3)$$

19. اگر $A = \begin{pmatrix} \sin^2 x & \cos^2 x \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ و $B = \begin{pmatrix} \cos^2 x & \sin^2 x \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ باشند، پس $A + B$ مساوی است به:

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ (3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (4) هیچکدام

20. اگر $A_{m \times n}$ یک متریکس واحد باشد، پس کدام یک از گزینه های ذیل درست است:

(1) $I = \begin{cases} 1, i \neq j \\ 0, i = j \end{cases}$ (2) $I = \begin{cases} 0, i \neq j \\ -1, i = j \end{cases}$

(3) $I = \begin{cases} 0, i \neq j \\ 1, i = j \end{cases}$ (4) $I = \begin{cases} 2, i \neq j \\ 0, i = j \end{cases}$

21. دترمینات متریکس $A = \begin{pmatrix} 5 & \cos^2 x \\ -5 & \sin^2 x \end{pmatrix}$ مساوی است به:

(1) 5 (2) 11

(3) $5 \sin 2x$ (4) $-5 \cos 2x$

22. اگر $A = \begin{pmatrix} \ln 2 & \ln 8 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ باشد، پس $|A|$ مساوی است به:

(1) 3 (2) $2 \ln 200$

(3) 0 (4) $200 \ln 3$

23. هرگاه A, B دو متریكس مربعی باشند، پس $|AB| = 1$ است، اگر:

- (1) هر دو متریكس های منفرد باشند
 (2) هر دو متریكس متناظر باشند
 (3) يك متریكس معكوس متریكس دیگری باشد
 (4) هر دو متریكس های غیر منفرد باشند

24. اگر $A = (a_{ij})_{2 \times 3} = (i)_{2 \times 3}$ باشد، پس متریكس A مساوی است به:

$$\begin{aligned} (1) \quad A &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ (2) \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ (3) \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ (4) \quad A &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

25. کدام یکی از متریكس های ذیل يك متریكس متناظر است:

$$\begin{aligned} (1) \quad \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} \\ (2) \quad \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \\ (3) \quad \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \\ (4) \quad \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

26. اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$ باشد، درینصورت $|A|$ عبارت است از:

- (1) 25 (2) 5 (3) 10 (4) 21

27. اگر $A = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$ باشد، پس $A - B$ مساوی است به:

(1) $\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$

28. اگر $A = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ باشد، پس A^T مساوی است به:

(1) $[-1 \ 3 \ 4]$ (2) $[3 \ -1 \ 4]$ (3) $\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ (4) $[4 \ 3 \ -1]$

29. متریکس ضریب های سیستم $\begin{cases} 3x - y = 4 \\ x + y = 7 \end{cases}$ عبارت است از:

(1) $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

30. اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 11 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ باشد، پس مرتبه $A \cdot B$ مساوی است به:

(1) 3×3 (2) 2×2 (3) 1×1 (4) 1×3

31. اگر $((3A)^T)^T = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ باشد، پس $(3A)^T$ مساوی است به:

(1) $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (3) $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

32. اگر $A = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 19 & 2 \end{bmatrix}$ باشد، پس A^{-1} مساوی است به:

(1) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 19 & 10 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -19 & 10 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -19 & 10 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 19 & 2 \end{bmatrix}$

33. متریکس معکوس $A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 5 \\ 6 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ عبارت است از:

(1) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 5 \\ 6 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ (2) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ (3) هیچکدام (4) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 8 & 4 & 6 \\ 7 & 2 & 8 \end{pmatrix}$

34. اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ و $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، درینصورت کدام یکی از رابطه های ذیل درست است:

$$|A| = |B| \quad (2)$$

$$|A| = 2|B| \quad (1)$$

$$|A|^2 = |B|^2 \quad (4)$$

$$|A| = -|B| \quad (3)$$

35. ست عناصر ستون چهارم متریكس $B = (b_{ij})_{3 \times 4} = (2i)_{3 \times 4}$ عبارت است از:

$$\{2, 4, 6\} \quad (2)$$

$$\{2, -4, 6\} \quad (1)$$

$$\{2, 4, -6\} \quad (4)$$

$$\{-2, 4, 6\} \quad (3)$$

36. اگر $(a_{ij})_{3 \times 3} = (i + j)_{3 \times 3}$ باشد، پس متریكس A مساویست به:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 4 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 5 & 6 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

37. کدام یک از متریكس های زیر یک متریكس غیر منفرد است:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} \quad (3)$$

38. در متریكس $A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{5} & \sqrt{7} \\ 8 & 10 & 13 \\ x & \sqrt{20} & \sqrt{28} \end{bmatrix}$ قیمت x را طوری تعیین کنید که متریكس A معکوس پذیر نباشد:

$$\begin{array}{ll} x = \sqrt{5} & (2) \\ x = \sqrt{8} & (4) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} x = 10 & (1) \\ x = \sqrt{7} & (3) \end{array}$$

39. اگر $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 20 & 4 & 8 \end{pmatrix}$ باشد، پس $\left| \frac{1}{18} 200(A^T)^T \right|$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} \frac{1819}{18} & (4) & \frac{1720}{18} & (3) \\ \frac{1820}{18} & (2) & \cos 90^\circ & (1) \end{array}$$

40. هرگاه $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ باشد قیمت A^{18} عبارت از:

$$\begin{array}{ll} \begin{bmatrix} 1 & -72 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & (2) \\ \begin{bmatrix} 1 & -32 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & (4) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & (1) \\ \begin{bmatrix} 1 & -54 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & (3) \end{array}$$

41. در متریکس $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ قیمت M_{21} عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} & (2) \\ \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} & (4) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} & (1) \\ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & (3) \end{array}$$

42. در افاده جذری $\sqrt{x+1}\sqrt{x-1}\sqrt{81} = \sqrt{3}$ قیمت x عبارت است از:

$$\begin{array}{llll} 5 & (4) & 4 & (3) \\ 3 & (2) & 2 & (1) \end{array}$$

43. در معادله $5^{-x-2} = 125$ قیمت x مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} 4 & (4) & 5 & (3) \\ -5 & (2) & -4 & (1) \end{array}$$

44. در معادله $8^{x+2} = 16^{x-1}$ قیمت x مساوی است به:

$$x = 12 \quad (1) \quad x = 10 \quad (2) \quad x = 11 \quad (3) \quad x = 8 \quad (4)$$

45. اگر یک عدد x و دیگری $20 - x$ باشد، پس قیمت x باید چند باشد تا که $x(20 - x)$ بزرگترین قیمت را داشته باشد:

$$x = 10 \quad (1) \quad x = 9 \quad (2) \quad x = 5 \quad (3) \quad x = 8 \quad (4)$$

46. در معادله $2^{x+1} = 8$ مساوی است به:

$$2 \quad (1) \quad 5 \quad (2) \quad 3 \quad (3) \quad -2 \quad (4)$$

47. قیمت x در معادله $\sqrt[3]{2^{x-1}} - 2 = 0$ مساوی است به:

$$3 \quad (1) \quad 4 \quad (2) \quad 2 \quad (3) \quad 5 \quad (4)$$

48. در معادله $2^x + 2^{x+1} - m \cdot 2^{x+2} = 0$ قیمت m مساوی است به:

$$\frac{3}{4} \quad (1) \quad \frac{1}{4} \quad (2) \quad \frac{2}{3} \quad (3) \quad \frac{1}{8} \quad (4)$$

49. جذر معادله $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{\sqrt[5]{2}}\right)^x$ عبارت از:

$$x = 15 \quad (1) \quad x = 10 \quad (2) \quad x = -10 \quad (3) \quad x = -15 \quad (4)$$

50. قیمت x در معادله $\frac{3 \cdot 2^{x-1} - 3 \cdot 2^x + 2^{x+1}}{2^x} = 2^{x-1}$ عبارت از:

- (1) -1 (2) 0 (3) 1 (4) 2

51. در معادله $\left(\frac{0.00048}{0.00012}\right)^{x-2} = \left(\frac{0.06}{0.03}\right)^{x+1}$ قیمت x عبارت از:

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

52. در معادله $15^{12} \cdot 625^x = 3^{12}$ قیمت x عبارت از:

- (1) $x = -6$ (2) $x = -5$
(3) $x = -3$ (4) $x = 3$

53. قیمت x در معادله $2\left(\frac{1}{x} - 1\right)^2 + 5\left(\frac{1}{x} - 1\right) = 3$ عبارت از:

- (1) $\left\{-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right\}$ (2) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right\}$
(3) $\left\{\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\right\}$ (4) $\{1, -1\}$

54. اگر متریکس های ضرایب، ثوابت و مجهولات بالترتیب $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ، $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ،

$C = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ باشد، پس سیستم مذکور عبارت است از:

- (1) $\begin{cases} x + 2y = -1 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x + 2y = -1 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$
(3) $\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases}$

55. جذور معادله $(x^2 + x)^2 - 18(x^2 + x) + 72 = 0$ عبارت است از:

- (1) $x = \pm 3, x = \pm 4$ (2) $x = \pm 4, x = \pm 2$
 (3) $x = \pm 2, x = \pm 4$ (4) $x = \pm 3, x = +2, x = -4$

56.

حاصل جمع جذور معادله $\left(x - \frac{1}{x}\right)^4 + 5 = 2x^2 + \frac{2}{x^2}$ عبارت است از:

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 1 (4) 0

57. قیمت B در کسرهای $\frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ مساوی است به:

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) -2 (3) 2 (4) $-\frac{1}{2}$

58. قیمت B در تجزیه کسور قسمی $\frac{x-3}{9x^2-1} = \frac{A}{3x-1} + \frac{B}{3x+1}$ عبارت است از:

- (1) $\frac{4}{3}$ (2) $-\frac{5}{3}$ (3) $\frac{5}{3}$ (4) $-\frac{4}{3}$

59. قیمت n در معادله $\frac{n!(n-2)!}{(n-3)!} : \frac{n!(n-2)}{n} = 15$ مساوی است به:

- (1) 1 (2) 12 (3) 15 (4) 17

60. اگر $x_2 = -\frac{3}{2}$ و $x_1 = \frac{1}{2}$ جذور معادله باشند معادله مذکور عبارت است از ؟

- (1) $4x^2 + 4x - 3 = 0$ (2) $4x^2 - 4x - 3 = 0$
 (3) $4x^2 + 4x + 3 = 0$ (4) $4x^2 - 4x + 3 = 0$

61. هرگاه $f(x) = x^{10} + 1$ باشد، پس $f(i)$ مساوی است به:

- (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4) i

62. افاده $y = x^2 - 2x + 4$ برای کدام قیمت های x دارای اشاره مثبت است؟

- (1) $x > 0$ (2) $x < 0$
 (3) $2 < x < 1$ (4) تمام اعداد حقیقی

63. کدام یک از قیمت های x سیستم نامساوات $\left|1 - \frac{1}{x}\right| \leq 1$ را صدق می نماید:

- (1) $x \geq \frac{1}{2}$ (2) $x \leq \frac{1}{2}$
 (3) $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ (4) حل ندارد

64. حاصل جمع جذور تام نامساوات $\begin{cases} |x+2| < 4 \\ |x-1| > 3 \end{cases}$ عبارت است از:

- (1) 6 (2) 7 (3) -9 (4) -12

65. ست حل غیر مساوات $(2x - 8)(3x - 12) \geq 0$ عبارت است از:

- (1) $2 < x \leq 3$ (2) $8 < x < 12$
 (3) $-\infty < x < +\infty$ (4) $x > 8$

66. کدام یکی از نقاط ذیل، نامساوات دو مجهوله $\begin{cases} 2x - y > 2 \\ x + y < 0 \end{cases}$ را صدق می کند؟

- (1) $(0, -3)$ (2) $(6, 5)$ (3) $(0, 5)$ (4) $(4, 5)$

67. ست حل غیر مساوات $4x^2 - 5x + 8 > 3x^2 + x$ عبارت است از:

- (1) $(-\infty, -2) \cup (4, \infty)$ (2) $(-\infty, 4) \cup (2, +\infty)$

- (3) $(-\infty, 2) \cup (4, +\infty)$ (4) $3 < x < 4$

68. ست حل نامساوات $(3 - x)^2(x^2 + 3x + 7) \geq 0$ عبارت است از:

- (1) $(-5, \infty)$ (2) $[-7, -4] \cup [3, 4]$ (3) $(-7, -4) \cup (3, 4)$ (4) $\mathbb{R}$

69. حل نامساوات $\sqrt{x^2 + x} < \sqrt{x + 2}$ عبارت است از:

- (1) $x = \frac{2+\sqrt{5}}{2}$ (2) $-1 < x < 1$

- (3) $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ (4) $-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$

70. اگر $z = x + yi$ باشد، پس قیمت $|z - 2|$ مساوی است به:

- (1) x (2) $\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$

- (3) y^2 (4) $\sqrt{x^2 + y^2}$

71. حل های معادله $x^2 + 3ix - 2 = 0$ عبارت است از:

$$\begin{cases} x_1 = i \\ x_2 = -2i \end{cases} \quad (1) \quad \begin{cases} x_1 = i \\ x_2 = -2i \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} x_1 = -i \\ x_2 = 2i \end{cases} \quad (3) \quad \begin{cases} x_1 = -i \\ x_2 = 2i \end{cases} \quad (4)$$

72. اگر $m \in Z$ باشد، حاصل جمع جذور معادله $\frac{|2m-1|-9}{|m-3|} < 0$ عبارت است از:

$$(1) 0 \quad (2) 1 \quad (3) 2 \quad (4) 3$$

73. ست حل نامساوی $|x-2| < |x+3|$ عبارت است از:

$$\begin{aligned} (1) & (-\infty, -1) & (2) & (-1, 1) \\ (3) & \left(-\frac{1}{2}, \infty\right) & (4) & \left(-\frac{1}{2}, 1\right) \end{aligned}$$

74. حل نامساوات $|x^2 - 4x| < x$ عبارت است از:

$$\begin{aligned} (1) & 0 < x < 3 & (2) & 2 < x < 3 \\ (3) & 3 < x < 5 & (4) & 0 < x < 5 \end{aligned}$$

75. هرگاه $x \in Z$ و $\frac{(x^3+1)(x^2-4)}{|x-5|} > 0$ باشد کمترین قیمت x عبارت از:

$$\begin{aligned} (1) & -2 & (2) & -1 \\ (3) & 2 & (4) & 3 \end{aligned}$$

76. هرگاه z یک عدد مختلط باشد در افاده $3 + \bar{z} = (1 + 3i)z$ قیمت z عبارت از:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| $\frac{2}{3} - i$ (2) | $\frac{2}{3} + i$ (1) |
| $\frac{3}{2} + i$ (4) | $\frac{3}{2} - i$ (3) |

77. هرگاه z یک عدد مختلط باشد در افاده $z + 3i = \bar{z} \cdot 4i$ قیمت z عبارت از:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| $\frac{4}{5} + \frac{1}{5}i$ (2) | $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ (1) |
| $\frac{3}{7} - \frac{1}{7}i$ (4) | $\frac{1}{3} - \frac{4}{3}i$ (3) |

78. هرگاه $Z_1 = x + 5i$ و $Z_2 = 3 - 4i$ طوری که $|Z_1 - Z_2| = 15$ در این صورت $\sum x$ عبارت از:

- | | |
|--------|-------|
| 6 (2) | 3 (1) |
| 10 (4) | 9 (3) |

فصل چهارم

ترادف ها (تصاعد ها)

تصاعد: ردیف اعدادی که به طور منظم بر اساس یک اصل معین (جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم) استوار باشد ، تصاعد (ترادف) گفته می شود.

تصاعد حسابی: هرگاه حاصل تفریق هر جوره از حدود متعاقب در یک ردیف اعداد یک عدد مساوی باشد تصاعد حسابی گفته می شود.

در صورتی که a_1 حد اول ، d فرق مشترک ، n تعداد جملات ، a_n حد اخیر و S_n حاصل جمع را نشان دهند ، ترادف $(a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots)$ یک تصاعد حسابی را ارائه می نماید.

فرمول حد اخیر (حد a_n): در صورتی که a_1 حد اول ، d فرق مشترک ، n تعداد جملات یک تصاعد حسابی باشد پس حد اخیر آن از رابطه ذیل بدست می آید:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

حد وسطی تصاعد حسابی: در صورتیکه سه جمله متعاقب یک تصاعد حسابی a_{n-1}, a_n, a_{n+1} باشد حد وسطی آن $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ در حالیکه $n = 2, 3, 4, \dots$ باشد.

شامل سازی m جمله در تصاعد حسابی: در صورتیکه a_1 حد اول و a_n حد اخیر باشد و بخواهیم m جمله را شامل تصاعد نماید فرق مشترک از رابطه ذیل به دست می آید:

$$m = \frac{a_n - a}{m + 1}$$

همچنان هرگاه در یک تصاعد حسابی حدود n ام و m ام معلوم باشد قیمت d از رابطه ذیل به دست می آید:

$$d = \frac{a_n - a_m}{n - m}$$

حاصل جمع سلسله های حسابی: مجموعه تصاعد حسابی را سلسله حسابی می گویند.

یعنی $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$ که از روابط ذیل دریافت می گردد.

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) \quad \dots\dots\dots(2)$$

حاصل جمع اعداد یکسان (ثابت):

$$c + c + c + \dots\dots\dots + c = \sum_{i=1}^n c = c.n$$

حاصل جمع اعداد مسلسل طبیعی:

$$1 + 2 + 3 + \dots\dots\dots + n = \sum_{i=1}^n i$$

$$S_n = \frac{1}{2} n(n+1)$$

حاصل جمع مربعات اعداد مسلسل طبیعی:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2$$

$$S_n = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

حاصل جمع مکعبات اعداد مسلسل طبیعی:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{i=1}^n i^3$$

$$S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

حاصل جمع اعداد مسلسل طبیعی جفت:

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = \sum_{i=1}^n 2i$$

$$S_n = n(n+1)$$

حاصل جمع مربعات اعداد مسلسل طبیعی جفت:

$$2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + (2n)^2 = \sum_{i=1}^n (2i)^2$$

$$S_n = \frac{2}{3} n(n+1)(2n+1)$$

حاصل جمع مکعبات اعداد مسلسل طبیعی جفت:

$$2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + (2n)^3 = \sum_{i=1}^n (2i)^3$$

$$S_n = 2n^2(n+1)^2$$

حاصل جمع اعداد مسلسل طبیعی تاق:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = \sum_{i=1}^n (2i-1)$$

$$S_n = n^2$$

حاصل جمع مربعات اعداد مسلسل طبیعی تاق:

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \sum_{i=1}^n (2i-1)^2$$

$$S_n = \frac{1}{3}n(4n^2 - 1)^2$$

حاصل جمع مکعبات اعداد مسلسل طبیعی تاق:

$$1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n-1)^3 = \sum_{i=1}^n (2i-1)^3$$

$$S_n = n^2(2n^2 - 1)$$

مجموعه ضرب دو عدد پی در پی:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + (n-1) \cdot n = \sum_{i=1}^n (i-1)i$$

$$S_n = \frac{1}{3}n(n^2 - 1)$$

تصاعد هارمونیک:

یک ترادف اعداد a_n را زمانی تصاعد هارمونیک می گویند که معکوس آن یعنی $b_n = \frac{1}{a_n}$ یک تصاعد حسابی را

تشکیل می دهد. مثلاً: $\frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{3}{8}, \frac{1}{3}, \frac{3}{10}, \dots$ یک تصاعد هارمونیک است ، زیرا معکوس آن یک تصاعد حسابی است یعنی: $2, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}, 3, \frac{10}{3}, \dots$

اوسط حسابی هارمونیک:

در حالیکه a_{n-1}, a_n, a_{n+1} سه جمله مسلسل تصاعد حسابی و $n = 2, 3, 4, \dots$ باشد چنانچه $\frac{1}{a_{n-1}}, \frac{1}{a_n}, \frac{1}{a_{n+1}}$ حدود

تصاعد هارمونیک ان باشد پس اوسط حسابی هارمونیکی عبارت است از:

$$a_n = \frac{2(a_{n-1})(a_{n+1})}{a_{n-1} + a_{n+1}}$$

تصاعد هندسی:

در صورتیکه a_1 حد اول r, q نسبت مشترک ، n تعداد جملات ، a_n حد اخیر و S_n حاصل جمع را نشان دهد ،
ترادف $(a_1, a_1 r, a_1 r^2, a_1 r^3, \dots)$ یک تصاعد هندسی را ارائه می نماید.

فرمول حد اخیر: در صورتیکه a_1 حد اول r, q نسبت مشترک ، n تعداد جملات یک تصاعد هندسی باشد

$$a_n = a_1 r^{n-1} \quad , \quad a_n = a_1 q^{n-1} \quad \text{حد اخیر آن } a_n \text{ از رابطه ذیل بدست می آید.}$$

شامل سازی m جمله در تصاعد هندسی: جهت شامل سازی m جمله در بین تصاعد هندسی که a_1

حد اول ، a_n حد اخیر باشد ، از رابطه ذیل استفاده گردیده و نسبت مشترک دریافت می گردد.

$$r = \sqrt[m+1]{\frac{a_n}{a_1}} \quad , \quad q = \sqrt[m+1]{\frac{a_n}{a_1}}$$

حد وسطی تصاعد هندسی: هرگاه b, M, a سه حد مسلسل یک تصاعد هندسی معلوم باشد پس حد

$$M = \sqrt{a \cdot b} \quad , \quad M = \sqrt{(a_{n-1})(a_{n+1})} \quad \text{وسطی تصاعد مذکور عبارت است از:}$$

یادداشت: در صورتیکه a_1 حد اول و a_n حد اخیر یک تصاعد هندسی باشد حاصل ضرب n جمله آن عبارت است

$$\text{از: } P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$$

حاصل جمع سلسله های هندسی: با در نظر داشت a_1 حد اول ، $r(q)$ نسبت مشترک و n جملات می

توان حاصل جمع سلسله های هندسی را از روابط ذیل بدست آورد.

$$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad , \quad S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (1)$$

$$S_n = \frac{a_n \cdot r - a_1}{r - 1} \quad , \quad S_n = \frac{a_n \cdot q - a_1}{q - 1} \quad (2)$$

حاصل جمع سلسله های نامحدود هندسی: یک سلسله هندسی زمانی نامحدود است که $n \rightarrow \infty$

نماید ، مانند : $a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots$ سلسله های مذکور به دو حالت ذیل ملاحظه می گردد:

• هرگاه $q > 1$ باشد ، پس : $a_n \rightarrow \infty$ و سلسله متباعد بوده که $S_n = \infty$ می گردد.

• هرگاه $q < 1$ باشد ، پس : $a_n \rightarrow 0$ و سلسله متقارب بوده که $S_n = \frac{a_1}{1 - q}$ می گردد.

سوالات

1. اگر $a_1, a_2, a_3, \dots$ حدود یک ردیف $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots = d$ باشد، پس ردیف مذکور چه

نوع ردیف است:

- (1) حسابی
(2) هارمونیک
(3) هندسی
(4) هندسی و متزاید

2. هرگاه $2p, p+1, 2p+3$ ترادف حسابی را تشکیل دهند، پس قیمت p مساوی است به:

- (1) 2 (2) -2 (3) $-\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{2}$

3. اگر حد n -ام یک ردیف $a_n = (-1)^n \frac{5}{2}$ باشد، پس حد 200 -ام آن مساوی است به:

- (1) $\frac{5}{2}$ (2) 1000 (3) 500 (4) $-\frac{5}{2}$

4. اگر $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 5$ باشد جمله پنجم این ترادف عبارت از:

- (1) 11 (2) 16 (3) 21 (4) 26

5. اگر حاصل جمع حدود یک تصاعد حسابی به صورت $S_n = 4n^2 - 3n$ ارائه شده باشد حد اول آن عبارت است از:

- (1) 1 (2) 0 (3) 2 (4) 4

6. مجموعه سه حد اول یک تصاعد 31 است مجموع حد اول و حد سوم آن 26 است حد دوم عبارت است از:

- (1) 5 (2) 6 (3) 4 (4) 3

7. $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ مساوی است به:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \quad (4) \quad \sum_{i=1}^{m+n} a_i \quad (3) \quad \sum_{i=0}^n a_i \quad (2) \quad \sum_{i=1}^n a_i \quad (1)$$

8. ارایه سلسله اعداد $(1^2 - 1) + (2^2 - 1) + (3^2 - 1) + \dots + (n^2 - 1)$ بصورت سگما عبارت است از:

$$\sum_{k=1}^n (1 - k^2) \quad (2) \quad \sum_{k=1}^n (k^2 - 1) \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k^2 \quad (3)$$

(4) همه درست است

9. اگر حد اول یک ردیف هندسی 2 و نسبت مشترک آن 3 باشد، پس حد 50-ام مساوی است به:

$$a_{50} = 2 \cdot 3^{50} \quad (2) \quad a_{50} = 2 \cdot 3^{49} \quad (1)$$

$$a_{50} = 3 \cdot 2^{50} \quad (4) \quad a_{50} = 3 \cdot 2^{49} \quad (3)$$

10. در ترادف هندسی $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ طوریکه نسبت مشترک r باشد، پس a_{500} به شکل ذیل است:

$$a^{500} = a_4 \cdot r^{595} \quad (2) \quad a^{500} = a_3 \cdot r^{595} \quad (1)$$

$$a^{500} = a_2 \cdot r^{599} \quad (4) \quad a^{500} = a_4 \cdot r^{496} \quad (3)$$

11. اگر $\{a_{ij}\}_{n \in \mathbb{N}} = (-1)^{600n} \times 2$ یک ردیف باشد، پس تفاضل حدود 500-ام و 5000-ام آن مساوی است به:

$$0 \quad (2) \quad 2 \quad (1)$$

$$4 \quad (4) \quad 6 \quad (3)$$

12. در ردیف $1, 5, 9, \dots$ مجموع چند حد مساوی به 190 می شود؟

$$n = 25 \quad (2) \quad n = 7 \quad (1)$$

$$n = 15 \quad (4) \quad n = 10 \quad (3)$$

13. اگر در یک ردیف حسابی حد پنجم 20 و حد پانزدهم 80 باشد، پس حد اول آن عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} a_1 = -4 & (1) \\ a_1 = 4 & (3) \\ a_1 = 3 & (2) \\ a_1 = 5 & (4) \end{array}$$

14. $\sum_{i=1}^{60} i$ مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} 1835 & (1) \\ 1838 & (3) \\ 1834 & (2) \\ 1830 & (4) \end{array}$$

15. در ترادف $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ طوریکه نسبت مشترک r باشد، پس حد a_{800} به شکل ذیل است:

$$\begin{array}{ll} a_{800} = a_4 r^{799} & (1) \\ a_{800} = a_6 r^{794} & (3) \\ a_{800} = a_4 r^{794} & (2) \\ a_{800} = a_3 r^{794} & (4) \end{array}$$

16. اگر حد اول یک ردیف حسابی 2000 باشد، پس حد 3000-ام عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} a_{3000} = 2000 + 3001d & (1) \\ a_{3000} = 2000 & (3) \\ a_{3000} = 3000 & (2) \\ a_{3000} = 2000 + 2999d & (4) \end{array}$$

17. در ترادف $a_n = \frac{n+5}{2n-4}$ قیمت $a_1 + a_3$ عبارت از:

$$\begin{array}{ll} 1 & (1) \\ 4 & (3) \\ 2 & (2) \\ 6 & (4) \end{array}$$

18. هرگاه ترادف $a_n = \begin{cases} n-1, n=0(mod3) \\ 2n+4, n=1(mod3) \\ n^2-n, n=2(mod3) \end{cases}$ داده شده باشد قیمت $\frac{a_5}{a_6} \cdot a_{13}$ عبارت از:

$$\begin{array}{ll} 60 & (1) \\ 120 & (3) \\ 80 & (2) \\ 150 & (4) \end{array}$$

19. در ردیف $a_n = \begin{cases} 2n, n=0(mod3) \\ n-1, n=1(mod3) \\ \frac{(n+1)}{3}, n=2(mod3) \end{cases}$ قیمت $a_{14} + a_9 + a_{22}$ عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} 22 & (1) \\ 26 & (2) \\ 42 & (3) \\ 44 & (4) \end{array}$$

20. در ردیف $40, \dots, 5, 0, -5$ مجموع حدود آن مساوی است به:

$$(1) 170 \quad (2) 175 \quad (3) 180 \quad (4) 165$$

21. اگر در یک ردیف حسابی حد 35-ام آن 750 و حد 10-ام آن 50 باشد، فرق مشترک ردیف

عبارت از:

$$(1) 28 \quad (2) 25 \quad (3) 26 \quad (4) 23$$

22. در سلسله $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots$ حد مساوی است به:

$$(1) S_{n+1} = n^2 + 1 \quad (2) S_{n+1} = (n+1)^2$$

$$(3) S_{n+1} = n^2 \quad (4) S_{n+1} = n^2 - 1$$

23. در یک ترادف حسابی $a_{31} = 5$ و $a_{30} = \frac{34}{5}$ است، پس حد a_3 آن مساوی است به:

$$(1) a_3 = 1 \quad (2) a_3 = \frac{7}{5} \quad (3) a_3 = \frac{5}{2} \quad (4) a_3 = \frac{2}{5}$$

24. در یک ترادف حسابی $a_{11} = 7$ و $a_{12} = 3$ است، پس حد a_4 مساوی است به:

$$(1) a_4 = 1 \quad (2) a_4 = \frac{7}{5} \quad (3) a_4 = \frac{9}{5} \quad (4) a_4 = \frac{8}{5}$$

25. در ترادف حسابی $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ طوریکه فرق مشترک d باشد، پس حد a_{202} به شکل ذیل

است :

$$(1) a_{202} = a_1 + 2000d \quad (2) a_{202} = a_2 + 2000d$$

$$(3) a_{202} = a_1 + 2001d \quad (4) a_{202} = a_1 + 201d$$

26. در ردیف $8, 10, 12, \dots$ حد چندم $a_n = 46$ میشود:

$$n = 20 \quad (1) \quad n = 30 \quad (2) \quad n = 40 \quad (3) \quad n = 10 \quad (4)$$

27. در ترادف $a_n = \frac{2^n}{n!}$ و حد a_5 عبارت است از:

$$a_5 = \frac{32}{24} \quad (1) \quad \frac{32}{220} \quad (2) \quad \frac{120}{32} \quad (3) \quad \frac{4}{15} \quad (4)$$

28. $x, x^2, x^3, \dots$, $x > 1$ چه نوع یک ردیف است:

$$(1) \text{ هارمونیک} \quad (2) \text{ متناقص} \quad (3) \text{ حسابی} \quad (4) \text{ هندسی}$$

29. اگر $a_n = (-1)^n \frac{3}{5}$ یک ردیف حسابی باشد، پس فرق مشترک آن عبارت است از:

$$d = \frac{9}{25} \quad (1) \quad d = 0 \quad (2) \quad d = 1 \quad (3) \quad d = \frac{7}{5} \quad (4)$$

30. اگر حد n -ام یک ردیف $a_n = \frac{(-1)^n}{n-1}$ باشد، پس حد دهم این ردیف مساوی است به:

$$2 \quad (1) \quad 11 \quad (2) \quad 9 \quad (3) \quad \frac{1}{9} \quad (4)$$

31. اگر a_m و a_n ام یک ردیف حسابی باشد، پس فرق مشترک آن عبارت است از:

$$\begin{aligned} d &= \frac{a_n - a_m}{n - m} \quad (1) & d &= \frac{a_n + a_m}{n + m} \quad (2) \\ d &= \frac{n - m}{a_n - a_m} \quad (3) & d &= \frac{a_n - a_m}{n - m} \quad (4) \end{aligned}$$

32. اگر حد اول یک ردیف حسابی 2000 باشد، پس حد 3000-ام عبارت است از:

$$\begin{aligned} a_{3000} &= 2000 + 3001d \quad (1) & a_{3000} &= 3000 \quad (2) \\ a_{3000} &= 20000 \quad (3) & a_{3000} &= 2000 + 2999d \quad (4) \end{aligned}$$

33. اگر در یک ردیف هندسی $a_{30} = 64$ و نسبت مشترک آن $r = \frac{1}{4}$ باشد، پس حد اول آن عبارت از:

$$\begin{array}{ll} a_1 = 4^{26} & (1) \\ a_1 = 4^{31} & (3) \\ a_1 = 4^{30} & (2) \\ a_1 = 4^{32} & (4) \end{array}$$

34. ردیف $x \in IR^+, x, x^2, x^3, \dots$ متناقص است اگر:

$$x < 0 \quad (1) \quad 0 < x < 1 \quad (2) \quad x > 1 \quad (3) \quad x > 0 \quad (4)$$

35. مجموع ده حد ردیف $2, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \dots$ مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} S_{10} = 3^{10} - 1 & (1) \\ S_{10} = \frac{3^{10} - 1}{3^9} & (3) \\ S_{10} = \frac{3^9}{3^{10} - 1} & (2) \\ S_{10} = \frac{3^{10} - 1}{3^9} & (4) \end{array}$$

36. حاصل $0.12 + 0.0012 + 0.000012 + \dots$ مساوی است به:

$$\frac{11}{99} \quad (1) \quad \frac{12}{99} \quad (2) \quad \frac{99}{12} \quad (3) \quad \frac{12}{10} \quad (4)$$

37. در ترادف $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ طوریکه نسبت مشترک r باشد، پس حد a_{800} به شکل ذیل است:

$$\begin{array}{ll} a_{800} = a_4 r^{799} & (1) \\ a_{800} = a_6 r^{794} & (3) \\ a_{800} = a_4 r^{794} & (2) \\ a_{800} = a_3 r^{794} & (4) \end{array}$$

38. $\sum_{i=1}^{10} 2$ مساوی است به:

$$20 \quad (1) \quad 40 \quad (2) \quad 30 \quad (3) \quad 10 \quad (4)$$

39. در ردیف $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{9}, \dots$ حد n -ام عبارت است از:

$$a_n = \frac{1}{n-3} \quad (1) \quad a_n = \frac{1}{n} \quad (2) \quad a_n = \frac{1}{3n} \quad (3) \quad a_n = 3n \quad (4)$$

40. $\sum_{i=1}^p x$ مساوی است به:

$$px \quad (1) \quad (p-1)x \quad (2) \quad p+1 \quad (3) \quad (p+1)x \quad (4)$$

41. در ردیف $4, 12, 36, \dots$ حد n -ام مساوی است به:

$$a_n = \frac{4}{3} 3^n \quad (1) \quad a_n = \frac{4}{3} 3^{n-1} \quad (2) \\ a_n = 4 \cdot 3^{n+2} \quad (3) \quad a_n = 4 \cdot 3^{n+1} \quad (4)$$

42. مجموعه $\sum_{i=1}^8 (i+2)$ مساوی است به:

$$5i+20 \quad (1) \quad 6i+12 \quad (2) \quad 5i+10 \quad (3) \quad 52 \quad (4)$$

43. $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ مساوی است به:

$$\sum_{i=1}^n a_{i+1} \quad (1) \quad \sum_{i=1}^n a_i \quad (2) \quad \sum_{i=1}^{n+1} a_i \quad (3) \quad \sum_{i=0}^n a_i \quad (4)$$

44. اگر $\{a_{ij}\}_{n \in \mathbb{N}} = (-1)^{600n} \times 2$ یک ردیف باشد، پس تفاضل حدود 500-ام و 5000-ام

آن مساوی است به:

$$2 \quad (1) \quad 0 \quad (2) \quad 6 \quad (3) \quad 4 \quad (4)$$

45. هرگاه a, b, c جملات متوالی یک ترادف هندسی باشند در این صورت:

$$b^2 = \frac{a}{c} \quad (1) \quad b^2 = ac \quad (2) \quad b^2 = 2ac \quad (3) \quad b^2 = \frac{2a}{c} \quad (4)$$

46. اگر $q + q^2 + q^3 + \dots$ یک سلسله هندسی و $|q| < 1$ باشد، پس مجموع مذکور مساوی است به:

$$\frac{q}{1-q} \quad (1) \quad \frac{1}{1+q} \quad (2) \quad 1 - q \quad (3) \quad \frac{q}{1+q} \quad (4)$$

47. در ترادف هندسی $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ طوریکه نسبت مشترک r باشد، پس a_{500} به شکل ذیل است:

$$\begin{aligned} a^{500} &= a_3 \cdot r^{595} \quad (1) & a^{500} &= a_4 \cdot r^{595} \quad (2) \\ a^{500} &= a_4 \cdot r^{496} \quad (3) & a^{500} &= a_2 \cdot r^{599} \quad (4) \end{aligned}$$

48. معکوس مضربهای عدد 5 کدام نوع ردیف می باشند:

$$\begin{aligned} (1) \text{ ردیف هارمونیکی} & & (2) \text{ ردیف متناوب} \\ (3) \text{ ردیف هندسی} & & (4) \text{ ردیف حسابی} \end{aligned}$$

49. $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{7}$ مساوی است به:

$$\sum_{i=2} \sqrt{i} \quad (1) \quad \sum_{i=1} \sqrt{i} \quad (2) \quad \sum_{i=2} \sqrt{2i} \quad (3) \quad \sum_{i=-2} \sqrt{i} \quad (4)$$

50. مجموعه $\frac{1}{5^{n-1}} \sum_{k=1}^n 5^{k-1}$ مساوی است به:

$$\frac{1}{4} \quad (1) \quad 0.4 \quad (2) \quad 4 \quad (3) \quad \frac{1}{2} \quad (4)$$

51. مجموع نامتناهی $S_{\infty} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k + 2^k}{5^k}$ عبارت است از:

- (1) 2 (2) $\frac{13}{6}$ (3) 3 (4) $\frac{17}{6}$

فصل پنجم

لوگارتیم

تعریف: طرز ارائه دیگر طاقت لوگارتیم گفته می شود یا به عباره دیگر لوگارتیم عبارت از طرز محاسبه توان مجهول می باشد.

در صورتیکه $x \in R, a \neq 1, N > 0$ باشد: $N = a^x$ یک تابع اکسپونشیل باشد سپس معکوس آن تابع لوگارتیمی گفته می شود. یعنی:

$$a^x = N \Rightarrow \log_a N = x$$

بخطا داشته باشید که a قاعده لوگارتیم، x نتیجه لوگارتیم و N انتی لوگارتیم x نامیده میشود یعنی:

$$\text{anti log } x = N$$

انواع لوگارتیم: بطور عموم لوگارتیم به دو نوع می باشد.

(1) لوگارتیم اعشاری (لوگارتیم معمولی): که قاعده آن (10) است یعنی:

$$\log_{10} N = \log N$$

طوری که:

مانتیس + کرکترستیک (مشخصه) $\log N =$

مشخصه لوگارتیم مذکور از تعداد m رقم اعداد صحیح به اندازه $(m-1)$ می باشد و برای اعداد کوچکتر از یک به تعداد مجموعه m صفر طرف چپ، مشخصه آن $(-m)$ می باشد.

مانتیس لوگارتیم قسمت اعشاری نتیجه لوگارتیم بوده که به کمک جدول لوگارتیم یا ماشین های حساب قابل دریافت می باشد.

2) لوگارتیم غیر اعشاری: که قاعده آن غیر از عدد (10) است که یکی از جمله لوگارتیم های غیر اعشاری لوگارتیم طبیعی به قاعده e می باشد، یعنی: $\log_e N = \ln N$

خواص لوگارتیم: در حالیکه $a \neq 1$ و اعداد مانند $M > 0$ و $N > 0$ باشد، برای لوگارتیم خواص ذیل وجود دارد:

- 1) $\log_a 1 = 0$
- 2) $\log_a a = 1$
- 3) $\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$
- 4) $\log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N$
- 5) $\log_a \left(\frac{1}{M} \right) = -\log_a M = \text{co} \log_a M$
- 6) $\log_a M^n = n \log_a M$
- 7) $\log_a \sqrt[n]{M^p} = \frac{p}{n} \log_a M$
- 8) $\log_a M = \frac{1}{\log_M a}$
- 9) $\log_{a^m} M^n = \frac{n}{m} \log_a M$
- 10) $\log_a M = \frac{\log_c M}{\log_c N}$
- 11) $a^{\log_a M} = x \Rightarrow x = M$
- 12) $\log_b a \cdot \log_c b \cdot \log_d c \cdots \log_n m = \log_n a$
- 13) $\log_c [\log_b (\log_a x)] = n \Rightarrow x = a^{b^{c^n}}$
- 14) $a^{\log_b x} = c^{\log_b x} \Rightarrow a^{\log_b x} = a^{\log_b c} \Rightarrow \log_b x = \log_b c \Rightarrow x = c$

سوالات

1. مانتیس $\log 582$ مساوی است به:

- (1) $\log 58.2$ (2) $\log 5.082$ (3) $\log 5.82$ (4) $\log 0.582$

2. انتی لوگاریتم $anti \log_3 \left(\frac{1}{2} \right)$ مساوی است به:

- (1) $\sqrt{2}$ (2) $\sqrt[3]{2}$ (3) $\sqrt{3}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. $\ln x$ مساوی است به:

- (1) $\log_{10} e \cdot \log x$ (2) $-\ln x$
(3) $-\log_{10} e \cdot \ln x$ (4) $\ln 10 \cdot \log x$

4. قیمت عددی $\frac{1 + \log 90}{\log 30}$ عبارت است از:

- (1) 3 (2) 1 (3) 4 (4) 2

5. اگر $\log 9.53 = 0.9791$ باشد، $Anti \log 0.9791$ عبارت است از:

- (1) 9.53 (2) 953 (3) 95.3 (4) 9.35

6. اگر a, b, c یک تصاعد هندسی باشد آنگاه $\frac{1}{\log_c x}, \frac{1}{\log_b x}, \frac{1}{\log_a x}$ عبارت از:

- (1) تصاعد هارمونیک (2) تصاعد حسابی (3) تصاعد هندسی (4) هیچکدام

$$7. \log \operatorname{tg} 3^\circ . \log \operatorname{tg} 6^\circ . \log \operatorname{tg} 9^\circ \dots \dots \log \operatorname{tg} 87^\circ = ?$$

$$\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \quad (4) \quad \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \quad (3) \quad 0 \quad (2) \quad 1 \quad (1)$$

$$8. \text{کرکترستیک لوگارتم } \log \left(\frac{0.000001}{0.1} \right) \text{ مساوی است به:}$$

$$-4 \quad (2) \quad -6 \quad (1) \\ -5 \quad (4) \quad 5 \quad (3)$$

$$9. \text{مانتیس } \log 0.7114 \text{ عبارت است از:}$$

$$\log 0.174 \quad (4) \quad \log 714 \quad (3) \quad \log 7.14 \quad (2) \quad \log 7.114 \quad (1)$$

$$10. \text{مانتیس } \log 5231 \text{ عبارت است از:}$$

$$\log 5231 \quad (4) \quad \log 0.5231 \quad (3) \quad \log 5.231 \quad (2) \quad \log 52)31 \quad (1)$$

$$11. \text{اگر } \log_2 3 = a \text{ باشد، در این صورت قیمت } \log_3 48 \text{ عبارت است از:}$$

$$\frac{a+4}{a} \quad (4) \quad \frac{a+3}{a} \quad (3) \quad \frac{a-3}{a} \quad (2) \quad \frac{a+2}{a} \quad (1)$$

$$12. \text{کرکترستیک } \log((0.0025)(0.00023)) \text{ مساوی است به:}$$

$$-7 \quad (4) \quad -6 \quad (3) \quad 12 \quad (2) \quad 7 \quad (1)$$

$$13. \text{حاصل افاده } \sqrt{\left(\log \left(\frac{80! \cdot 10!}{8! \cdot 78! \cdot 79 \cdot 9} + \frac{20! \cdot 10!}{8! \cdot 18! \cdot 19 \cdot 9} \right) \right)} \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (4) \quad \text{تعریف نشده است} \quad (3) \quad \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (2) \quad \sqrt{3} \quad (1)$$

$$14. \text{اگر } \log 9.85 = 0.9934 \text{ باشد، پس } \ln 9.85 \text{ مساوی است به:}$$

$$4,8531 \quad (4) \quad 5.8134 \quad (3) \quad 3,8451 \quad (2) \quad 2,2874 \quad (1)$$

15. هرگاه $\log_2 3 = a$ و $\log_2 7 = b$ باشد قیمت افاده $\log_6 21$ عبارت است از:

$$\frac{a+b}{a} (4) \quad \frac{a+b}{a-1} (3) \quad \frac{a+b}{a+1} (2) \quad \frac{a-b}{a+1} (1)$$

16. قیمت افاده لوگاریتمی $\ln 4 \cdot \log_4 9 \cdot \log_3 e$ عبارت از:

$$2 (4) \quad \ln 5 (3) \quad 4 (2) \quad 1 (1)$$

17. قیمت افاده لوگاریتمی

$$\frac{2}{3} \log(x^2 - y^2) - \frac{1}{2} [\log(x - y) + \log(x + y)]$$

$$\log \sqrt[3]{x^2 - y^2} (2) \quad \log \sqrt[6]{x^2 - y^2} (1)$$

$$\log \sqrt[3]{x^2 + y^2} (4) \quad \log \sqrt[6]{x^2 + y^2} (3)$$

18. هرگاه $\log_a b = 2$ ، $\log_b c = 3$ و $\log_c d = 4$ باشد، قیمت $\log_a(a \cdot b \cdot c \cdot d)$ عبارت


از:

$$26 (4) \quad 27 (3) \quad 33 (2) \quad 30 (1)$$

19. قیمت افاده لوگاریتمی $\log_x(e^{2 \ln x} \cdot 100^{\log x})$ عبارت از:

$$\frac{x}{e} (4) \quad x^2 (3) \quad 4 (2) \quad 2 (1)$$

20. با در نظر داشت گراف ذیل قیمت $\log_a 4^a$ عبارت است از:



$$8 (1)$$

$$4 (2)$$

$$2 (3)$$

$$\frac{1}{2} (4)$$

21. قیمت افاده لوگاریتمی $\frac{\log_x 8}{\log_y 3} \cdot \frac{\log_y (\frac{1}{9})}{\log_x (\frac{1}{2})}$ عبارت از:

- 3 (1) -4 (2) 6 (3) 24 (4)

22. مانتیس $\log \left(\frac{8}{1000} + 8 \right)$ عبارت از ؟

- log 8,008 (2) log 0,8008 (1)
log 8,008 (4) log 8,0008 (3)

23. مانتیس $\log 5231$ عبارت از:

- log 5231 (4) log 0.5231 (3) log 5.231 (2) log 52)31 (1)

24. کرکترستیک $\log[(0.08)(0.003)]$ مساوی است به:

- 5 (4) 4 (3) -4 (2) 5 (1)

25. افاده لوگاریتمی $\log_5 14 \cdot \log_{14} 25$ مساوی است به:

- 0 (4) -1 (3) 1 (2) 2 (1)

26. شکل ساده $\log^5(4900)$ عبارت از:

- 32 log(70) (2) 10 $\log^{50}(49)$ (1)
 $(\log(49) + 2)^5$ (4) $32(\log(49) + 2)^5$ (3)

27. مانتیس لوگارتم $\log 40.00009$ عبارت از:

- log 4,0009 (2) log 4,9 (1)

$$\log 4,9 \cdot 10^3 (4)$$

$$\log 4,000009 (1)$$

28. حاصل افاده $\log \left(\frac{80! \cdot 10!}{8! \cdot 78! \cdot 79 \cdot 9} + \frac{20! \cdot 10!}{8! \cdot 18! \cdot 19 \cdot 9} \right)$ مساوی است به:

$$6 (4)$$

$$9 (3)$$

$$3 (2)$$

$$4 (1)$$

29. شکل ساده شده افاده $\log^3 \log_5^2 (25)$ مساوی است به:

$$8 \log^3 (2) (4)$$

$$\log^3 (2) (3)$$

$$6 \log (2) (2)$$

$$2 \log^3 (2) (1)$$

30. $\log 7 \cdot \log_7 10$ مساوی است به:

$$3 (4)$$

$$2 (3)$$

$$-1 (2)$$

$$1 (1)$$

31. $\log_b x^7 \log_a b$ مساوی است به:

$$7 \log_a x (4)$$

$$\log_a bx (3)$$

$$\log_a x (2)$$

$$\log_b x (1)$$

32. $colog 100$ مساوی است به:

$$\log \frac{1}{1000} (4)$$

$$100 (3)$$

$$\log 100 (2)$$

$$\log \frac{1}{100} (1)$$

33. مانتیس لوگارتم $\log \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} \right)$ عبارت است از:

$$\log 5 (4)$$

$$\log \sqrt{2} (3)$$

$$(2) \text{ مانتیس ندارد}$$

$$\log \frac{1}{2} (1)$$

34. $\log_b m$ مساوی است به:

$$-\log_m b (4)$$

$$\log_m b (3)$$

$$\frac{\log_a m}{\log_a b} (2)$$

$$\frac{\log_a b}{\log_a m} (1)$$

35. اگر $\log_2 3 = a$ باشد، در این صورت قیمت $\log_3 48$ عبارت است از:

$$\frac{a+2}{a} \quad (1) \quad \frac{a-3}{a} \quad (2) \quad \frac{a+3}{a} \quad (3) \quad \frac{a+4}{a} \quad (4)$$

36. کرکترستیک $\log(1.\bar{2} \times 1.\bar{9})$ مساوی است به:

$$1 \quad (1) \quad 0 \quad (2) \quad 2 \quad (3) \quad \text{تعریف نشده است} \quad (4)$$

37. اگر $\log 5.34 = 0.7275$ باشد، پس $\ln 5.34$ مساوی است به:

$$2)6751 \quad (1) \quad 1.6751 \quad (2) \quad -2)6751 \quad (3) \quad -1.6751 \quad (4)$$

38. قیمت $p(\log_4 2)$ درپولینوم $p(x) = x^5$ مساوی است به:

$$20 \log_2 2 \quad (2) \quad 20 \log_2 10 \quad (1) \quad 1024 \log_2 2 \quad (4) \quad 1024 \log_2 10 \quad (3)$$

39. در معادله لوگارتیمی $1 + \ln(e - x) = \ln(x + 3)$ قیمت x مساویست به:

$$\frac{e-1}{e^2+3} \quad (4) \quad \frac{e^2-1}{e+3} \quad (3) \quad \frac{e+3}{e-1} \quad (2) \quad \frac{e^2-3}{e+1} \quad (1)$$

40. قیمت x در معادله نمایی $(\sqrt[3]{x})^{-2+\log_x 11} = 11$ عبارت است از:

$$x = -\frac{1}{11} \quad (1) \quad x = \frac{1}{11} \quad (2) \quad x = 11 \quad (3) \quad x = -11 \quad (4)$$

41. ست حل معادله $x^{\ln x} - e^6 \cdot x = 0$ عبارت از:

$$\{e^3, \frac{1}{e^2}\} \quad (1) \quad \{e^3, \frac{1}{e^3}\} \quad (2) \quad \{e, \frac{1}{e}\} \quad (3) \quad \text{حل ندارد} \quad (4)$$

42. قیمت x در معادله لوگاریتمی $\log_2(4\sin(x + \frac{\pi}{2})) = 2$ عبارت از:

- (1) 2 (2) 1 (3) $\frac{1}{2}$ (4) 0

43. اگر $\ln(xy) = 3$ و $\ln x - \ln y = 1$ باشد در این صورت قیمت های x و y عبارت از:

- (1) (e^2, e) (2) (e^2, e^2) (3) (e^3, e^2) (4) (e^3, e^3)

44. حل غیر مساوات $\log_{0.5} \frac{2-x}{3} < 0$ عبارت از:

- (1) $x < -1$ (2) $x > -1$ (3) $x < 1$ (4) $x > 1$

45. قیمت x در معادله $\log_5^{-x} + \log_5^{(4-x)} = \log_5^{12}$ عبارت است از:

- (1) -2 (2) 6 (3) -4 (4) 1 و 2 درست است

46. برای کدام قیمت x معادله $\frac{2 \log_{10} x}{\log_{10}(5x-4)} = 1$ صدق میکند:

- (1) 5 (2) 3 (3) 4 (4) 2

47. حل معادله $\log^3(x+1)^{\frac{1}{4}} = 27$ مساوی است به:

- (1) $x = 10^{12} - 1$ (2) $x = 10^{12} - 12$ (3) $x = 10^{12} + 1$ (4) $x = 10^{12} + 12$

48. در معادله لوگاریتمی $2^{\log x} = 3^{\log 2}$ قیمت x عبارت است از:

- (1) 5 (2) 7 (3) 3 (4) 9

49. حاصل ضرب جذور معادله $(\log_3 x)^2 - 5 \log_3 x + 6 = 0$ عبارت از:

- 3^{-7} (1) 3^{-3} (2) 3^2 (3) 3^5 (4)

50. هرگاه $x \in Z$ باشد حاصل جمع جذور نامساوی $\log_3(x+1) + 1 < \log_3 25$ عبارت از:

- 25 (1) 26 (2) 27 (3) 28 (4)

51. قیمت x در معادله $e^x - 12e^{-x} - 4 = 0$ عبارت از:

- $\ln 2$ (1) $\ln 4$ (2) $\ln 6$ (3) $\ln 8$ (4)

52. قیمت x در معادله لوگاریتمی $\log_5[5 \log_2 2(\ln(x+1))] = 1$ عبارت از:

- $e - 2$ (1) $e - 1$ (2) $e + 1$ (3) e^2 (4)

53. قیمت x در معادله لوگاریتمی $\frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_6 x} + \frac{1}{\log_9 x} = 2^{\log_8 27}$ عبارت از:

- 4 (1) 6 (2) 9 (3) 10 (4)

54. قیمت x در معادله لوگاریتمی $(\log_{\sqrt{2}} x)(\log_x \sqrt{2})^2 = 2$ عبارت است از:

- $\sqrt{2}$ (1) $\sqrt[3]{2}$ (2) $\sqrt[4]{2}$ (3) $\sqrt[5]{2}$ (4)

55. قیمت x در معادله $\log_x 2 = \log_{2x} 8$ عبارت از:

- $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (1) $\sqrt{2}$ (2) $2\sqrt{2}$ (4) 2 (3)

56. حل معادله لوگاریتمی $\log_2 x + \log_x 2 = \frac{e^2+1}{e}$ مساوی است به:

$x = 2^e$ (4) $x = 4^e$ (3) $x = e^2$ (2) $x = e$ (1)

57. در معادله $2^{\log_2(2x+4)} = 2^4$ قیمت x مساوی است به:

$x = 6$ (4) $x = 7$ (3) $x = -6$ (2) $x = 0$ (1)

58. در معادله $\log_5(x-1) - \log_5(x-2) = \log_5 2$ قیمت x مساوی است به:

$x = \frac{1}{3}$ (4) $x = 3$ (3) $x = 2$ (2) $x = -3$ (1)

59. قیمت x در معادله $\log_2 \frac{1}{2} + \log_2(x+1) = 1$ مساوی است به:

$x = -1$ (4) $x = 1$ (3) $x = 3$ (2) $x = -3$ (1)

60. در معادله $5^{x+2} = 7$ قیمت x مساوی است به:

$x = \log_3 7 - 2$ (2) $x = \log_x 5 - 2$ (1)

$x = \log_7 5 + 2$ (4) $x = \log_5 7 - 2$ (3)

61. حل معادله $\log^5 x^3 = 243$ مساوی است به:

$x = 100$ (2) $x = 0.100$ (1)

$x = 0.001$ (4) $x = 10$ (3)

62. در معادله لوگاریتمی $1 + \ln(e-x) = \ln(x+3)$ قیمت x مساوی است به:

$\frac{e+3}{e-1}$ (4) $\frac{e^2-1}{e+1}$ (3) $\frac{(e-1)}{e^2+3}$ (2) $\frac{e^2-1}{e+3}$ (1)

63. قیمت x در معادله $\log_3 \frac{1}{3} + \log_3(x + 1) = 1$ مساوی میشود به:

$$x = 2 \quad (4) \qquad x = 4 \quad (3) \qquad x = -5 \quad (2) \qquad x = 8 \quad (1)$$

64. قیمت x در معادله لوگاریتمی $\log_a x = \frac{1}{3} \log_a 8$ عبارت است از:

$$4 \quad (4) \qquad -4 \quad (3) \qquad -2 \quad (2) \qquad 2 \quad (1)$$

65. قیمت x در معادله $\frac{\log_2 x}{\log_2 5} + \log 10 = 0$ مساوی است به:

$$x = 5 \quad (4) \qquad x = 2 \quad (3) \qquad x = \frac{1}{5} \quad (2) \qquad x = \frac{1}{2} \quad (1)$$

فصل ششم


متحول و تابع

متحول: یک سمبول بوده که به عوض هر عنصر یک س ت غیر خالی وضع گردد و یا به عباره دیگر کمیت که آزادانه و بدون قید و شرط قیمت های مختلف را به خود اختیار نماید متحول نامیده می شود.

مثلاً: $A = \{x / x \in \mathbb{N}, x \geq 3\}$ که درست مذکور x از 3 الی بی نهایت اعداد طبیعی را گرفته میتواند.

ثابت: چون قیمت یک عدد تغییر نمیکند مثلاً عدد 4 با عدد 3 و 5 هیچگاه مساوی نیست ، پس تمام اعداد حقیقی ثابت گفته می شوند.

انتروال: فاصله که در آن یک متحول تغییر و تحول می نماید بنام فاصله (ساحه تحول) یا انتروال یاد می گردد و به شکل دیده میشود.



$$a \leq x \leq b \Rightarrow [a, b] \quad \text{1) انتروال بسته}$$

$$a < x < b \Rightarrow (a, b) \quad \text{2) انتروال باز}$$

$$\begin{aligned} a \leq x < b &\Rightarrow [a, b) \\ a < x \leq b &\Rightarrow (a, b] \end{aligned} \quad \text{3) انتروال نیمه بسته (نیمه باز)}$$

رابطه: چون میدانیم (x, y) یک جوره مرتب روی سیستم کمیات وضعیه قایم می باشد، پس هرگاه A و B دو ست غیر خالی باشد، هر ست فرعی $A \times B$ از A به B یک رابطه است، یعنی $a \in A$ و $b \in B$ باشد، و $(a, b) \in IR$ باشد پس گفته میشود که a به همراهی b رابطه دارد به شکل (aRb) ارائه می گردد.

مثلاً اگر $A = \{2, 3, 5\}$ و $B = \{k, t\}$ باشد، پس: $A \times B = \{(2, k), (2, t), (3, k), (3, t), (5, k), (5, t)\}$ پس هر ست فرعی این ست عبارت از یک رابطه است:

$$R_1 = \{(2, k)\}$$

$$R_2 = \{(2, k), (2, t), (3, k)\}$$

$$R_3 = \{(3, k), (3, t), (2, k), (5, k)\} \dots\dots\dots$$

که تعداد عناصر از A به B در حالیکه A به تعداد n عناصر و B به تعداد m عناصر داشته باشد عبارت از $n \times m$ است، و تعداد روابط این ست عبارت از تعداد ست های فرعی آن می باشد که عبارت از $2^{n \times m}$ می باشد.

تابع: کمیت که تمام تحولات آن وابسته به تحولات یک متحول باشد تابع نامیده میشود، و یا به عباره دیگر تابع چنان رابطه یا قاعده بین دو ست است که برای هر عنصر از ست اولی (ست ناحیه تعریف *Domian*) تنها و تنها یک عنصر در ست دومی (ست ناحیه قیمت ها *Range*) ارتباط داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که $Range \subseteq codomain$ میباشد.

که برای بار اول مفهوم تابع و متحول توسط ایولر (*Euler*) عالم سوییسی به شکل ریاضی $y = f(x)$ ارائه گردید.

انواع توابع

توابع انواع مختلف دارد، مانند:

تابع ثابت: که به شکل $f(x) = c$ ارائه میگردد طوری که $c \in IR$ است، مثلاً $y = -5$, $y = 2$, $\dots$

تابع پولینومیل: که به شکل $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ارائه می گردد

، مثلاً $g(x) = 2x^4 - 5x^2 + 3$, $f(x) = x^2 - 5x + 1$, $f(x) = 2x + 5$, $\dots$

به خاطر داشته باشید که تابع پولینومیل درجه اول را تابع خطی و درجه دوم را تابع پارابولی نیز یاد میکنند.

توابع مثلثاتی: مانند

$$\dots, f(x) = \sec^2(2x+1), f(x) = 5 \tan x, f(x) = \cos x^3, f(x) = \sin x$$

توابع لوگاریتمی: مانند $\dots, g(x) = \ln x, f(x) = \log_a x$

توابع اکسپونینشل (نمایی): مانند $f(x) = a^x$ (درحالیکه $a > 1$ است)

$$\dots, g(x) = 5^x$$

توابع ناطق (کسری): مانند

$$\dots, h(x) = \frac{5x^2 + x^3 - 1}{x^3 + 4x}, g(x) = \frac{3x^3}{\ln x^2}, f(x) = \frac{\sin^2 x}{4 + \cos x}$$

تابع غیر ناطق (جذری): مانند

$$\dots w(x) = \sqrt{\log_4(x^2 + 4)}, h(x) = \sqrt[4]{\tan^3 x}, g(x) = \sqrt[5]{\sin^3 x}, f(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}, f(x) = \sqrt{5x^2 + 4}$$

تابع عینیت: که قیمت های متحول و تابع با هم مساوی باشد:

$$f(x) = x$$

تابع قیمت مطلقه: مانند:

$$f(x) = |x|$$

تابع زینه ی: تابع که برای یک انتروال معین متحول x ، قیمت تابع ثابت باشد مانند:

$$f(x) = [x]$$

که در انتقال پول، کمیشن بانکی، انتقال پست و پارسال و غیره از آن استفاده میگردد.

ساحه موجودیت توابع:

1. **تابع متمادی (ساحه تعریف توابع):** هرگاه در تابع $y = f(x)$ برای

متحول x قیمت وضع گردد و برای تابع مربوط قیمت دریافت گردد، تابع به همان قیمت یا قیمت‌ها متمادی گفته میشود، یا تعریف گردیده و گراف تابع آن متصل میباشد.

2. **تابع غیر متمادی (ساحه عدم تعریف توابع):** هرگاه در تابع

$y = f(x)$ برای متحول x قیمت وضع گردد و برای تابع مربوط قیمت دریافت

نگردد، تابع به همان قیمت یا قیمت‌ها غیر متمادی گفته می شود، یا به همان قیمت‌ها تعریف نگردیده و گراف تابع مربوطه آن منفصل میباشد.

یادداشت:

1. توابع پولینومیل به تمام قیمت های متحول متمادی بوده و گراف آن متصل میباشد و به هیچ قیمت غیر متمادی نمی باشد.

2. یک تابع ناطق (کسری) زمانی متمادی است که مخرج کسر خلاف صفر باشد، هرگاه مخرج کسر برای قیمت یا قیمت‌های متحول صفر گردد، به همان قیمت ها تابع غیر متمادی گفته میشود و تعریف نگردیده، و یا به عبارت دیگر همان قیمت ها شامل ناحیه تعریف نمی باشد.

3. یک تابع غیر ناطق به جذر های جفت زمانی متمادی است که افاده تحت جذر بزرگتر یا مساوی به صفر باشد و غیر متمادی است که تحت جذر کوچکتر از صفر باشد. در حالیکه توابع مذکور به جذر نما طاق به تمام قیمت های x متمادی می باشد.

تابع جفت و تاق: هرگاه در تابع $y = f(x)$ قیمت تابع $f(-x) = f(x)$ گردد تابع

جفت و هرگاه $f(-x) = -f(x)$ گردد تابع تاق نامیده می شود.

ترکیب توابع: هرگاه دو تابع $f(x)$ و $g(x)$ را در نظر بگیریم طوری که یک تابع

حیث متحول تابع دیگر را اختیار نماید، گفته می شود توابع مذکور ترکیب گردیده اند.

اگر تابع $g(x)$ در f ترکیب گردیده باشد به شکل $gof(x)$ یا $g(f(x))$ ارائه میگردد.

یعنی :

$$\begin{aligned} x &\xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)) \\ x &\xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g(f(x)) \end{aligned}$$

تابع یک به یک: تابع $f(x)$ تابع یک به یک نامیده میشود ، زمانی که اگر:

$$a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b) \quad \wedge \quad a = b \Rightarrow f(a) = f(b)$$

مثلاً: $f(x) = 5x + 1$ تابع یک به یک است ، زیرا :

اگر برای $x = 2$ و $x = 3$ ، یعنی $a = 2$ و $b = 3$ قیمت گذاری گردد در این صورت داریم که:

$$\begin{aligned} x = 2 &\Rightarrow f(2) = 5(2) + 1 = 11 \\ x = 3 &\Rightarrow f(3) = 5(3) + 1 = 16 \\ &\Rightarrow 2 \neq 3, f(2) \neq f(3) \end{aligned}$$

اما تابع $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$ تابع یک به یک نیست ، زیرا :

$$\begin{aligned} x = 2 &\Rightarrow g(2) = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5} \\ x = -2 &\Rightarrow g(-2) = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5} \\ &\Rightarrow 2 \neq -2, g(2) = g(-2) \end{aligned}$$

تابع معکوس: معکوس رابطه (x, y) عبارت از رابطه (y, x) است ، اگر ساحه تعریف تابع معکوس ساحه قیمت های تابع و ساحه قیمت های تابع معکوس ساحه تعریف تابع باشد ، یعنی :

$$\begin{aligned} \text{domian } f^{-1} &= \text{Range } f \\ \text{Range } f^{-1} &= \text{domain } f \end{aligned}$$

معکوس تابع f به شکل f^{-1} نشان داده میشود ، ی-ن

بخاطر داشته باشید که :

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$$

اگر $f(x) = \{(3,1), (5,3), (-2,7)\}$ باشد، پس تابع معکوس آن $f^{-1}(x) = \{(1,3), (3,5), (7,-2)\}$ است.

اما اگر $f(x) = \{(4,2), (5,9), (-1,2)\}$ باشد، پس معکوس آن $f^{-1}(x) = \{(2,4), (9,5), (2,-1)\}$ نیست.

زیرا $f(2)=1, f(2)=4$ ، پس برای $x=2$ دو تصویر مختلف در ساحه قیمت ها $Range$ بوجود می آید پس در نتیجه معکوس هر تابع یک تابع نیست، یا به عباره دیگر هر تابع معکوس پذیر نیست.

تعریف تابع معکوس: هرگاه f تابع یک به یک باشد، طوریکه x ناحیه تعریف و y ناحیه قیمت های آن باشد، پس تابع g معکوس تابع f است، طوریکه y ناحیه تعریف و x ناحیه قیمت های آن باشد.

مثال 1: هرگاه $f(x) = 3x - 5$ باشد، معکوس تابع مذکور $f^{-1}(x)$ را دریابید؟

$$y = f(x)$$

چون:

$$y = 3x - 5$$

$$x = 3y - 5 \Rightarrow 3y = x + 5 \Rightarrow y = \frac{x+5}{3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}$$

مثال 2: معکوس تابع $f(x) = x^3 + 12$ را دریابید؟

$$y = x^3 + 12 \Rightarrow x = y^3 + 12 \Rightarrow y^3 = x - 12$$

$$y = \sqrt[3]{x-12} \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-12}$$

انتقال عمودی: هرگاه c یک عدد مثبت باشد.

1. اگر گراف تابع $y = f(x)$ به اندازه c واحد به شکل عمودی به طرف بالا انتقال

نماید، در این صورت تابع $y = f(x) + c$ حاصل میگردد.

2. اگر گراف تابع $y = f(x)$ به اندازه c واحد به شکل عمودی به طرف پائین انتقال

نماید، در این صورت تابع $y = f(x) - c$ حاصل میگردد.

به طور مثال: اگر گراف تابع $y = x^2$ به طور عمودی به اندازه 2 واحد بطرف بالا و پائین

انتقال نماید، تابع انتقال یافته آن را دریابید؟

$$y = x^2 \Rightarrow y = x^2 + 2$$

انتقال عمودی بطرف بالا

$$y = x^2 \Rightarrow y = x^2 - 2$$

انتقال عمودی بطرف پایین

انتقال افقی: هرگاه c یک عدد مثبت باشد.

1. اگر گراف تابع $y = f(x)$ به اندازه c واحد به شکل افقی به طرف راست انتقال

نماید، در این صورت تابع $y = f(x - c)$ حاصل میگردد.

2. اگر گراف تابع $y = f(x)$ به اندازه c واحد به شکل افقی به طرف چپ انتقال

نماید، در این صورت تابع $y = f(x + c)$ حاصل میگردد.

بطور مثال: اگر گراف تابع $y = x^2$ را به شکل افقی به اندازه 2 واحد بطرف راست و چپ

انتقال نماید، تابع انتقال یافته آنرا دریابید؟

$$y = x^2 \Rightarrow y = (x + 2)^2$$

انتقال افقی بطرف چپ

$$y = x^2 \Rightarrow y = (x - 2)^2$$

انتقال افقی بطرف راست

یادداشت: هرگاه گراف تابع $y = f(x)$ را روی سیستم کمیات وضعیه در نظر بگیریم در سه حالت ذیل منحنی مذکور متناظر است:

1. اگر $x = -x$ تبدیل گردد گراف تابع نظر به محور y متناظر است.
2. اگر $y = -y$ تبدیل گردد، گراف تابع نظر به محور x متناظر است.
3. اگر $x = -x$ و $y = -y$ تبدیل گردد، گراف نظر به مبدأ کمیات متناظر است.

عملیات توابع (الجبره توابع): هرگاه $f(x)$ و $g(x)$ دو تابع را ارائه نماید، پس عملیات توابع فوق چنین تعریف گردیده است.

- 1) $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
 $dom(f + g)(x) = dom f \cap dom g$
- 2) $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
 $dom(f - g)(x) = dom f \cap dom g$
- 3) $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
 $dom(f \cdot g)(x) = dom f \cap dom g$
- 4) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, (g(x) \neq 0)$
 $dom\left(\frac{f}{g}\right)(x) = dom f \cap dom g - \{x \mid g(x) = 0\}$

انواع مجانب ها: بطور عموم مجانب ها به سه نوع عمودی، افقی و مایل مشاهده میگردد.

هرگاه $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$

و $g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$ دو تابع پولینومیلی و $f(x) = \frac{p(x)}{g(x)}$

یک تابع ناطق را ارائه نماید، پس مجانب های تابع $y = f(x)$ چنین بدست می آید:

1. **مجانب عمودی:** یک تابع ناطق زمانی دارای مجانب عمودی می گردد که

$y \rightarrow \pm\infty$ نماید، و این زمانی ممکن است که $g(x) = 0$ گردد.

2. مجانب افقی: یک تابع ناطق زمانی دارای مجانب افقی می‌گردد که $x \rightarrow \pm\infty$ نماید، و این زمانی ممکن است که:

- هرگاه $n = m$ باشد، مجانب افقی آن $y = \frac{a_n}{b_m}$ می باشد.
- هرگاه $n < m$ باشد، مجانب افقی آن $y = 0$ (خط محور x) می باشد.
- هرگاه $n > m$ باشد، تابع مجانب افقی ندارد.

بطور عموم می توان مجانب افقی را به وسیله $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{g(x)} = y = c$ دریافت نمود، که بعداً به کمک لیست توابع آنرا می توان دریافت نمود.

3. مجانب مایل: یک تابع ناطق زمانی دارای مجانب مایل می گردد که درجه متحول صورت (n) به اندازه یک واحد بیشتر از درجه متحول مخرج (m) باشد که برای دریافت آن حاصل تقسیم $\frac{p(x)}{g(x)}$ را دریافت می نماییم که این حاصل تقسیم یک تابع خطی $y_1 = mx + b$ به دست می آید که معادله مجانب مایل تابع می باشد..

به خاطر داشته باشید که یک تابع مجانب افقی داشته باشد مجانب مایل ندارد و برعکس آن اگر تابع مجانب مایل داشت، مجانب افقی ندارد.

سوالات

1. اگر $A = \{0\}$ و $B = \mathbb{N}$ باشد، پس $A \times B$ مساوی است به:

(1) $\{(0, n) / n \in \mathbb{Q}\}$

(2) $\{(0, n) / n \in \mathbb{R}\}$

(3) $\{(n, 0) / n \in \mathbb{N}\}$

(4) $\{(0, n) / n \in \mathbb{N}\}$
2. اگر $R = \left\{ (x, y) / y = \frac{x}{2} \right\}$ و ناحیه تصاویر این رابطه $(2, 5, 7)$ باشد، پس ناحیه تعریف آن مساوی است به:

(1) $\{4, 10, 7\}$

(2) $\{4, 10, 4\}$

(3) $\{20, 10, 1\}$

(4) $\{3, 8, 10\}$
3. تابع $y = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ در کدام نقطه متمادی نیست:

(1) $x = -1$

(2) $x = 1$

(3) $x = 0$

(4) $x = -3$
4. ناحیه تعریف تابع $g(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{6-x}$ عبارت است از:

(1) $(1, 6)$

(2) $(1, 6]$

(3) $[1, 6]$

(4) $[1, 6)$
5. ناحیه قیمت های تابع $f(x) = \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2}$ عبارت است از:

(1) $\{1\}$

(2) $\mathbb{R}$

(3) $[-1, 1]$

(4) $(-1, 1)$
6. باشد، پس ناحیه تصاویر این تابع مساوی است به:

$$f(x) = \begin{cases} 5 & ; 0 \leq x < 1 \\ 1 & ; -4 < x < 0 \end{cases}$$

(1) $\{2, 1\}$

(2) $\{4, 6\}$

(3) $\{5, 1\}$

(4) $\{1, 0\}$

7. اگر $f(x) = 3^{-x}$ باشد، پس $f(5x)$ مساوی است به:


(1) هیچکدام
(2) $f(5x) = \frac{\frac{1}{2} \log_2 4}{3^{5x}}$

(3) $f(5x) = \frac{1}{5^{3x}}$
(4) $f(5x) = 3^{-5x^2}$

8. اگر $f(-1) = 1$, $f(1) = 3$ باشد تابع $f(x) = ax + b$ مشخص کننده کدام تابع ذیل است؟

(1) $f(x) = x - 2$
(2) $f(x) = 2x + 2$
(3) $f(x) = x + 2$
(4) $f(x) = 2x - 2$

9. قیمت $f(f(-1))$ در گراف ذیل عبارت از:



(1) 3
(2) 1
(3) -3
(4) -1

10. اگر $M(x, y)$ نقطه ای از گراف تابع $y = x^3$ باشد تناظر این نقطه نسبت به مبدا مختصات عبارت از:

(1) $M'(-x, y)$
(2) $M'(x, y)$
(3) $M'(x, -y)$
(4) $M'(-x, -y)$

11. اگر $f(x) = \sqrt{x+3}$, $g(x) = 4 - x$ پس $(f - 2g)(1)$ عبارت از:

(1) -4
(2) 4
(3) 6
(4) -6

12. اگر $A = [0, 3]$ و $B = [0, 2]$ باشد، پس $A \times B$ مساوی است به:

(1) $A \times B = \{(0,0), (3,0), (0,2), (2,3)\}$
(2) $A \times B$ ممکن نیست
(3) $A \times B = \{(x, y) / 0 \leq x \leq 3 \wedge 0 \leq y \leq 2\}$
(4) $A \times B = \{(0,0), (0,3), (2,0), (2,3)\}$

13. گراف کدام یک از توابع زیر نظر به محور Y متناظر است :

$$\begin{array}{ll} y = \frac{1}{2}(2) & y = |x| (1) \\ y = \sin x (4) & y = x (3) \end{array}$$

14. ناحیه تعریف $y = \log_{10} x$ عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} (-\infty, 0) (2) & (0, \infty) (1) \\ IR (4) & (-1, 1) (3) \end{array}$$

15. کدام یک از توابع زیر در انتروال $(-\infty, +\infty)$ یک به یک است:

$$\begin{array}{ll} y = 2x + 10 (2) & y = |2x + 1| (1) \\ f(x) = \frac{99}{\sqrt{99}}x^2 + 99 (4) & y = \cos x (3) \end{array}$$

16. ناحیه تعریف تابع $f(x) = \sqrt{x}\sqrt{x}$ مساوی است به:

$$D_f = IR^- (3) \quad D_f = IR^+ \cup P\{0\} (1)$$

$$D_f = \{0, \infty\} (4) \quad D_f = IR (3)$$

17. مجانب عمودی تابع $f(x) = \frac{5x+9}{0.036x-0.072}$ عبارت است از:

$$x = 2 (1) \quad \text{مجانب عمودی ندارد} (2)$$

$$x = -2 (4) \quad x = 0 (3)$$

18. تابع $f(x) = |600x|$ در انتروال $(-\infty, 0)$ دارای خاصیت زیر است:

$$\begin{array}{ll} (1) \text{ تابع تاق است} & (2) \text{ یک به یک است} \\ (3) \text{ تابع جفت است} & (4) \text{ گراف از نقطه } (1,600) \text{ عبور میکند} \end{array}$$

19. $f: IR \rightarrow IR$ دارای خاصیت زیر است :
تابع $f(x) = x^7 + 1$

$$\begin{array}{ll} (1) \text{ یک به یک است} & (2) \text{ تاق است} \\ (3) \text{ جفت است} & (4) \text{ متناقص است} \end{array}$$

20. تابع $f(x) = (7x - 7)^{\ln(\frac{2}{3})}$ در نقطه ذیل متمادی نیست:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| $x = \frac{2}{3}$ (2) | (1) نقطه غیر متمادی ندارد |
| $x = \frac{3}{2}$ (4) | $x = 1$ (3) |

21. ناحیه قیمت های تابع $f(x) = 2x^2 + 3$ عبارت است از:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| $[0, \infty]$ (2) | IR (1) |
| $[3, \infty]$ (4) | $[2, \infty]$ (3) |

22. اگر $f: IR \rightarrow IR$ یک تابع تاق و $f(5) = 4k - 10$ و $f(-5) = k$ باشند، پس قیمت k

مساوی است به:

- | | |
|--------------|--------------|
| $k = -5$ (2) | $k = 2$ (1) |
| $k = 5$ (4) | $k = -2$ (3) |

23. هرگاه تابع $y = x^2 + 4$ در انتروال $[0, \infty)$ تعریف شده باشد، پس معکوس این تابع:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| $y^{-1} = \sqrt{x - 4}$ (2) | $y^{-1} = (4 - x)^2$ (1) |
| $y^{-1} = (4 + x)^2$ (4) | $y^{-1} = \sqrt{x + 4}$ (3) |

24. هرگاه $f(x) = |x - 4| - x \cdot \operatorname{sgn}(x - 2)$ و $g(x) = 4 + \operatorname{sgn}(x + 1)$ باشد

قیمت $f \circ g(x^2)$ عبارت از:

- | | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| 4 (4) | 6 (3) | -4 (2) | -6 (1) |
|-------|-------|--------|--------|

25. هرگاه $f(x) = [|x + [|x - 2|]] + \operatorname{sgn}(x - 6) + x - 1$ باشد، قیمت $f(3)$ عبارت

از:

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 7 (4) | 6 (3) | 5 (2) | 4 (1) |
|-------|-------|-------|-------|

26. هرگاه $f(x) = [|x - e|] + [|x + 1 - \pi|] + x - 3$ باشد قیمت $f(2)$ عبارت از:

- | | |
|--------|--------|
| 2 (2) | 3 (1) |
| -3 (4) | -2 (3) |

27. ساحه حل $\text{sgn}(x^2 - 3x - 10) + 1 = 0$ عبارت از:

- (1) $(-\infty, 2)$ (2) $(5, \infty)$
(3) $(-2, 5)$ (4) $(-5, 2)$

28. دومین رابطه $R = \{(\sin \frac{3\pi}{2}, 1), (\ln 2, 2), (1, 2)\}$ عبارت است از:

- (1) $\{\sin \frac{3\pi}{2}, 1, 2\}$ (2) $\{1, -1, \ln 2\}$ (3) $\{1, \ln 2\}$ (4) $\{\sin \frac{3\pi}{2}, 1\}$

29. اگر $R = \{(x, y), (a, b), (c, d)\}$ باشد، پس R^{-1} مساوی است به:

- (1) $R^{-1} = \{(c, d)\}$ (2) $R^{-1} = \{(y, x), (c, d)\}$
(3) $R^{-1} = \{(y, x), (b, a), (d, c)\}$ (4) $R^{-1} = \{x, a, c\}$

30. اگر $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 0 \\ 2x - 1, & x > 0 \end{cases}$ باشد، پس $f(-\frac{1}{2})$ مساوی است به:

- (1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{5}{4}$ (3) $-\frac{4}{5}$ (4) $-\frac{5}{4}$

31. اگر $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3+x}{x}, & x \neq 3 \\ 4, & x = 3 \end{cases}$ باشد، پس $f(3)$ مساوی است به:

- (1) 5 (2) 4 (3) 2 (4) 3

32. امپلیتود تابع $f(x) = \frac{5}{11} \cos \frac{13}{3}x$ عبارت است از:

- (1) $\frac{3}{13}$ (2) $\frac{13}{3}$ (3) $\frac{10}{22}$ (4) $\frac{5}{22}$

33. ناحیه تعریف تابع $y = \log_{10} 100$ عبارت است از:

- (1) $(-\infty, 2)$ (2) $(0, \infty)$ (3) $(0, -\infty)$ (4) IR

34. ناحیه تعریف تابع $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{-5x}$ عبارت از:

- (1) $[0, \infty)$ (2) IR (3) $(-\infty, 0)$ (4) $(-7, \infty)$

35. ناحیه تعریف تابع $f(x) = \sin\left(\frac{10}{3}x\right)$ یکی از انتروال های ذیل است:

- (1) $(-\infty, +\infty)$ (2) $(0, \infty)$ (3) $[-1, 1]$ (4) $(-1, 1)$

36. ناحیه تعریف تابع $h(x) = 3x^2 - 2x + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ عبارت است از:

- (1) IR (2) $IR - \{-1, +1\}$ (3) $IR - \{-1\}$ (4) همه درست است

37. $f(x) = \begin{cases} 2 & , x > 1 \\ 0 & , x = 0 \\ -2 & , x < -1 \end{cases}$ اگر باشد پس ناحیه تصاویر این تابع مساوی است به:

- (1) $\{-1, 0, 1\}$ (2) $\{-2, 0, 2\}$ (3) $\{-\infty, \infty\}$ (4) $\{0, \infty\}$

38. ناحیه قیمت های تابع $f(x) = \left|\sin \frac{4\pi}{4}\right|$ عبارت است از:

- (1) $\left\{\frac{2}{\sqrt{2}}\right\}$ (2) $\{0\}$ (3) $\left\{\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$ (4) IR

39. ناحیه قیمت های تابع $y = \frac{\cos x}{5}$ عبارت است از:

- (1) $[-5, 5]$ (2) $\left[0, \frac{1}{5}\right]$ (3) $\left[-\frac{1}{5}, 5\right]$ (4) $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right]$

40. تابع $f(x) = 3e^x$ محور y را در نقطه ذیل قطع میکند:

- (1) $(0, 1)$ (2) $(3, 0)$ (3) $(1, 0)$ (4) $(0, 3)$

41. تابع $y = 2 \tan x$ در تمام ناحیه تعریف دارای کدام خاصیت ذیل میباشد:

- (1) متناقص است (2) نه متزاید و نه متناقص (3) ثابت است (4) متزاید است

42. تابع $f(x) = 33x^2$ طوریکه $(-\infty, 0)$ باشد، دارای کدام خاصیت است:

- (1) تابه متزاید (2) تابع یک به یک (3) تابع جفت (4) تابع طاق

43. گراف کدام یک از توابع زیر نظر به محور Y متناظر است:

- (1) $y = |x|$ (2) $y = \frac{1}{2}$ (3) $y = x$ (4) $y = \sin x$

44. تابع $\begin{cases} f: IR \rightarrow IR \\ f(x) = x^5 + x^3 \end{cases}$ دارای خاصیت زیر است:

- (1) تاق است (2) جفت است (3) نه جفت است و نه تاق است (4) متناقص است

45. معکوس تابع $f(x) = \frac{x+0.8}{x+2} \cdot 5$ عبارت است از:

- (1) $\frac{0.8-2)5x}{x-1}$ (2) $\frac{0.8+2)5x}{x+1}$ (3) $\frac{0.8-2)5x}{x+1}$ (4) $\frac{0.8+2)5x}{x-1}$

46. کدام یک از توابع زیر در انتروال $(-\infty, +\infty)$ یک به یک است:

- (1) $y = |2x + 1|$ (2) $y = 2x + 10$ (3) $y = \cos x$ (4) $f(x) = \frac{99}{\sqrt{99}}x^2 + 99$

47. اگر $f(x) = x^2$ و $g(x) = 1 + x$ باشد، درینصورت $(fog)(x)$ مساوی است به:

- (1) $(1+x)^2$ (2) $1+x^2$ (3) $x^2 - 1$ (4) $1 + (1+x)^2$

48. $f(x) = \frac{x^2-2}{x^2+1}$ و $g(x) = \tan^2 x$ باشد، پس $(f \circ g)\left(\frac{\pi}{4}\right)$ مساوی است به:

(1) $\frac{1}{8}$ (2) $-\frac{1}{2}$ (3) 2 (4) 8

49. اگر $f(x) = x^2 - 1$ باشد، پس $f \circ f(x)$ مساوی است به:

(1) $(x^2 - 1)^2$ (2) $(x^2 - 1)^2 - 1$ (3) $(1 - x^2)^2$ (4) $x^2 - 1$

50. هرگاه $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ و $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$ باشد، پس $f \circ g(x)$ عبارت است از:

(1) 1 (2) -1 (3) $-x$ (4) x

51. مجانب عمودی تابع $f(x) = \frac{5x+9}{0.036x-0.072}$ عبارت است از:

(1) $x = 2$ (2) مجانب عمودی ندارد (3) $x = 0$ (4) $x = -2$

52. مجانب افقی تابع $f(x) = \frac{5x^2-x}{3x^4+14}$ عبارت است از:

(1) $y = 0$ (2) $x = 0$
(3) $x = \frac{14}{3}$ (4) مجانب افقی ندارد

53. مجانب مایل تابع $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ عبارت است از:

(1) $y = ax$ (2) $y = cx$
(3) $y = bx$ (4) مجانب مایل ندارد

54. در تابع $f(x) = \frac{x^2+5}{x+1}$ مجانب مایل عبارت است از:

(1) $y = x + 1$ (2) $x = 2$
(3) $y = -x$ (4) $y = x - 1$

55. رأس گراف تابع $f(x) = (x + 7)^2 + 10$ عبارت است از:

- (1) $(7, -10)$ (2) $(-2, 10)$ (3) $(-7, 10)$ (4) $(7, 10)$

56. نقطه $p\left(\cos \frac{15\pi}{4}, \sin \frac{15\pi}{4}\right)$ در کدام ناحیه واقع است؟

- (1) ناحیه چهارم (2) ناحیه سوم (3) ناحیه اول (4) ناحیه دوم

57. در تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ مجانب مایل عبارت است از:

- (1) 1 (2) مجانب مایل ندارد (3) -1 (4) صفر

58. از انتقال عمودی گراف تابع $y = \sqrt{31}x^5$ گراف کدام یک از توابع زیر است:

- (1) $y = \sqrt{31}(x + \sqrt{31})^5$ (2) $y = \sqrt{31}(x + 14)^5$
(3) $y = \sqrt{31}(x - \sqrt{31})^5$ (4) $y = \sqrt{31}x^5 + 1$

59. نقطه غیر متمادیت تابع $f(x) = \frac{\sin x}{(2x-18)^{\frac{1}{11}}}$ عبارت است از:

- (1) $x = 11$ (2) تابع غیر متمادی نیست
(3) $x = 9$ (4) $x = -9$

60. حاصل $\operatorname{sgn}\left(\cos\left(\frac{88888\pi}{2}\right)\right)$ مساوی است به:

- (1) تعریف نشده (2) 1 (3) -1 (4) 0

61. حاصل $\operatorname{sgn}\left(-\operatorname{sgn}\frac{100}{777}\right)$ مساوی است به:

- (1) -1 (2) 1 (3) تعریف نشده (4) 0

62. $\operatorname{sgn}(\cos(10007\pi))$ مساوی است به:

- (1) صفر (2) تعریف نشده است (3) -1 (4) 1

63. حاصل $\operatorname{sgn}\left(\cos\left(\frac{8009\pi}{2}\right)\right)$ مساوی است به:

- 0 (1) 2 (تعریف نشده است) -1 (3) 1 (4)

64. هرگاه $x \in Z$ باشد و تابع $\operatorname{sgn}(x^2 - 2x - 15) = -1$ باشد در این صورت $\sum x$ عبارت از:

- 3 (1) 5 (2) 7 (3) 9 (4)

فصل هفتم



مثلثات

تعریف:

مثلثات از دو کلمه *Trigono* به معنی مثلث و *Metry* به معنی پیمایش و اندازه گیری ترکیب گردیده پس مثلثات یک بخش از علم ریاضیات بوده که با مثلث و تمام روابط که بین اضلاع و زوایای یک مثلث برقرار است بحث می نماید. که اولین مرتبه به وسیله اویلز بحیث علم مستقل بوجود آمد.


زاویه:

شکلی که از تقاطع های دو شعاع بوجود می آید زاویه نامیده می شود. زاویه که هم جهت عقربه ساعت حرکت نماید زاویه منفی و هرگاه خلاف عقربه ساعت حرکت نماید مثبت نامیده می شود.




سیستم های اندازه گیری زاویه:


- **سیستم شصتی (درجه):** هرگاه یک دایره به 360 حصه مساوی تقسیم گردد هر حصه آنرا یک درجه می نامند طوریکه:



- **سیستم صدی (گراد):** هرگاه یک دایره به 400 حصه مساوی تقسیم گردد هر حصه آنرا یک گراد می نامند، طوریکه:



- **سیستم دایروی (رادیان):** هرگاه یک دایره به 2π حصه مساوی یا 6,28 حصه مساوی تقسیم گردد هر حصه آنرا یک رادیان می نامند، طوریکه نظر به تعریف هندسی $\hat{\theta} = \vec{r} \cdot \vec{S}$ پس یک رادیان عبارت از زاویه مرکزی است که طول قوس مقابل آن مساوی به شعاع دایره باشد. اگر $\vec{r} = \vec{S}$ باشد، پس $\hat{\theta} = 1\text{rad}$




رابطه بین گراد، درجه و رادیان:

هرگاه درجه به D ، گراد G و رادیان R نشان داده شود، پس رابطه آنها عبارت از:

$$\frac{D}{360} = \frac{G}{400} = \frac{R}{2\pi} \Rightarrow \frac{D}{180} = \frac{G}{200} = \frac{R}{\pi}$$

نسبت های مثلثاتی: در صورتیکه $\alpha > 0$ یک زاویه، y ضلع مقابل و x ضلع مجاور این زاویه و r وتر مثلث قائم زاویه را نشان دهد، نسبت های مثلثاتی زاویه α قرار ذیل تعریف گردیده است:



رابطه بین نسبت های مثلثاتی:

$$1) \left. \begin{array}{l} \sin \alpha = \frac{1}{\csc \alpha} \\ \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \end{array} \right\} \Rightarrow \sin \alpha \cdot \csc \alpha = 1$$


$$2) \left. \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{1}{\sec \alpha} \\ \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \end{array} \right\} \Rightarrow \cos \alpha \cdot \sec \alpha = 1$$


$$3) \left. \begin{array}{l} \tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \\ \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} \end{array} \right\} \Rightarrow \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

نسبت های مثلثاتی زاویه های متقابل:

- 1) $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
- 2) $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- 3) $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
- 4) $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$
- 5) $\sec(-\alpha) = \sec \alpha$
- 6) $\csc(-\alpha) = -\csc \alpha$






نسبت های مثلثاتی	I ناحیه	II ناحیه	III ناحیه	IV ناحیه
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-
$\sec \alpha$	+	-	-	+
$\csc \alpha$	+	+	-	-

ساحه تحول نسبت های مثلثاتی: طوریکه از مطالعه علم الجبر در تحول توابع مثلثاتی می دانیم نسبت

های مثلثاتی روی خط اعداد دارای ساحه تحول ذیل می باشند.



- 1) $-1 \leq \sin \alpha, \cos \alpha \leq +1 \Rightarrow \sin \alpha, \cos \alpha \Rightarrow [-1, +1]$
- 2) $-\infty \leq \tan \alpha, \cot \alpha < +\infty \Rightarrow \tan \alpha, \cot \alpha \Rightarrow (-\infty, +\infty)$
- 3) $+1 \leq \sec \alpha, \csc \alpha \leq -1 \Rightarrow \sec \alpha, \csc \alpha \Rightarrow (-\infty, -1] \cup [+1, +\infty)$

دریافت نسبت های مثلثاتی بعضی از زوایا: جهت دریافت نسبت مثلثاتی زوایای $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ و


90° به یک روش ساده می توان از جدول ذیل استفاده نمود:

$\sin \alpha \rightarrow$	0°	$30^\circ = \frac{\pi}{6}$	$45^\circ = \frac{\pi}{4}$	$60^\circ = \frac{\pi}{3}$	$90^\circ = \frac{\pi}{2}$
	$\sqrt{\frac{0}{4}}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{4}$
	$90^\circ = \frac{\pi}{2}$	$60^\circ = \frac{\pi}{3}$	$45^\circ = \frac{\pi}{4}$	$30^\circ = \frac{\pi}{6}$	0°
					$\cos \alpha \leftarrow$

حالت استاندارد (معیاری) یک زاویه: هرگاه ضلع ابتدائی یک زاویه بالای محور x رأس زاویه و


مبدأ کمیات وضعیه و ضلع نهائی آن نظر به وسعت زاویه در یک از نواحی کمیات قرار گیرد زاویه استاندارد گفته

می شود. مثلاً:



زوایای کوتر مینل (Conterminal Angles): زوایای معیاری که ضلع نهائی آن بعد n دور

یک دایره بالای هم منطبق گردد زوایای کوتر مینل نامیده میشود. مثلاً:



دریافت نسبت های مثلثاتی بعضی از زوایا به کمک زوایای نواحی کمیات وضعیه:

در حالیکه α یک زاویه حاده مثبت است می توان به کمک زوایای نواحی کمیات وضعیه نسبت های مثلثاتی زوایای $120^\circ, 135^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 225^\circ, 240^\circ, 300^\circ, 315^\circ, 330^\circ, 420^\circ, \dots$ را در دو حالت ذیل دریافت نمود:

حالت اول: در حالیکه $n=1,2,3,\dots$ است، داریم که:

$$1) \sin\left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \pm \alpha\right] = \cos \alpha$$

$$2) \cos\left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \pm \alpha\right] = \sin \alpha$$

$$3) \tan\left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \pm \alpha\right] = \cot \alpha$$

$$4) \cot\left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \pm \alpha\right] = \tan \alpha$$

$$5) \sec\left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \pm \alpha\right] = \csc \alpha$$

$$6) \csc\left[\frac{(2n-1)\pi}{2} \pm \alpha\right] = \sec \alpha$$

اشاره نتایج نسبت های مذکور مربوط به ناحیه آن می گردد.

حالت دوم: در حالیکه $n=1,2,3,\dots$ است داریم که:

$$1) \sin(n\pi \pm \alpha) = \sin \alpha$$

$$2) \cos(n\pi \pm \alpha) = \cos \alpha$$

$$3) \tan(n\pi \pm \alpha) = \tan \alpha$$

$$4) \cot(n\pi \pm \alpha) = \cot \alpha$$

$$5) \sec(n\pi \pm \alpha) = \sec \alpha$$

$$6) \csc(n\pi \pm \alpha) = \csc \alpha$$

اشاره نتایج نسبت های مذکور مربوط به ناحیه آن می گردد.

یادداشت: جهت دریافت نسبت های مثلثاتی 180° با استفاده از متضاد نسبت های مثلثاتی 0° و برای دریافت نسبت های مثلثاتی 360° با استفاده از مساوی بودن نسبت مثلثاتی 0° می توان چنین نوشت:

$$\begin{aligned}\sin 0^\circ &= \sin 360^\circ = 0 \Rightarrow \sin 180^\circ = 0 \\ \cos 0^\circ &= \cos 360^\circ = +1 \Rightarrow \cos 180^\circ = -1 \\ \tan 0^\circ &= \tan 360^\circ = 0 \Rightarrow \tan 180^\circ = 0 \\ \cot 0^\circ &= \cot 360^\circ = \infty \Rightarrow \cot 180^\circ = -\infty \\ \sec 0^\circ &= \sec 360^\circ = +1 \Rightarrow \sec 180^\circ = -1 \\ \csc 0^\circ &= \csc 360^\circ = \infty \Rightarrow \csc 180^\circ = -\infty\end{aligned}$$

به همین ترتیب جهت دریافت نسبت های مثلثاتی 270° با استفاده از متضاد نسبت های مثلثاتی 90° می توان چنین نوشت:

$$\begin{aligned}\sin 90^\circ &= +1 \Rightarrow \sin 270^\circ = -1 \\ \cos 90^\circ &= 0 \Rightarrow \cos 270^\circ = 0 \\ \tan 90^\circ &= \infty \Rightarrow \tan 270^\circ = -\infty \\ \cot 90^\circ &= 0 \Rightarrow \cot 270^\circ = 0 \\ \sec 90^\circ &= \infty \Rightarrow \sec 270^\circ = -\infty \\ \csc 90^\circ &= +1 \Rightarrow \csc 270^\circ = -1\end{aligned}$$

رابطه اساسی و روابط فرعی مثلثاتی:

$$\left. \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \right\} \quad \text{رابطه اساسی مثلثاتی}$$

$$\left. \begin{aligned}1) \quad &\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \\ 2) \quad &\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha \\ 3) \quad &\tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha - 1 \\ 4) \quad &\cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha - 1 \\ 5) \quad &\sec^2 \alpha = \tan^2 \alpha + 1 \\ 6) \quad &\csc^2 \alpha = \cot^2 \alpha + 1\end{aligned} \right\} \quad \text{روابط فرعی مثلثاتی}$$

نسبت های حاصل جمع و حاصل تفریق زوایا: در حالیکه α و β دو زاویه حاده مثبت اند. نسبت های حاصل جمع و حاصل تفریق زوایا قرار ذیل اند.

$$\begin{aligned}1) \quad &\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ 2) \quad &\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ 3) \quad &\sin(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \cdot \tan \beta}\end{aligned}$$

نسبت های مثلثاتی دو چند یک زاویه:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\
 & \begin{cases} \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \\ \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 \end{cases} \\
 2) \quad & \\
 3) \quad & \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}
 \end{aligned}$$

نسبت های مثلثاتی سه چند یک زاویه:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \\
 2) \quad & \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 4 \cos \alpha \\
 3) \quad & \tan 3\alpha = \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha}
 \end{aligned}$$

نسبت های مثلثاتی $(\alpha + \beta + \gamma)$:

$$\begin{aligned}
 \sin(\alpha + \beta + \gamma) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma - \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma \\
 &+ \sin \beta \cdot \cos \alpha \cdot \cos \gamma + \sin \gamma \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta \quad \dots\dots\dots(1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos(\alpha + \beta + \gamma) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma - \cos \alpha \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma \\
 &+ \cos \gamma + \sin \alpha \cdot \sin \beta - \cos \beta \cdot \sin \alpha \cdot \sin \gamma \quad \dots\dots\dots(2)
 \end{aligned}$$

$$\tan(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma - \tan \alpha \cdot \tan \beta \cdot \tan \gamma}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta - \tan \beta \cdot \tan \alpha - \tan \alpha \cdot \tan \gamma} \quad \dots\dots\dots(3)$$

فورمول های تحویل یا ضرب:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \\
 2) \quad & \sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \\
 3) \quad & \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \\
 4) \quad & \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}
 \end{aligned}$$

$$5) \tan x - \tan y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cdot \cos y}$$

$$6) \tan x - \tan y = \frac{\sin(x-y)}{\cos x \cdot \cos y}$$

به همین ترتیب برای حاصل ضرب نسبت های مثلثاتی زوایا به حاصل جمع یا تفریق با استفاده از فورمول تحویل می توان چنین نوشت:

$$1) \sin A \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$2) \cos A \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$3) \cos A \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$4) \sin A \cdot \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(A+B) - \cos(A-B)]$$

نسبت های مثلثاتی یک زاویه از جنس $\tan$ نصف زاویه:

$$1) \sin = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \quad \text{همچنان}$$

$$2) \cos = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$3) \tan = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

نسبت های مثلثاتی نصف زاویه از جنس $\sin$ همان زاویه:

$$1) \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{1+\sin \alpha} + \sqrt{1-\sin 2\alpha}}{2}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{1+\sin 2\alpha} + \sqrt{1-\sin 2\alpha}}{2} \quad \text{همچنان}$$

$$2) \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{1+\sin \alpha} - \sqrt{1-\sin \alpha}}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{1+\sin 2\alpha} - \sqrt{1-\sin 2\alpha}}{2} \quad \text{همچنان}$$

$$3) \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{1+\sin \alpha} + \sqrt{1-\sin \alpha}}{\sqrt{1+\sin \alpha} - \sqrt{1-\sin \alpha}}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{\sqrt{1+\sin 2\alpha} + \sqrt{1-\sin 2\alpha}}{\sqrt{1+\sin 2\alpha} - \sqrt{1-\sin 2\alpha}} \quad \text{همچنان}$$

نسبت های مثلثاتی نصف زاویه از جنس $\cos$ همان زاویه:

$$1) \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}} \Rightarrow \sin \alpha = \sqrt{\frac{1-\cos 2\alpha}{2}} \quad \text{و همچنان}$$


$$2) \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}} \Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{\frac{1+\cos 2\alpha}{2}}$$

$$3) \tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha}} \Rightarrow \tan \alpha = \sqrt{\frac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}}$$

محاسبه طول قوس یک دایره: هرگاه R شعاع یک دایره و θ زاویه مرکزی مقابل قوس L دایره از


جنس درجه داده شده باشد، طول قوس آن عبارت از: $L = \pi R \cdot \frac{\theta^\circ}{180^\circ}$ و در صورتیکه θ زاویه مرکزی از جنس

رادیان باشد، پس: $L = R \cdot \theta$




مساحت قطاع دایره: قسمتی از سطح دایره که میان دو شعاعات دایره قرار داشته باشد قطاع دایره نامیده می شود

$$A_{\text{sector}} = \frac{1}{2} R^2 \theta$$



مساحت قطعه دایره: قسمتی از سطح دایره که بین قوس و وتر دایره قرار داشته باشد قطعه دایره نامیده می شود

$$A_{\text{segmnt}} = \frac{1}{2} R^2 (\theta - \sin \theta)$$




مساحت مثلث که دو ضلع و زاویه بین آن معلوم باشد: هرگاه a, b و c اضلاع مثلث و A, B, C

و C زوایای آن نشان دهد، مساحت آن عبارت از:

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin C$$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin B$$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin A$$



نسبت های مثلثاتی نصف زاویه از جنس طول اضلاع مثلث: در صورتیکه a, b و c و طول

اضلاع یک مثلث و $p = \frac{a+b+c}{2}$ نصف محیط مثلث $\triangle ABC$ را نشان دهد، پس داریم که:

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}$$

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}$$

$$\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}$$

همچنان:

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$$

$$\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{p(p-b)}{ac}}$$

$$\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}}$$

به همین ترتیب:

$$\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}}$$

$$\tan \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{p(p-b)}}$$


$$\tan \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{p(p-c)}}$$

به همین ترتیب مساحت یک مثلث از جنس اضلاع از رابطه ذیل بدست می آید:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{..... (فرمول هیرون)}$$


دریافت شعاع دایره محیطی یک مثلث: دایره که از رأس های یک مثلث عبور نماید طوریکه مثلث در داخل دایره قرار داشته باشد، و مرکز دایره محیطی مثلث نقطه تقاطع ناصف های عمودی مثلث می باشد، که طول شعاع این دایره در صورتیکه a, b, c طول اضلاع مثلث و S مساحت باشد عبارت از:

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{b}{2 \sin B} = \frac{c}{2 \sin C} \quad \text{یا} \quad R = \frac{abc}{4S}$$




دریافت شعاع دایره محاطی یک مثلث: دایره که در داخل یک مثلث قرار داشته و به هر سه ضلع مثلث مماس باشد دایره محاطی مثلث نامیده می شود که مرکز این دایره در نقطه تقاطع ناصف الزاویه مثلث مذکور قرار دارد. در حالیکه a, b, c طول اضلاع و p نصف محیط مثلث باشد شعاع دایره محاطی مثلث مذکور از رابطه ذیل بدست می آید:

$$r = \frac{S}{p} \quad \text{یا} \quad r = \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p}$$



قضیه ساین: در هر مثلث (حاده الزاویه، قائم الزاویه و منفرجه الزاویه) رابطه بین اضلاع و زوایای یک مثلث از جنس نسبت مثلثاتی ساین عبارت از:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$



قضیه (فورمول های مُلوید Mollwied): با استفاده از قضیه ساین می توان دو رابطه ذیل را دریافت نمود که بنام فورمول مُلوید یاد می گردند عبارت اند از:

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\cos \frac{A-B}{2}}{\sin \frac{C}{2}} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\frac{a-b}{c} = \frac{\sin \frac{A-B}{2}}{\cos \frac{C}{2}} \quad \dots\dots\dots (2)$$


قضیه کوساین:

در هر مثلث (حاده الزاویه، قائم الزاویه و منفرجه الزاویه) رابطه بین اضلاع و زوایای یک مثلث از جنس نسبت مثلثاتی کوساین قرار ذیل اند:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$




به همین ترتیب در رابطه بین اضلاع و زوایای یک مثلث قضایای ذیل نیز وجود دارد، با در نظر داشت خط ارتفاع در

مثلث $\triangle ABC$ می توان روابط ذیل را نوشت:

$$a = c \cos B + b \cos C$$

$$b = c \cos A + a \cos C$$

$$c = a \cos B + b \cos A$$




قضیه تانجانت: در هر مثلث (حاده الزاویه، قائمه زاویه و منفرجه الزاویه) رابطه بین اضلاع و زوایای مثلث از

جنس نسبت مثلثاتی تانجنت عبارت از:

$$\frac{a+b}{a-c} = \frac{\tan \frac{A+B}{2}}{\tan \frac{A-B}{2}}$$

$$\frac{a+c}{a-c} = \frac{\tan \frac{A+C}{2}}{\tan \frac{A-C}{2}}$$

$$\frac{b+c}{b-c} = \frac{\tan \frac{B+C}{2}}{\tan \frac{B-C}{2}}$$



مطابقت های مثلثاتی: آن مساوات مثلثاتی که برای تمام قیمت های زوایا هر دو طرف مساوات با هم مساوی باشد مطابقت مثلثاتی نامیده می شود، مثلاً در مطابقت $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 + (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 2$ هر قیمت را که زاویه α یگیرید هر دو طرف مساوات با هم مساوی است، که با استفاده از روابط و فورمول های که قبلاً در مثلثات آنها را مطالعه نمودیم می توان مطابقت های مثلثاتی را ساده نمود و قیمت عینیتی آنها را دریافت کرد.

معادلات مثلثاتی: آن مساوات مثلثاتی که برای بعضی از قیمت های زوایا صدق نماید، معادلات مثلثاتی نامیده می شود که می توان معادلات مثلثاتی را در شکل بک مجهوله درجه اول، یک مجهوله درجه دوم و سیستم معادلات دو مجهوله درجه اول ملاحظه نمود که هر کدام آنها مانند معادلات الجبری به شیوه ها و طریقه های خاصی قابل حل می باشد.

به خاطر داشته باشید که در معادلات مثلثاتی $a \sin x + b \cos x = c$ شرط حل آن $a^2 + b^2 \geq c^2$ می باشد.

شرایط حل سیستم معادلات دو مجهوله درجه اول مثلثاتی: سیستم معادلات دو مجهوله مثلثاتی به شش گروپ تقسیم گردیده که هر کدام آنها شرایط حل به خصوص خویش را دارا می باشند که عبارت اند از:

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos x \pm \cos y = a \\ x \pm y = \alpha \end{array} \right. \quad \text{و} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin x \pm \sin y = a \\ x \pm y = \alpha \end{array} \right. \quad \text{گروپ اول:}$$

$$\text{که شرط حل آنها عبارت از: } a^2 - 4 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \leq 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \cdot \sin y = a \\ x \pm y = \alpha \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} \cos \cdot \cos y = a \\ x \pm y = \alpha \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} \sin x \cdot \cos y = a \\ x \pm y = \alpha \end{array} \right. \quad \text{گروپ دوم:}$$

$$\text{که شرط حل آنها عبارت از: } -\cos^2 \frac{\alpha}{2} \leq a \leq \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\sin x}{\sin y} = a \\ x \pm y = \alpha \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} \frac{\cos x}{\cos y} = a \\ x \pm y = \alpha \end{array} \right. \quad \text{گروپ سوم:}$$

$$\text{که شرایط حل آنها عبارت از: } \tan \frac{x-y}{2} = \frac{a-1}{a+1} \cot \frac{\alpha}{2} \quad \text{یا} \quad \tan \frac{x-y}{2} = \frac{a-1}{a+1} \tan \frac{\alpha}{2}$$

$$\begin{cases} \tan x \pm \tan y = a \\ x \pm y = \alpha \end{cases}, \begin{cases} \cot x \pm \cot y = a \\ x \pm y = \alpha \end{cases} \quad \text{گروپ چهارم:}$$

که شرط حل آن عبارت از: $a^2 - 4 + 4a \cdot \cot \alpha \geq 0$

$$\begin{cases} \tan x \cdot \tan y = a \\ x \pm y = \alpha \end{cases} \quad \text{گروپ پنجم:}$$

که شرط حل آن $1 \leq \frac{1+a}{1-a} \cdot \cos \alpha \leq 1$ می باشد.

$$\begin{cases} \frac{\tan x}{\tan y} = a \\ x \pm y = \alpha \end{cases} \quad \text{گروپ ششم:}$$

که شرط حل آن عبارت از $1 \leq \frac{a-1}{a+1} \sin \alpha \leq 1$ می باشد.

تبصره: جهت دریافت زوایای کوترمینل در حل معادلات مثلثاتی سه حالت ذیل را در نظر داشته باشید.

حالت اول: برای زوایای که دارای نسبت های مثلثاتی $\sin x$ و $\csc x$ می باشند، فورمول عمومی ذیل وجود دارد:

$$x = n\pi + (-1)^n \cdot \alpha, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

و یا به عباره دیگر می توان برای $\sin x$ و $\csc x$ طور ذیل نیز نوشت:

$$x = 2n\pi + \alpha, \quad x = \pi + 2n\pi - \alpha \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

حالت دوم: برای زوایای که دارای نسبت های مثلثاتی $\cos x$ و $\sec x$ می باشند، فورمول عمومی ذیل وجود دارد:

$$x = 2n\pi \pm \alpha, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

حالت سوم: برای زوایای که دارای نسبت های مثلثاتی $\tan x$ و $\cot x$ می باشند، فورمول ذیل وجود دارد:

$$x = n\pi + \alpha, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

توابع معکوس مثلثاتی

با در نظر داشت تعریف معکوس برای توابع معکوس مثلثاتی می توان چنین ارائه نمود.

$$y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)$$

$$\begin{array}{llll}
 y = \sin(x) & \Rightarrow & x = \sin^{-1}(y) & \Rightarrow & x = \arcsin y \\
 y = \cos(x) & \Rightarrow & x = \cos^{-1}(y) & \Rightarrow & x = \arccos y \\
 y = \operatorname{tg}(x) & \Rightarrow & x = \operatorname{tg}^{-1}(y) & \Rightarrow & x = \operatorname{arcsin} y
 \end{array}$$

مثلاً:

$$\begin{array}{ll}
 \sin 30^\circ = \frac{1}{2} & \Rightarrow \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = 30 \\
 \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} & \Rightarrow \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45 \\
 \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = -1 & \Rightarrow \arcsin(-1) = \frac{3\pi}{4}
 \end{array}$$

همچنان جهت ساده سازی توابع معکوس مثلثاتی حالات ذیل را در نظر داشته باشد:

$$\begin{array}{l}
 \arcsin(\cos x) = x \\
 1) \arccos(\cos x) = x \\
 \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x \\
 \sin(\arcsin x) = x \\
 2) \cos(\arccos x) = x \\
 \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x \\
 3) \arcsin x = \arccos x = \frac{\pi}{2} \\
 4) \arcsin x = \arccos \sqrt{1-x^2} = \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{x-x^2}} \\
 5) \operatorname{arctg} x = \operatorname{arc} \cot g \frac{1}{x} = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\
 6) \operatorname{arctg} x + \operatorname{arc} \cot x = \frac{\pi}{2} \\
 7) \arccos x = \arcsin \sqrt{1-x^2} = \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \\
 8) \operatorname{arc} \cot x = -\operatorname{arc} \cot(-x) \\
 9) \operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x-y}{1+xy}
 \end{array}$$

سوالات

1. اگر $\sin \theta > 0$ و $\cos \theta < 0$ باشد، پس زاویه θ در ناحیه ذیل واقع است:

1 (4	2 (3	3 (2	4 (1
------	------	------	------
2. هر گاه زاویه مرکزی $\frac{3\pi}{2}$ و طول قوس مقابل $\frac{8\pi}{2} cm$ باشد، پس شعاع دایره مساوی است به:

$\frac{3}{5} cm$ (4	$\frac{3}{8} cm$ (3	$\frac{5}{3} cm$ (2	$\frac{8}{3} cm$ (1
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------
3. در حالت معیاری با زاویه 200° کدام زاویه زیر کوترمینل میباشد:

2800° (4	2720° (3	2820° (2	2620° (1
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------
4. هر گاه $\sin x = \frac{1}{2}$ و ضلع دوم زاویه x در ناحیه دوم باشد، پس قیمت $2 \cos x$ مساوی است به:

$\sqrt{3}$ (4	$-\sqrt{3}$ (3	$\sqrt{2}$ (2	$-\sqrt{2}$ (1
---------------	----------------	---------------	----------------
5. هر گاه $\sec(-\theta) = a$ باشد در این صورت $\cos(\pi + \theta)$ مساوی است به:

a (4	$-a$ (3	$-\frac{1}{a}$ (2	$\frac{1}{a}$ (1
--------	---------	-------------------	------------------
6. افاده $\frac{\sin 300^\circ}{1 - \cos 240^\circ}$ عبارت است از:

$-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (4	-1 (3	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$ (2	$-\sqrt{3}$ (1
--------------------------	---------	--------------------------	----------------
7. افاده مثلثاتی $\frac{\sec(-\theta) + \sec \theta}{\sec(-\theta)}$ مساوی است به:

-2 (4	1 (3	2 (2	0 (1
---------	--------	--------	--------

8. افاده مثلثاتی $\cot(4\pi - \sigma)$ مساوی است به:

$$\cot \sigma \quad (1) \quad -\cot \sigma \quad (2) \quad -\tan \sigma \quad (3) \quad \tan \sigma \quad (4)$$

9. اگر $\frac{\pi}{2} < a < \beta < \pi$ باشد، پس کدام یکی از روابط زیر درست است:

$$\tan a \cdot \tan \beta = 0 \quad (1) \quad \tan a \cdot \tan \beta \geq 0 \quad (2)$$

$$\tan a \cdot \tan \beta < 0 \quad (3) \quad \tan a \cdot \tan \beta > 0 \quad (4)$$

10. قیمت $\cot(450^\circ + \theta)$ مساوی است به:

$$\tan \theta \quad (1) \quad -\tan \theta \quad (2)$$

$$\cot \theta \quad (3) \quad -\cot \theta \quad (4)$$

11. به کدام یکی از قیمت های ذیل $\cot(4x)$ تعریف نشده است:

$$x = \frac{\pi}{8} \quad (1) \quad x = \frac{\pi}{4} \quad (2) \quad x = -\frac{\pi}{8} \quad (3) \quad x = \frac{\pi}{3} \quad (4)$$

12. هرگاه $\sin a \cdot \cos a > 0$ و $\cos a \cdot \tan a < 0$ باشد پس ضلع دوم زاویه a در کدام

ناحیه واقع است:

$$(1) \text{ ناحیه اول} \quad (2) \text{ ناحیه سوم}$$

$$(3) \text{ ناحیه دوم} \quad (4) \text{ ناحیه چهارم}$$

13. زاویه کوترمینل با زاویه $\frac{\pi}{8}$ عبارت است از:

$$33\frac{\pi}{8} \quad (1) \quad 32\frac{\pi}{8} \quad (2) \quad 20\frac{\pi}{8} \quad (3) \quad 31\frac{\pi}{8} \quad (4)$$

14. حاصل افاده مثلثاتی $\sin 27 + \cos 63$ مساوی است به:

$$\cos 50 \quad 4) \quad 2 \cos 50 \quad 3) \quad 2 \sin 27 \quad 2) \quad 0 \quad 1)$$

15. $\sqrt{96} \frac{\sin x}{\csc x} + 4\sqrt{6} \frac{\cos x}{\sec x}$ مساوی است به:

$$\sqrt{96} \quad 4) \quad \sqrt{99} \quad 3) \quad \sqrt{98} \quad 2) \quad \sqrt{97} \quad 1)$$

16. $-3 \cot^2 x - 3$ مساوی است به:

$$\begin{aligned} & -\sec^2 x \quad 2) \quad -\csc^2 3x \quad 1) \\ & -3 \csc^2 x \quad 4) \quad -\sec^2 3x \quad 3) \end{aligned}$$

17. حاصل افاده $2 + \frac{4}{2 \cot^2 \frac{\pi}{8}}$ مساوی است به:

$$\begin{aligned} & 2 \tan^2 \frac{\pi}{8} + 1 \quad 2) \quad 2 \csc^2 \frac{\pi}{8} \quad 1) \\ & 2 \sec^2 \frac{\pi}{8} \quad 4) \quad \sec^2 \frac{\pi}{8} \quad 3) \end{aligned}$$

18. حاصل افاده $\frac{\tan(\sqrt{24}) - \sin(\sqrt{24})}{2 \tan(\sqrt{24})}$ مساوی است به:

$$\begin{aligned} & \sin^2 \sqrt{6} \quad 2) \quad \cos^2 \sqrt{6} \quad 1) \\ & \cos(\sqrt{24}) \quad 4) \quad \sin(\sqrt{24}) \quad 3) \end{aligned}$$

19. حاصل افاده $(3 \sin \sqrt{27} + 3 \cos \sqrt{27})(3 \cot \sqrt{27} + 3 \tan \sqrt{27})$ مساوی است به:

$$\begin{aligned} & \frac{9}{\sin(3\sqrt{3})} + \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} \quad 2) \quad \frac{9}{\csc(3\sqrt{3})} - \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} \quad 1) \\ & \frac{9}{\csc(3\sqrt{3})} + \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} \quad 4) \quad \frac{9}{\csc(3\sqrt{3})} - \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} \quad 3) \end{aligned}$$

20. حاصل افاده مثلثاتی $(\tan \sqrt{7} + 1)(\tan \sqrt{7} - 1)(1 - \sin^2 \sqrt{7})$ مساوی است به:

$$\cos^2 \sqrt{7} \quad 2) \quad \sin^2 \sqrt{7} \quad 1)$$

$$\sin^2 \sqrt{7} - \cos^2 \sqrt{7} \quad (4)$$

$$\sin \sqrt{7} - \cos \sqrt{7} \quad (3)$$

$$21. \quad \text{حاصل افاده } \sec \frac{5}{13} \left(1 + \sin \frac{5}{13}\right) + \cos \frac{5}{13} \left(1 + \sin \frac{5}{13}\right)^{-1} \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{2}{\sin \frac{5}{13}} \quad (4)$$

$$\frac{2}{\cos \frac{5}{13}} \quad (3)$$

$$-\frac{2}{\sin \frac{5}{13}} \quad (2)$$

$$-\frac{2}{\cos \frac{5}{13}} \quad (1)$$

$$22. \quad \text{افاده مثلثاتی } \sin^6 x + \cos^6 x \text{ مساوی است به:}$$

$$1 + 2 \sin^2 x \cos^2 x \quad (2)$$

$$1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x \quad (1)$$

$$1 + 3 \sin^2 x \cos^2 x \quad (4)$$

$$1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x \quad (3)$$

$$23. \quad \cos^2(\cos 99\pi) \text{ مساوی است به:}$$

$$\cos(-1) \quad (2)$$

$$\cos^2(-1) \quad (1)$$

$$\text{هیچکدام} \quad (4)$$

$$\cos^2(1) \quad (3)$$

$$24. \quad \text{حاصل افاده } \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 40^\circ}} \text{ عبارت از:}$$

$$\frac{1}{2} \cos 10 \quad (2)$$

$$\cos 10 \quad (1)$$

$$1 + \cos 10 \quad (4)$$

$$2 \cos 10 \quad (3)$$

$$25. \quad \text{هرگاه } x \text{ زاویه حاده باشد، درینصورت افاده } \sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} \quad (2)$$

$$\frac{\sin x}{\sqrt{1 + \sin x}} \quad (1)$$

$$\frac{\cos x}{\sqrt{1 + \cos x}} \quad (4)$$

$$\frac{\sin x}{\sqrt{1 + \cos x}} \quad (3)$$

$$26. \quad \text{افاده مثلثاتی } \tan 39^\circ \text{ مساوی است به:}$$

$$\begin{array}{ll} \frac{\cos 6^\circ - \sin 6^\circ}{\sin 6^\circ - \cos 6^\circ} & (2) \\ \frac{\sin 84^\circ - \sin 6^\circ}{\sin 84^\circ + \sin 6^\circ} & (4) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \frac{\sin 6^\circ - \cos 6^\circ}{\sin 6^\circ + \cos 6^\circ} & (1) \\ \frac{\cos 6^\circ - \cos 84^\circ}{\sin 6^\circ + \cos 84^\circ} & (3) \end{array}$$

27. در صورتیکه A, B و C زوایای داخلی یک مثلث باشد انگاه $tgA + tgB + tgC$ مساوی

میشود به:

$$\begin{array}{ll} tgA \cdot tgC & (2) \\ tgB \cdot tgC & (4) \end{array} \quad \begin{array}{ll} tgA \cdot tgB \cdot tgC & (1) \\ tgA \cdot tgB & (3) \end{array}$$

28. $\sin(A+B)\sin(A-B)$ عبارت از:

$$\begin{array}{ll} \sin^2 A - \sin^2 B & (2) \\ \sin^3 A + \sin^3 B & (4) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \sin^3 A - \sin^3 B & (1) \\ \sin^2 A + \sin^2 B & (3) \end{array}$$

29. در صورتیکه $\alpha \neq \left(\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ باشد افاده مثلثاتی $\frac{\cos 3\alpha + \sin \alpha \sin 2\alpha}{\sin 3\alpha - \sin 2\alpha \cos \alpha}$ عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} \cot \alpha & (2) \\ \cot 3\alpha & (4) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \tan \alpha & (1) \\ \tan 3\alpha & (3) \end{array}$$

30. مساوی است به: $\frac{1}{\sec 22^\circ \cdot \sin 31^\circ \cdot \cos 53^\circ}$

$$\begin{array}{ll} \tan 22^\circ + \cos 53^\circ & (2) \\ \tan 53^\circ + \cot 31^\circ & (4) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \frac{1}{2} \sec 22^\circ \cdot \sin 84^\circ & (1) \\ 2 \sec 22^\circ \cdot \cos^2 53^\circ & (3) \end{array}$$

31. افاده مثلثاتی $\csc 10^\circ - \sqrt{3} \sec 10^\circ$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} 1 & (4) & 2 & (3) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \frac{1}{2} & (2) & 4 & (1) \end{array}$$

32. قیمت افاده $\tan 15^\circ + \cot 15^\circ$ عبارت از:

$$\begin{array}{llll} 4 & (4) & 4 - 2\sqrt{3} & (3) \end{array} \quad \begin{array}{ll} 4 + 2\sqrt{3} & (2) & 2 - \sqrt{3} & (1) \end{array}$$

33. افاده مثلثاتی $\frac{1}{\cos 80} - \frac{\sqrt{3}}{\sin 80}$ عبارت از:

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

34. عدد $\tan 15 - \cot 15$ عبارت از:

- (1) $-2\sqrt{3}$ (2) $-2\sqrt{2}$ (3) $-\sqrt{3}$ (4) $2\sqrt{3}$

35. حاصل ضرب افاده $(\sin 312) \dots (\sin 47) (\sin 46) (\sin 45)$ عبارت از:

- (1) $\frac{3\sqrt{2}}{8}$ (2) 0 (3) $-\frac{3\sqrt{2}}{8}$ (4) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

36. قیمت $\cot g \left(2 \arctan \frac{3}{4} \right)$ عبارت از:

- (1) $\frac{9}{16}$ (2) $\frac{7}{24}$ (3) $\frac{25}{24}$ (4) $\frac{24}{25}$

37. افاده $\frac{\cos^2 a}{1 + \tan^2 a} + \frac{\sin^2 a}{1 + \cot^2 a}$ عبارت از:

- (1) $2 \sin^2 a \cos^2 a - 1$ (2) $1 - 2 \sin^2 a \cos^2 a$
(3) $1 - 3 \sin^2 a \cos^2 a$ (4) $3 \sin^2 a \cos^2 a - 1$

38. $4 \cos 18^\circ - 3 \sec 18^\circ - 2 \tan 18^\circ$ مساوی است به:

- (1) صفر (2) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ (3) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ (4) 1

39. $\csc 10^\circ - \sqrt{3} \sec 10^\circ$ مساوی است به:

- (1) 1 (2) $\frac{1}{2}$ (3) 2 (4) 4

40. اگر $\cos \alpha + \cos \theta = m$ و $\sin \alpha + \sin \beta = n$ باشد پس $\sin(\alpha + \beta)$ مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} \frac{m^2 - n^2}{m^2 + n^2} & (1) \\ \frac{2mn}{m^2 - n^2} & (3) \\ \frac{n^2 - m^2}{m^2 + n^2} & (2) \\ \frac{2mn}{m^2 - n^2} & (4) \end{array}$$

41. نقطه تقاطع $y = \sin x + 2$ با محور y عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} (2,0) & (1) \\ (1,1) & (3) \\ (0,2) & (2) \\ (-1,-1) & (4) \end{array}$$

42. اگر $\begin{cases} \tan x + \cot x = a \\ \tan^3 x + \cot^3 x = b \end{cases}$ باشد پس:

$$\begin{array}{ll} b = 3a - a^3 & (1) \\ b = a^3 - 3a & (3) \\ b = a^3 + 3a & (2) \\ b = a - 3a^3 & (4) \end{array}$$

43. اگر A, B و C زوایای یک مثلث a, b و c طول اضلاع مقابل آن باشد، پس

$$\begin{array}{llll} \frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} & \text{مساوی است به:} & & \\ \frac{b}{\sin B} & (4) & \frac{b}{\sin 2B} & (3) & \frac{\sin B}{b} & (2) & 2 \frac{b}{\sin B} & (1) \end{array}$$

44. اگر در مثلث ABC ، $\frac{b-c}{b+c} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ، $\hat{A} = 90^\circ$ و $\hat{C}$ و $\hat{B}$ زوایای مقابل طول اضلاع b و c طوریکه b و c طول اضلاع مقابل زوایای $\hat{B}$ و $\hat{C}$ باشد، پس وسعت زاویه $\hat{B}$ مساوی است به:

$$70^\circ \quad (1) \quad 45^\circ \quad (2) \quad 30^\circ \quad (3) \quad 75^\circ \quad (4)$$

45. اگر A, B و C زوایای داخلی یک مثلث و a, b و c بالترتیب طول اضلاع مقابل آن باشد پس

$$\begin{array}{llll} \frac{a+\sin A}{\sin A} & \text{مساوی است به:} & & \\ \frac{b}{\sin B} & (4) & \frac{b+\sin B}{\sin B} & (3) & \frac{\sin B}{b-\sin B} & (2) & \frac{\sin B}{b+\sin B} & (1) \end{array}$$

اگر $\frac{\sin x}{a} = \frac{\cos x}{b} = k$ باشد، پس $k(a+b)$ مساوی است به:

$$(1) \quad (1 - \sin 2x)^{\frac{1}{2}} \quad (2) \quad 1 + \sin 2x \quad (3) \quad (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{2}} \quad (4) \quad \text{هیچکدام}$$

46. $\frac{1}{\sec 18^\circ \cdot \sin 3^\circ \cdot \cos 21^\circ}$ مساوی است به:

$$\begin{aligned} \tan 3^\circ - \tan 21^\circ & (1) \\ \tan 21^\circ - \tan 3^\circ & (2) \\ \cot 3^\circ + \tan 21^\circ & (3) \\ \cot 21^\circ + \tan 21^\circ & (4) \end{aligned}$$

47. در حالت معیاری با زاویه 23° کدام زاویه زیر کوترمینل می باشد:

$$(1) \quad 7423^\circ \quad (2) \quad 7223^\circ \quad (3) \quad 7323^\circ \quad (4) \quad 7123^\circ$$

48. حاصل افاده $\frac{\tan(\sqrt{2}+\sqrt{8}) - \sin(\sqrt{2}+\sqrt{8})}{2 \tan(\sqrt{2}+\sqrt{8})}$ مساوی است به:

$$\begin{aligned} (1) \quad 1 + \sin^2 \frac{\sqrt{18}}{2} & (2) \quad 1 + \cos^2 \frac{\sqrt{18}}{2} \\ (3) \quad 1 - \sin^2 \frac{\sqrt{18}}{2} & (4) \quad 1 - \cos^2 \frac{\sqrt{18}}{2} \end{aligned}$$

49. حاصل افاده $(3 \sin \sqrt{27} + 3 \cos \sqrt{27})(3 \cot \sqrt{27} + 3 \tan \sqrt{27})$ مساوی است به:

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{9}{\csc(3\sqrt{3})} - \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} & (2) \quad \frac{9}{\sin(3\sqrt{3})} + \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} \\ (3) \quad \frac{9}{\sin(3\sqrt{3})} - \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} & (4) \quad \frac{9}{\csc(3\sqrt{3})} + \frac{9}{\cos(3\sqrt{3})} \end{aligned}$$

50. افاده مثلثاتی $\sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{\pi}{4}$ مساوی است به:

$$(1) \quad 0 \quad (2) \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (4) \quad \frac{1}{2}$$

51. افاده مثلثاتی $\cos^2 \frac{x}{10} - \sin^2 \frac{x}{10}$ مساوی است به:

$$(1) \quad \sin \frac{x}{5} \quad (2) \quad \sin \frac{x}{10} \quad (3) \quad \cos \frac{x}{10} \quad (4) \quad \cos \frac{x}{5}$$

52. حاصل افاده $\frac{\cos 12\theta}{\sin 8\theta} - \frac{\sin 12\theta}{\cos 8\theta}$ مساوی است به:

(1) $\frac{\cos 20\theta}{\sin 16\theta}$ (2) $\frac{2\cos 20\theta}{\sin 16\theta}$ (3) $\frac{\cos 20\theta}{\sin 8\theta}$ (4) $\frac{\cos 20\theta}{\cos 8\theta}$

53. اگر $a = 60^\circ$ باشد $2 \sin^2 \frac{a}{2} \cdot \cos^2 \frac{a}{2}$ مساوی است به:

(1) $\frac{5}{8}$ (2) $\frac{7}{8}$ (3) $\frac{1}{8}$ (4) $\frac{3}{8}$

54. $\frac{1}{\sec 18 \cdot \sin 30 \cdot \cos 21}$ مساوی است به:

(1) $\tan 21 - \tan 3$ (2) $\tan 3 - \tan 21$
(3) $\cot 21 + \tan 21$ (4) $\cot 3 + \tan 21$

55. اگر $a \neq 0$ و $\cot 18^\circ = n$ باشد در این صورت $\tan 36^\circ$ مساوی است به:

(1) $\frac{2n}{n^2+1}$ (2) $\frac{2n}{n^2-1}$ (3) $\frac{1}{n}$ (4) $-\frac{1}{n}$

56. افاده مثلثاتی $\sin^2 x \cos^2 x (2 + \tan^2 x + \cot^2 x)$ مساوی است به:

(1) 2 (2) 0 (3) 1 (4) -1

57. افاده $2 - 2\cos^2 4$ عبارت از ؟

(1) $\operatorname{cosec}^2 4$ (2) $2\sec 4$ (3) $\frac{2}{\sec 4}$ (4) $\frac{2}{\operatorname{cosec} 4}$

58. $\cos^2 25$ مساوی است به :

(1) $0,5 + 0,5\cos 50$ (2) $\operatorname{cosec}^2 25$

$$0,5 - 0,5 \operatorname{cosec} 50 \quad (4)$$

$$1 + \cos^2 25 \quad (3)$$

59. اگر $\cos \theta = \frac{4}{5}$ باشد و ضلع دوم زاویه در ربع اول قرار داشته باشد. قیمت $2 \tan \frac{\theta}{2}$ عبارت است از:

$$\frac{2}{3} \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$7 \quad (1)$$

60. افاده مثلثاتی $\cos 70^\circ + \cos 20^\circ$ مساوی است به:

$$-\sqrt{2} \cos 25^\circ \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 25^\circ \quad (1)$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 25^\circ \quad (4)$$

$$\sqrt{2} \cos 25^\circ \quad (3)$$

61.

افاده مثلثاتی $\frac{2 \tan 25^\circ}{1 + \tan^2 25^\circ}$ مساوی است به:

$$\cot 50^\circ \quad (2)$$

$$\tan 50^\circ \quad (1)$$

$$\tan 25^\circ \quad (4)$$

$$\cot 25^\circ \quad (3)$$

62. حاصل افاده $\frac{\cos(80\alpha)}{\cos(40\alpha) + \sin(40\alpha)}$ مساوی است به:

$$\sin(40\alpha) - \cos(40\alpha) \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

$$\cos(40\alpha) - \sin(40\alpha) \quad (4)$$

$$\cos(40\alpha) + \sin(40\alpha) \quad (3)$$

63. حاصل افاده $\frac{8}{\sec(10 - \sqrt{8}) \cos 10 \cdot \sin \sqrt{8}}$ مساوی است به:

$$-8 \tan 10 - \cot \sqrt{8} \quad (2)$$

$$8 \tan 10 + 8 \cot \sqrt{8} \quad (1)$$

$$-8 \tan 3 - \cot \sqrt{8} \quad (4)$$

$$-8 \tan 10 + 8 \cot \sqrt{8} \quad (3)$$

64. اگر $z = \sin \frac{\pi}{2} i + \cos \frac{\pi}{2}$ باشد، پس z^{10} مساوی است به:

$$i \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$-i \quad (1)$$

65. افاده مثلثاتی $\frac{\sin x}{\cot x + \csc x} - \frac{\sin x}{\cot x - \csc x}$ مساوی است به:

$$2 \quad (4)$$

$$-1 \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$-2 \quad (1)$$

66. اگر $\sin \theta + \cos \theta = a$ باشد، پس $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ مساوی است به:

$$a(a^2 - 2) \quad (2)$$

$$\frac{a}{2}(a^2 - 3) \quad (1)$$

$$\frac{a}{2}(a^2 + 2) \quad (4)$$

$$\frac{a}{2}(3 - a^2) \quad (3)$$

67. قیمت افاده $\frac{\cos 25^\circ}{\sin 15^\circ \cdot \cos 40^\circ}$ مساوی است به:

$$\tan 40^\circ - \cot 15^\circ \quad (2)$$

$$\tan 40^\circ + \cot 15^\circ \quad (1)$$

$$\text{هیچکدام} \quad (4)$$

$$\tan 15^\circ + \cot 40^\circ \quad (3)$$

68. حاصل افاده $\frac{\sin(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{12})}{\cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{12}}$ مساوی است به:

$$\tan \frac{\pi}{8} + \tan \frac{\pi}{12} \quad (2)$$

$$\tan \frac{\pi}{8} - \tan \frac{\pi}{12} \quad (1)$$

$$\cot \frac{\pi}{8} - \cot \frac{\pi}{12} \quad (4)$$

$$\cot \frac{\pi}{8} + \cot \frac{\pi}{12} \quad (3)$$

69. حاصل افاده $\frac{\sqrt{6} \sin \sqrt{6}}{(1+\cos \sqrt{6})} + \cos \sqrt{6} (\sqrt{6} + \sqrt{6} \cos \sqrt{6})$ مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} \frac{2\sqrt{2}}{\cos \sqrt{6}} (2) & \frac{24}{\sin \sqrt{6}} (1) \\ \sqrt{6} \csc \sqrt{6} (4) & 2\sqrt{6} \cos \sqrt{6} (3) \end{array}$$

70. برای کدام قیمت α سیستم $\begin{cases} x - y = \frac{\pi}{3} \\ \sin x \cdot \cos x = \alpha \end{cases}$ دارای حل می باشد:

$$\begin{array}{ll} -\sqrt{3} \leq 4\alpha \leq 1 (1) & 0 \leq \alpha \leq 1 (2) \\ -\sqrt{3} \leq \alpha \leq 1 (3) & -3 \leq 4\alpha \leq 1 (4) \end{array}$$

71. برای کدام قیمت های ذیل a سیستم $\begin{cases} \sin x + \sin y = a \\ x + y = \frac{\pi}{2} \end{cases}$ دارای حل می باشد:

$$\begin{array}{ll} a < -\sqrt{2} (1) & -\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2} (2) \\ -2 \leq a \leq 2 (3) & a > -\sqrt{2} (4) \end{array}$$

72. کدام یکی از سیستم های ذیل حل ندارد:

$$\begin{array}{ll} \begin{cases} \sin x \sin y = 0 \\ x + y = \frac{\pi}{2} \end{cases} (2) & \begin{cases} \sin x \sin y = 3 \\ x + y = \pi \end{cases} (1) \\ \begin{cases} \sin x \sin y = 1 \\ x + y = \pi \end{cases} (4) & \begin{cases} \sin x \sin y = 0 \\ x + y = \pi \end{cases} (3) \end{array}$$

73. اگر $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 1$ باشد آنگاه قیمت $\tan \frac{x}{2}$ عبارت از:

$$\begin{array}{llll} \sqrt{3} (1) & \frac{\sqrt{3}}{2} (2) & \frac{\sqrt{3}}{3} (3) & 2\sqrt{3} (4) \end{array}$$

74. اگر $\arccos(\sin x) = \sin a$ باشد آنگاه قیمت x از جنس a عبارت از:

$$x = \frac{\pi}{2} - \sin a \quad (2)$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \sin a \quad (4)$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \cos a \quad (1)$$

$$x = \frac{\pi}{2} - \cos a \quad (3)$$

75. حل معادله $1 + \log \sin x - \log \cos x = 0$ عبارت است از:

$$x = \arctan \frac{1}{10} + 2k\pi \quad (2)$$

$$x = \arctan 10 + 2k\pi \quad (4)$$

$$x = \arctan \frac{1}{10} + k\pi \quad (1)$$

$$x = \arctan 10 + k\pi \quad (3)$$

76. برای کدام قیمت های a معادله $\sin x \cos x \cos 2x = a$ دارای جواب است؟

$$\frac{1}{4} < a \leq 1 \quad (2)$$

$$a > \frac{1}{4} \quad (4)$$

$$a < -\frac{1}{4} \quad (1)$$

$$-\frac{1}{4} \leq a \leq \frac{1}{4} \quad (3)$$

77. حل عمومی معادله مثلثاتی $2 \cos x - \sqrt{3} = 0$ عبارت است از:

$$\left\{ x/x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}, x \in Z \right\} (2) \quad \left\{ x/x = k\pi \pm \frac{\pi}{4}, x \in Z \right\} (1)$$

$$\left\{ x/x = (2k+1)\pi \pm \frac{\pi}{6}, x \in Z \right\} (4) \quad \left\{ x/x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, x \in Z \right\} (3)$$

78. برای کدام قیمت x معادله $4 \sin x - 2 = 0$ صدق میکند:

$$x = \frac{\pi}{6} (4) \quad x = -\frac{\pi}{2} (3) \quad x = 2\pi (2) \quad x = \frac{\pi}{2} (1)$$

79. کدام قیمت x در معادله $4 \sin x = \frac{2}{\cos x}$ صدق میکند:

$$30 (4) \quad 60 (3) \quad 90 (2) \quad 45 (1)$$

80. اگر $0 < x < \pi$ و $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ باشد، پس $\tan x$ مساوی است به:

$$\frac{1+\sqrt{7}}{4} (4) \quad -\frac{(4+\sqrt{7})}{3} (3) \quad \frac{4-\sqrt{7}}{3} (2) \quad \frac{1-\sqrt{7}}{4} (1)$$

81. ست حل معادله $\cot x - 1 = 0$ عبارت از:

$$(x = k\pi + \frac{\pi}{3}, x \in Z) (1) \quad (x = k\pi + \frac{\pi}{5}, x \in Z) (2)$$

$$(x = k\pi + \frac{\pi}{4}, x \in Z) (3) \quad (x = 2k\pi + \frac{\pi}{5}, x \in Z) (4)$$

82. قیمت x در معادله $\sqrt{8}\sin^2 x - 2\sin x = 0$ مساوی است به:

$$30 (1) \quad 45 (2) \quad 60 (3) \quad 90 (4)$$

83. یک حل معادله $\tan^2 x - 4\tan x + 3 = 0$ عبارت است از:

$$x = \frac{\pi}{4} (1) \quad x = -\frac{\pi}{4} (2) \quad x = \frac{\pi}{6} (3) \quad x = \frac{\pi}{3} (4)$$

84. ست حل های مثلثاتی $\cos \frac{4\pi}{3} = \tan \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) (\sin x - \tan x)$ عبارت است از:

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{6} (1) \quad k\pi \pm \frac{\pi}{3} (2) \quad 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} (3) \quad k\pi - \frac{\pi}{6} (4)$$

85.

اگر C, B, A زوایای یک مثلث و a, b, c اضلاع مقابل این زوایا باشد، پس $\cos C$ مساوی است

به:

$$\frac{a^2+b^2+c^2}{abc} (1) \quad \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} (2)$$

$$\frac{a^2+b^2+c^2}{ab} (3) \quad \frac{a^2+b^2+c^2}{2bc} (4)$$

86. در مثلث ABC ، $a = 3\sqrt{3}$ ، $b = 9$ ، $c = 6\sqrt{3}$ باشد، پس $\cos B$ مساوی است به:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (1) \quad \frac{\sqrt{3}}{3} (2) \quad \frac{1}{2} (3) \quad 1 (4)$$

87. اگر C, B, A زوایای داخلی یک مثلث و c, b, a بالترتیب طول اضلاع مقابل آن باشد، پس

$$\frac{a + \sin A}{\sin A} \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{\sin B}{b + \sin B} \quad (4) \quad \frac{b + \sin B}{\sin B} \quad (3) \quad \frac{b}{\sin B} \quad (2) \quad \frac{\sin B}{b - \sin B} \quad (1)$$

88. در مثلث ABC , $a = 50 \text{ cm}$ و $R = 25\sqrt{2} \text{ cm}$ است، پس اندازه زاویه A مساوی است به:

$$15^\circ \quad (4) \quad 60^\circ \quad (3) \quad 45^\circ \quad (2) \quad 30^\circ \quad (1)$$

89. محیط یک مثلث متساوی الاضلاع 84 سانتی متر است، شعاع دایره محاطی آن عبارت است از:

$$\frac{28}{18} \sqrt{3} \text{ cm} \quad (2) \quad \frac{84}{18} \sqrt{3} \text{ cm} \quad (1)$$

$$\frac{84}{3} \sqrt{3} \text{ cm} \quad (4) \quad \frac{84}{6} \sqrt{3} \text{ cm} \quad (3)$$

90. $\frac{1}{\sec 22^\circ \cdot \sin 31^\circ \cdot \cos 53^\circ}$ مساوی است به:

$$\tan 53^\circ + \cot 31^\circ \quad (2) \quad \tan 22^\circ + \cot 53^\circ \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \sec 22^\circ \cdot \sin 84^\circ \quad (4) \quad 2 \sec 22^\circ \cdot \cos^2 53^\circ \quad (3)$$

91. اگر $A + B = \frac{\pi}{4}$ باشد پس $(1 + \tan A)(1 + \tan B)$ مساوی است به:

$$2 \quad (4) \quad -1 \quad (3) \quad \sqrt{3} \quad (2) \quad 1 \quad (1)$$

92. $\cos^2 \sqrt{3} + \frac{\tan^2 \sqrt{3}}{\sec^2 \sqrt{3}}$ مساوی است به:

$$2 \quad (4) \quad \tan^2 \sqrt{3} - 1 \quad (3) \quad 1 \quad (2) \quad \tan^2 \sqrt{3} \quad (1)$$

فصل هشتم

هندسه

هندسه مسطحه

مفاهیم اساسی هندسه: اساس گذار این هندسه اقلیدس بوده که می توان این هندسه را دو بعدی تعریف نموده که دارای مفاهیم اساسی ذیل می باشد.


نقطه: کوچک ترین اثر روی یک سطح یا شکل که از ابعاد آن صرف نظر گردیده باشد، نقطه نامیده می شود.

خط: اتصال نقاط روی یک سطح یا شکل هندسی که فقط طول آن مورد توجه باشد، خط نامیده می شود.


اقسام خط: بطور عموم خط به سه نوع می باشد.

1. **خط مستقیم:** کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه را خط مستقیم می نامند، که به سه شکل ملاحظه می گردد.


• **قطعه خط (خط محدود):** خط مستقیم که مبدأ و انجام آن معلوم باشد.




• **نیم خط (خط نیمه محدود):** خط مستقیم که دارای مبدأ و فاقد انجام باشد.



• **خط نامحدود:** خط مستقیم که مبدأ و انجام آن محدود نگردیده.




2. **خط منکسر:** چندین قطعه خط مستقیم که در امتداد همدیگر قرار نداشته باشند خط منکسر نامیده می شود.




3. **خط منحنی:** خط که در هر حالت با خط مستقیم فقط یک نقطه مشترک داشته باشد و یا به عباره دیگر

خط که نه در شکل مستقیم و نه در شکل منکسر باشد خط منحنی نامیده می شود.




حالات خطوط نظر به همدیگر

(1) **خطوط موازی:** خطوط مستقیم که در یک سطح قرار داشته و هیچ نقطه مشترک نداشته باشند خطوط




موازی نامیده می شوند.

(2) **خطوط متقاطع:** به خطوط گفته می شوند که یکدیگر را در یک نقطه قطع نمایند.




(3) **خطوط منطبق:** خطوط که تمام آنها با همدیگر مشترک باشند، خطوط منطبق می گویند.




وضعیت خط مستقیم:


(1) **خط افقی:** به خط مستقیمی گفته می شود، که موازی با سطح زمین باشد.




(2) **خط عمودی:** به خط مستقیمی گفته می شود که در امتداد شاقول باشد.



(3) **خط مایل:** خط مستقیمی که بالای یک سطح نه موازی و نه عمود باشد.



زاویه: شکلی را که دو خط مستقیم متقاطع در نزدیکی نقطه تقاطع خود تشکیل می دهند، که دارای مبدأ مشترک باشند و زاویه نامیده می شود.




$\overline{OA}$ و $\overline{OB}$ اضلاع زاویه و O رأس زاویه و α وسعت زاویه گفته می شود.

اندازه گیری زاویه: واحداث اندازه گیری زاویه درجه، گراد و رادیان می باشد طوریکه یک دایره به 360 حصه مساوی تقسیم گردیده هر حصه آن یک درجه نامیده می شود.


آله اندازه گیری زاویه: نقاله می باشد که از یک نیم دایره تشکیل گردیده که از چپ به راست و راست به چپ به 180 حصه مساوی تقسیم گردیده است.

انواع زاویه:


زاویه قائمه: زاویه است که اضلاع آن با همدیگر عمود باشند، یا وسعت آن 90° باشد.




زاویه حاده: زاویه است که وسعت آن کمتر از 90° باشد. $0^\circ < \alpha < 90^\circ$




زاویه منفرجه: زاویه است که وسعت آن بیشتر از 90° باشد. $90^\circ < \alpha < 180^\circ$




زاویه مستقیمه: زاویه است که وسعت آن دو قائمه (مساوی به 180°) باشد $\alpha = 180^\circ$



زوایای مجاوره: دو زاویه که رأس مشترک، ضلع مشترک داشته باشند، زوایای مجاوره نامیده میشود.




زوایای مکمله: دو زاویه که مجموعه آنها یک قائمه (90°) باشند مکمله یکدیگر نامیده می شوند.



$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 90^\circ$$


زوایای متممه: دو زاویه که مجموعه آنها دو قائمه 180° باشند متمم یکدیگر نامیده میشوند.



$$\hat{\theta} + \hat{\gamma} = 180^\circ$$

زوایای متقابل براس: زوایای که از امتداد اضلاع یکدیگر تشکیل گردیده باشند، متقابل بردس نامیده

می شوند، زوایای متقابل براس بدو با همدیگر مساوی اند.



زوایای متبادله و متوافقه: هرگاه دو خط موازی توسط یک خط مستقیم قطع گردد، هشت زاویه را

تشکیل میدهد. مانند شکل ذیل.

طوریکه: زوایای $\hat{1}, \hat{2}, \hat{7}, \hat{8}$ زاویای خارجی

زوایای $\hat{3}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{6}$ زوایای داخلی گفته می شوند.

زوایای متبادله: دو زاویه که هر دو آن داخلی و یا هر دو آن خارجی بود بدو طرف خط قاطع قرار داشته

و رأس مشترک نداشته باشند متبادله نامیده می شوند که با هم مساوی نیز می باشند.

زوایای $(\hat{3}, \hat{5})$ و $(\hat{4}, \hat{6})$ متبادله داخلی بوده که $\hat{3} = \hat{5}$ و $\hat{4}, \hat{6}$ می باشد.


زوای $(\hat{1}, \hat{7})$ و $(\hat{2}, \hat{8})$ متبادله خارجی بوده که $\hat{1} = \hat{7}$ و $\hat{2}, \hat{8}$ است.

زوایای متوافقه: دو زاویه که یکی آن داخلی و یکی آن خارجی بوده به یک طرف خط قاطع قرار داشته و رأس مشترک نداشته باشند، متوافقه نامیده می شوند که با هم مساوی نیز می باشند. یعنی:


$$(\hat{1}, \hat{5}) \Rightarrow \hat{1} = \hat{5}, (\hat{2}, \hat{6}) \Rightarrow \hat{2} = \hat{6}, (\hat{3}, \hat{7}) \Rightarrow \hat{3} = \hat{7} \text{ و } (\hat{4}, \hat{8}) \Rightarrow \hat{4} = \hat{8} \text{ می باشند.}$$

مضلعات (چند ضلعی ها)


مضلع عبارت از خط منکسر بسته یی است که فقط یک ناحیه بسته را تشکیل می دهد که هیچ دو خط آن به امتداد یک خط مستقیم قرار نداشته و هر رأس آن نقطه تقاطع دو قطعه خط باشد، مانن: سه ضلعی (مثلث)، چهار ضلعی (مربع، مستطیل، ذوزنقه،...) پنج ضلعی، شش ضلعی و غیره.



مضلع محدب: مضلعی است که امتداد اضلاع آن هیچ ضلع از مضلع را قطع ننماید:



مضلع مقعر: عبارت از مضلعی است که حداقل امتداد یکی از اضلاع آن مضلع مذکور را قطع نماید.



مضلع منظم: به مضلعی گفته می شود که طول تمام اضلاع آن با هم مساوی و وسعت تمام زوایای آن با هم یکسان باشند.

مضلع غیر منظم: مضلعی را می گویند که طول اضلاع با هم مساوی نبوده و همچنان وسعت زوایا نیز با هم مساوی نباشند.

قطر مضلع: عبارت از خطی مستقیمی است که دو رأس غیر مجاور مضلع را با هم وصل می نماید.

یادداشت: برای یک مضلع n ضلعی روابط ذیل را بخاطر داشته باشید:

(1) مجموعه تمام اقطار یک مضلع n ضلعی عبارت از:

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

(2) تعداد قطرهای که از یک رأس ضلع n ضلعی می گذرد، عبارت از:

$$N = n - 3$$

(3) تعداد مثلث های که از اثر ترسیم یک مضلع n ضلعی به دست می آید، عبارت از:

$$\Delta = n - 2$$

(4) مجموعه زوایای داخلی یک مضلع n ضلعی عبارت از:

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

(5) وسعت یک زاویه داخلی مضلع منظم n ضلعی عبارت از:


$$n = \frac{360}{180 - \alpha} \quad \hat{\alpha} = \frac{(n - 2) \cdot 180}{n} \quad \text{و یا}$$

(6) وسعت یک زاویه خارجی مضلع منظم n ضلعی عبارت از:

$$\hat{\beta} = \frac{360}{n}$$


مثلث

مضلع که تنها دارای سه ضلع باشد یا سطح که توسط سه قطعه خط محدود شده باشد مثلث نامیده می شود، هر مثلث دارای سه ضلع (a, b, c) سه رأس (A, B, C) و سه زاویه (α, β, γ) می باشد.




انواع مثلث:

الف: مثلث ها از نظر طول اضلاع به سه دسته تقسیم گردیده است.




(1) **مثلث متساوی الاضلاع:** مثلث که طول تمام اضلاع آن با هم مساوی باشند.

(2) **مثلث متساوی الساقین:** مثلث که دو ضلع آن با هم مساوی باشند.




(3) **مثلث مختلف الاضلاع:** مثلث که طول تمام اضلاع آن مختلف باشند.




ب: مثلث ها از نظر زاویه به سه دسته تقسیم گردیده است.

(1) **مثلث حاده الزاویه:** مثلث که تمام زوایای داخلی آن حاده باشد $\hat{\alpha} < 90^\circ$, $\hat{\beta} < 90^\circ$, $\hat{\theta} < 90^\circ$




(2) **مثلث قائم الزاویه:** مثلث که اندازه یک زاویه داخلی آن (90°) باشد. $\hat{\beta} < 90^\circ$, $\hat{\theta} < 90^\circ$, $\hat{\alpha} < 90^\circ$



همچنان ضلع مقابل زاویه 90° را وتر مثلث نیز می نامند.

(3) **مثلث منفرجه الزاویه:** مثلث که اندازه یک زاویه داخلی آن منفرجه (بزرگتر از 90°) باشد.




$$\hat{\alpha} < 90^\circ$$

$$\hat{\beta} < 90^\circ$$

$$\hat{\theta} < 90^\circ$$


ارتفاع مثلث: عبارت از خط مستقیمی است که رأس مثلث بالای ضلع مقابل آن عمود باشد. مانند خط

$\overline{BH}$




بخاطر داشته باشید که:

1. ارتفاعات مثلث یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.
2. ارتفاعات مثلث حاده الزاویه یکدیگر را در داخل مثلث قطع می کنند.
3. ارتفاعات مثلث قائم الزاویه یکدیگر را در روی رأس قائم قطع می کنند.
4. ارتفاعات مثلث منفرجه یکدیگر را در خارج مثلث قطع می کنند.
5. در هر مثلث قائم الزاویه ارتفاع که از رأس قائم بالای وتر آن رسم شود مساوی به نصف طول وتر است.



میانۀ مثلث: عبارت از خط مستقیمی است که رأس مثلث ضلع مقابل آنرا تنصیف نماید. مانند $\overline{BD}$ بخاطر داشته باشید که در تمام انواع مثلث ها میانه ها یکدیگر را در یک نقطه در داخل مثلث قطع میکنند. (نقطه تقاطع مرکز ثقل مثلث می باشد) و نقطه تقاطع میانه ها، هر میانه را به نسبت 2 بر 1 تقسیم می کند.




ناصف زاویه مثلث: عبارت از خط مستقیمی است که زوایای مثلث را به دو حصه مساوی تقسیم می نماید، مانند $\overline{BM}$ ، طوریکه $\hat{1} = \hat{2}$ است. ناصف زوایای داخلی هر مثلث یکدیگر را در یک نقطه در داخل مثلث قطع می نماید.


ناصف عمودی: هرگاه در یک مثلث ارتفاع و میانه با هم منطبق باشند ناصف عمودی نامیده می شود.

بخاطر داشته باشید که:

- 1- در مثلث متساوی الاضلاع میانه ها، ارتفاعات و ناصف الزاویا با هم منطبق اند. خط $\overline{BD}$ ارتفاع میانه و ناصف الزاویه می باشد.




2- در مثلث متساوی الساقین رأس که از ارتفاع و میانه از این رأس با هم منطبق اند، یعنی ناصف عمودی می باشد.



خواص زاویا و اضلاع یک مثلث:


(1) مجموع زوایای داخلی هر مثلث مساوی به دو قایمه (180°) می باشد.

(2) اگر اضلاع یک مثلث را به ترتیب امتداد بدهیم مجموعه زوایای خارجی آن 360° می باشد.




(3) مجموعه تمام زوایای خارجی هر مثلث 900° می باشد.

(4) مجموعه تمام زوایای خارجی در هر مثلث مساوی به مجموعه دو زاویه داخلی غیر مجاور آن می باشد.




(5) مثلث متساوی الاضلاع عبارت از یک مضلع منظم بوده که طول اضلاع و همچنان اندازه زوایای داخلی آن با هم مساوی اند.

$$a = b = c, \hat{\alpha} = \hat{\beta} = \hat{\theta}$$



(6) در مثلث متساوی الساقین اندازه دو زاویه داخلی مقابل اضلاع مساوی مثلث با هم مساوی اند.




$$\hat{\alpha} = \hat{\theta}$$

$$\overline{AB} = \overline{BC}$$

(7) ناصف الزوایای داخلی و خارجی مثلث در یک رأس بالای همدیگر عمود اند.

(8) در هر مثلث مجموعه دو ضلع همیشه بزرگ تر از ضلع سوم می باشد. یعنی:





$$b + c > a, \quad a + c > b, \quad a + b > c$$

تشابه دو مثلث:

دو مثلث زمانی با هم متشابه گفته می شوند که:

(1) تمام زوایای آنها دو به دو با هم مساوی باشند.

(2) تمام اضلاع آن دو به دو با هم متناسب باشند.



$$\alpha = \alpha'$$

$$\frac{a}{a'} + \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} \quad \text{و} \quad \beta = \beta'$$

$$\theta = \theta'$$

انطباق پذیری دو مثلث: دو مثلث در سه حالت ذیل انطباق پذیر گفته می شوند.

(1) طول هر سه ضلع دو مثلث دوبرو با هم مساوی باشند.


(2) طول دو ضلع و یک زاویه داخلی بین این دو ضلع در هر دو مثلث دوبرو با هم مساوی باشند.

(3) طول یک ضلع اندازه دو زاویه داخلی در هر دو مثلث دوبرو با هم مساوی باشند.

بخاطر داشته باشید که دو مثلث انطباق پذیر با هم متشابه اندف زیرا در مقابل اضلاع مساوی زوایای مساوی قرار دارد. اما دو مثلث متشابه همیشه با هم انطباق نیست، زیرا امکان دارد در مقابل زوایای مساوی اضلاع مساوی قرار نداشته باشند.

قضایا:


(1) در هر مثلث قائم الزاویه مربع هر یک از اضلاع قائم مساوی به حاصل ضرب وتر در مرتسم همان ضلع قائم بالای وتر می باشد. یعنی:



$$AB^2 = AC \cdot AD \Rightarrow c^2 = b \cdot AD$$


$$BC^2 = AC \cdot CD \Rightarrow a^2 = b \cdot DC$$

(2) در هر مثلث قائم الزاویه مجموعه مربعات دو ضلع قائم مساوی به مربع وتر می باشد (قضیه فیثاغورث) یا (پیتاگور)




(3) در هر مثلث قائم الزاویه ارتفاع مربوط رأس قائم عبارت از وسط هندسی مرتسمات دو ضلع قائم بالای وتر همان مثلث می باشد.

$$CD = \sqrt{AD \cdot BD} \text{ و یا } CD^2 = AD \cdot BD \text{ یعنی}$$



(4) در هر مثلث قایم الزاویه حاصل ضرب اضلاع قایم مساوی به حاصل ضرب وتر و ارتفاع رأس قایم آن مثلث می

باشد، یعنی $a \cdot b = h \cdot c$




همچنان با در نظر قضیه فیساگورث و رابطه فوق می توان نوشت:


$$\left. \begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \dots (1) \\ h^2 c^2 &= a^2 \cdot b^2 \dots (2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{c^2}{h^2 \cdot c^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} \Rightarrow \frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

(5) در هر مثلث منفرج الزاویه مربع ضلع مقابل زاویه منفرجه مساویست به:

$$\hat{\alpha} > 90^\circ$$




(6) در هر مثلث مربع ضلع مقابل زاویه حاده مساویست به:



(7) در هر مثلث مجموع مربعات هر دو مضلع آن مثلث مساوی به دو چند مجموع مربعات نصف ضلع سوم و میانه

ضلع سوم می باشد.


$$\overline{AB}^2 - \overline{AC}^2 = 2(\overline{BM}^2 + \overline{AM}^2)$$



یعنی مربع میانه مساوی است به:

$$\overline{AM}^2 = \frac{b^2}{2} + \frac{c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$$

(8) تفاضل مربعات دو ضلع یک مثلث مساوی به دو چند حاصل ضرب ضلع سوم و مرتسم میانه ضلع سوم است.




$$\overline{AB}^2 - \overline{AC}^2 = 2\overline{BC} \cdot \overline{MH}$$

$$\Rightarrow c^2 - b^2 = 2a \cdot \overline{MH}$$

دعوی تالس

اگر یک خط موازی به یک ضلع مثلث ABC رسم گردد اضلاع مقابل را متناسباً تقسیم می نماید:




یعنی: $\frac{AF}{FC} = \frac{AE}{EB}$

همچنان $\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF} = \frac{BC}{FC}$

خواص ناصف زوایای یک مثلث

1. ناصف الزوایای داخلی یک مثلث اضلاع مقابل را داخلی متناسب به نسبت اضلاع مجاور تقسیم می نماید، در

حالی که خط $\overline{AD}$ ناصف زاویه داخلی زاویه $\hat{A}$ مثلث $\triangle ABC$ می باشد.




پس $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$

2. طول ناصف الزاویه داخلی در مثلث در حالی که $\overline{AD}$ ناصف الزاویه $\hat{A}$ باشد، از رابطه ذیل به دست می آید:

$\alpha_1 = \alpha_2$


$P = \frac{a+b+c}{2}$

$\overline{AD} = \frac{2}{b+c} \sqrt{bc \cdot p(p-a)}$




3. ناصف الزوایای خارجی یک مثلث $\triangle ABC$ اضلاع مقابل را خارجاً به نسبت اضلاع مجاور تقسیم می کند، در

حالی که خط $\overline{AD}$ ناصف زاویه خارجی زاویه $\hat{A}$ مثلث $\triangle ABC$ می باشد. پس $\frac{DC}{BD} = \frac{AC}{AB}$



محیط مثلث: عبارت از مجموع طول اضلاع مثلث است، یعنی:


$$P = a + b + c$$



مساحت مثلث: عبارت از سطح است که توسط اضلاع مثلث محاط شده باشد، که در چهار حالت میتوان مساحت مثلث را دریافت نمود.


حالت اول: در صورتیکه طول قاعده و ارتفاع مثلث معلوم باشد، پس:

$$A = \frac{1}{2} a \cdot h$$




حالت دوم: در صورتیکه دو ضلع و زاویه بین این دو ضلع معلوم باشد، پس:

$$A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \alpha$$



حالت سوم: در صورتیکه طول سه ضلع مثلث معلوم باشد، در حالیکه $s = \frac{a+b+c}{2}$ است، پس:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$



با در نظر داشت حالت سوم مساحت مثلث متساوی الاضلاع $A = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ و طول ارتفاع آن $h = \frac{\sqrt{3}}{2} a$ می باشد.

حالت چهارم: در صورتیکه مختصات رأس های یک مثلث $A(x_1, y_1)$ ، $B(x_2, y_2)$ و $C(x_3, y_3)$ داده شده باشد، مساحت مثلث مذکور از رابطه ذیل حاصل می گردد:


$$A = \frac{1}{2} \{ (x_1 y_3 - x_3 y_1) + (x_2 y_1 - x_1 y_2) + (x_3 y_2 - x_2 y_3) \}$$

و یا با استفاده از دترمینانت ذیل می توان چنین نوشت:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} [(x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (y_1 x_2 + y_2 x_3 + y_3 x_1)]$$

چهار ضلعی ها

مضلع که توسط چهار قطعه خط محدود شده باشد چهار ضلعی گفته می شود، هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع، چهار رأس، چهار زاویه و دو قطر می باشد.



انواع چهار ضلعی ها:


I. متوازی الاضلاع: چهار ضلع است که اضلاع مقابل آن دو به دو با هم موازی باشند.

خواص متوازی الاضلاع:

- اضلاع مقابل آن با هم مساوی اند. $\overline{AD} = \overline{BC}$ و $\overline{AB} = \overline{CD}$
 - وسعت زوایای مقابل آن با هم مساوی اند. $\hat{A} = \hat{C}$ و $\hat{B} = \hat{D}$
 - مجموعه زوایای داخلی آن مساوی به 360° می باشد. $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$
 - مجموعه زوایای مجاور آن مساوی به 180° می باشد. $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$, $\hat{C} + \hat{D} = 180^\circ$, $\hat{A} + \hat{D} = 180^\circ$
 - قطرهای متوازی الاضلاع همدیگر را تنصیف می نمایند. یعنی:
- $$\overline{AP} = \overline{PC}, \quad \overline{BP} = \overline{PD}$$

- محیط متوازی الاضلاع عبارت از:

$$P = 2(a + b)$$



II. مستطیل: عبارت از متوازی الاضلاع است که زوایای داخلی آن قائمه باشد.

خواص مستطیل:

1. طول اضلاع دو به دو با هم مساوی اند. یعنی

$$\overline{AB} = \overline{CD} \quad , \quad \overline{AD} = \overline{BC}$$

2. قطرهای مستطیل همدیگر را تنصیف می نمایند. یعنی:

$$\overline{AP} = \overline{PC} \quad , \quad \overline{BP} = \overline{PD}$$

3. طول قطرهای مستطیل با همدیگر مساوی اند. یعنی:

$$\overline{AP} = \overline{BD}$$

4. محیط مستطیل عبارت از:

$$P = 2(a + b)$$


5. مساحت مستطیل عبارت از:

$$A = a \cdot b$$

6. طول قطر مستطیل عبارت از:


$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

7. مساحت مستطیل عبارت از:



$$A = b \cdot h_b$$

III. **مربع:** متوازی الاضلاع که طول آن با هم مساوی و زوایای داخلی آن قائمه باشد، مربع نامیده می شود.



خواص مربع:

• طول قطرهای آن با هم مساوی اند. یعنی:

$$\overline{AC} = \overline{BD}$$

• قطر ها بالای همدیگر عمود اند. یعنی:

$$\overline{AC} \perp \overline{BD}$$

• قطر ها یکدیگر را تنصیف می نمایند. یعنی:

$$\overline{AP} = \overline{PC}, \overline{BP} = \overline{PD}$$

• محیط مربع عبارت از:

$$P = 4a$$


• مساحت مربع عبارت از:

$$A = a^2$$

• طول قطر مربع عبارت از:


$$d = \sqrt{2}a$$

IV. **معین (لوزی):** متوازی الاضلاع که طول تمام اضلاع آن با هم مساوی باشد، معین (لوزی) گفته می شود.




خواص معین:

- اندازه زوایای مقابل آن با هم مساوی اند یعنی: $\hat{A} = \hat{C}$ و $\hat{B} = \hat{D}$
- مجموعه زوایای مجاور آن مساوی به 180° می گردد، یعنی: $\hat{A} = \hat{B} = 180^\circ$, $\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$, $\hat{C} + \hat{D}$, $\hat{A} + \hat{D} = 180^\circ$
- قطرهای همدیگر را تنصیف می نمایند، یعنی: $\overline{AP} = \overline{PC}$ و $\overline{BP} = \overline{PD}$
- قطرهای بالای همدیگر عمود اند، یعنی: $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- محیط معین عبارت از: $P = 4a$
- مساحت معین:




$$A = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$$



$$A = a \cdot h$$


V. **ذوزنقه (منحرف):** عبارت از چهار ضلعی است که دو ضلع آن موازی و دو ضلع آن غیر موازی باشد.

(بخاطر داشته باشید که اضلاع موازی را قاعدتین ذوزنقه هم می نامند)




انواع ذوزنقه:

1. **ذوزنقه متساوی الساقین:** به ذوزنقه گفته می شود که طول دو ضلع غیر موازی آن با هم مساوی باشد.



$$\overline{AB} = \overline{CD} \text{ مانند:}$$

2. **ذوزنقه قائم:** ذوزنقه را گویند که دو زاویه داخلی آن قائمه باشد.



محیط ذوزنقه: در صورتیکه a, b, c و d طول اضلاع آن باشد، پس محیط آن $P = a + b + c + d$

مساحت ذوزنقه: در صورتیکه a, b قاعدتین ذوزنقه و h ارتفاع آن باشد، مساحت $A = \frac{1}{2}(a + b) \cdot h$

VI. **شبه منحرف:** عبارت از چهار ضلعی است که اضلاع آن با هم موازی نباشند.




دایره

عبارت از خط منحنی بسته است که تمام نقاط آن از یک نقطه ثابت (مستقر) دارای فاصله مساوی باشد، نقطه


ثابت (O) را مرکز دایره و فاصله ثابت (r) را شعاع می نامند.

شعاع دایره: فاصله بین مرکز الی محیط دایره شعاع دایره نامیده میشود.

$$r = \overline{OA}$$




وتر دایره: خط مستقیمی که دو نقطه محیط دایره را با هم وصل نماید وتر دایره نامیده می شود.



بخاطر داشته باشید که:


1. خط مستقیمی که از مرکز دایره بالای وتر عمود باشد، وتر و قوس آنرا بدو حصه مساوی تقسیم می نماید.




$$\overline{AD} = \overline{DB} \text{ و } \widehat{AM} = \widehat{MB}$$

2. وتر های مساوی، از مرکز دایره دارای فاصله عمودی مساوی می باشند. اگر $\overline{AB} = \overline{CD}$ باشد، پس

$$\overline{OM} = \overline{ON} \text{ می باشد.}$$




3. قوس های بین دو وتر موازی با همدیگر مساوی می باشند. اگر $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ پس $\widehat{AC} = \widehat{BD}$ است.




قطر دایره: خط مستقیم که دایره را تنصیف نماید قطر دایره نامید می شود و یا وترى که از مرکز دایره عبور نماید (

بزرگترین وتر) قطر دایره نامیده می شود، طوریکه قطر دایره دو چند شعاع دایره می باشد.



مماس دایره: قطعه خط مستقیم که با دایره در یک نقطه تماس داشته باشد بنام مماس دایره یاد می گردد.



قابل یادآوری است اینکه:

1. شعاع دایره در نقطه تماس بالای مماس عمود می باشد.


2. هرگاه نقطه P خارج دایره قرار داشته باشد بر دایره مذکور دو مماس رسم می گردد (که طول مماس ها با هم مساوی اند)

3. هرگاه نقطه P روی محیط دایره قرار داشته باشد بر دایره مذکور یک مماس رسم می گردد.


4. هرگاه نقطه P داخل دایره قرار داشته باشد بر دایره مذکور هیچ مماس رسم نمی گردد (خط مذکور دایره را در دو نقطه قطع می کند)

وضعیت دو دایره با همدیگر


- دو دایره غیر متقاطع: به دایره گفته می شود که هیچ نقطه مشترک نداشته باشند.




- دایره متقاطع: به دایره های گفته می شود که دارای دو نقطه مشترک باشند.



- دایره با هم مماس: به دایره گفته می شود که تنها یک نقطه مشترک داشته باشند.



- دایره متحد المركز: به دایره گفته می شود که مراکز آنها منطبق و طول شعاعات آنها متفاوت باشد.



یادداشت:

در صورتیکه: $C(O, R)$ و $C'(O', R')$

دو دایره را ارائه نمایید، طوریکه: $d = OO'$ و $R > R'$

فاصله خط واصل مراکز دایره را نشان می دهد، در اینصورت داریم که:

- دایره غیر متقاطع اند اگر: $d > R + R'$

- دایره متقاطع اند اگر: $\begin{cases} d < R + R' \\ d > R - R' \end{cases}$


- دایره مماس خارجی اند اگر: $d = R + R'$

• دواير مماس اند اگر: $d = R - R'$

• دواير تداخل اند اگر: $d < R - R'$

زوایای مربوط به دایره


(1) **زاویه مرکزی:** زاویه را گویند که رأس آن در مرکز دایره و دو ضلع آن در امتداد شعاع دایره باشد.



الف- اندازه وسعت هر زاویه مرکزی مساوی به قوس مقابل آن است.


ب- طول قوس زاویه مرکزی از رابطه $\frac{\widehat{AB}}{P} = \frac{\hat{\theta}}{360^\circ}$ بدست می آید. (طوری که P محیط دایره را نشان می دهد).

(2) **زاویه محیطی:** به زاویه گفته می شود که رأس آن در محیط دایره قرار داشته و اضلاع آن در امتداد وترهای دایره باشد.



بخاطر داشته باشید که:

الف- وسعت هر زاویه محیطی مساوی به نصف قوس مقابل که توسط آن قطع شده می باشد.




$$\hat{\alpha} = \frac{1}{2} \widehat{AC}$$

ب- زوایای محیطی که در مقابل عین قوس دایره قرار داشته باشند. با هم مساوی اند.

$$\hat{\alpha}_1 = \hat{\alpha}_2$$


ج - زاویه محیطی که اضلاع آن از انجام های قطر دایره عبور نماید، یا به عباره دیگر در مقابل نصف محیط دایره قرار داشته باشد، مساوی به یک قائمه (90°) است.



(3) **زاویه مماسی:** زاویه که یک ضلع آن مماس دایره و ضلع دیگر آن وتر دایره بوده و رأس آن در نقطه

تماس قرار داشته باشد، زاویه مماسی گفته می شود.

بخاطر داشته باشید که:




وسعت هر زاویه مماسی نصف قوس مقابل آن است. $\hat{\beta} = \frac{1}{2} \widehat{BT}$

رابطه بین زوایای محیطی، مرکزی و مماسی:

هرگاه زوایای محیطی، مرکزی و مماسی که در مقابل عین قوس دایره قرار داشتند بین آنها روابط ذیل

وجود دارد: طوریکه $\hat{\theta}$ زاویه مرکزی، $\hat{\alpha}$ زاویه محیطی و $\hat{\beta}$ زاویه مماسی می باشد.



$$\theta = 2\alpha \Rightarrow \hat{\alpha} = \frac{\theta}{2} \quad \dots\dots\dots (1)$$




$$\theta = 2\beta \Rightarrow \hat{\beta} = \frac{\theta}{2} \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\hat{\alpha} = \hat{\beta} \quad \dots\dots\dots (3)$$

زاویه خارجی یک دایره

زاویه که از تقاطع دو مماس، با یک مماس و یک قاطع و یا دو قاطع بر دایره تشکیل می شود زاویه خارجی

نامیده می شود:




به خاطر داشته باشید که در هر یک از حالت فوق اندازه زاویه خارجی مساوی است به نصف تفاضل قوس های

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{2}(n - m) \text{ یعنی: } \hat{\alpha} \text{ در مقابل آن زوایا قرار دارند.}$$

زاویه داخلی دایره

زاویه که از تقاطع دو تر در داخل یک دایره تشکیل می شوند زاویه داخلی آن دایره یاد می شوند. $\hat{\alpha}$ و $\hat{\beta}$


زوایای داخلی دایره نامیده می شوند.



وسعت یک زاویه داخلی مساوی به نصف مجموع قوس های قطع شده توسط اضلاع و امتداد اضلاع همان زاویه است. یعنی:


$$\hat{\beta} = A\hat{E}D = \frac{1}{2}(\widehat{AD} + \widehat{CB}) \text{ و یا } \hat{\alpha} = B\hat{E}D = \frac{1}{2}(\widehat{BD} + \widehat{CA})$$

دایره محاطی مثلث: عبارت از دایره است که توسط مثلث محاط گردیده باشد.



دایره محیطی مثلث: عبارت از دایره است که مثلث را احاطه نموده و رأس های مثلث بالای محیط

دایره مذکور قرار داشته باشد.



در صورتیکه s نصف محیط مثلث، A مساحت مثلث، r شعاع دایره محاطی و R شعاع دایره محیطی یک


مثلث و a, b, c اضلاع مثلث را نشان دهد، در اینصورت:

$$r = \frac{A}{s} \quad \bullet \text{ شعاع دایره محاطی}$$

$$R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4A} \quad \bullet \text{ شعاع دایره محیطی}$$

به همین ترتیب نسبت بین محیط های دو مضلع منظم که دارای عین تعداد اضلاع اند نسبت بین شعاعات دواير محیطی و محاطی آن دو مضلع عبارت است از:


$$\frac{p}{p'} = \frac{R}{R'} = \frac{r}{r'}$$




روابط طولی در دایره:

- هرگاه از یک نقطه خارجی P بالای دایره (O, r) دو قاطع رسم گردد، حاصل ضرب هر قاطع در قطعه خارجی آن با همدیگر مساوی است. یعنی

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$$



- **طاقة یک نقطه نظر به دایره:** اگر از یک نقطه ثابت در یک مستوی بالای یک دایره دو قاطع طوری رسم گردد که قاطع دومی از مرکز دایره بگذرد، در اینصورت حاصل ضرب قطعات قاطع اولی مساوی به یک مقدار ثابت $d^2 - r^2$ بوده که d فاصله نقطه ثابت الی مرکز دایره و r شعاع دایره را نشان میدهد. یعنی:



$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$$


$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = (PO - CO)(PO + OD)$$

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = (d - r)(d + r)$$

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = d^2 - r^2$$

رابطه اخیر را به نام طاقه یک نقطه P نظر به دایره (O, r) یاد می کنند. به همین ترتیب میتوان بر دایره یک مماس $\overline{PT}$ را رسم نموده، طوریکه فاصل نقطه P الی مرکز دایره d و شعاع دایره r باشد.

پس با در نظر داشت مثلث قائم الزاویه $\triangle PTO$ میتوان چنین نوشت:



پس بطور عموم می توان طاقث نقطه P را نظر به دایره (o, r) چنین نوشت:

$$\overline{PT}^2 = \overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD} = d^2 - r^2$$

پس نظر به موقعیت نقطه P با دایره (o, r) سه حالت ذیل وجود دارد.

الف- هرگاه نقطه P خارج دایره قرار داشته باشد، در این صورت:

$$d > r \Rightarrow d^2 - r^2 > 0 \Rightarrow P(0) > 0$$

یعنی طاقث نقطه نظر به دایره مثبت گفته می شود.

ب- هرگاه نقطه P روی محیط دایره قرار داشته باشد در اینصورت:

$$d = r \Rightarrow d^2 - r^2 = 0 \Rightarrow P(0) = 0$$

یعنی طاقث نقطه نظر به دایره صفر می باشد.


ج- هرگاه نقطه P داخل دایره قرار داشته باشد، در اینصورت:

$$d < r \Rightarrow d^2 - r^2 < 0 \Rightarrow P(0) < 0$$


محور جذری: عبارت از محل هندسی نقاطی است که طاقث های آنها نظر به دو دایره با هم مساوی باشند

محور جذری نامیده می شود. بخاطر داشته باشید که محور جذری دو دایره همیشه بالای خط و اصل مراکز دواير عمود می باشد.


- هرگاه دواير غير متقاطع باشند، محور جذری بالای خط مرکزین دواير عمود بوده طوریکه دواير داده شده را قطع نمی کنند و همچنان فاصله بین محور جذری از نقه تنصیف خط مرکزین دواير از رابطه ذیل بدست می آید.



- محور جذری دو دایره با هم مماس عبارت از مماس مشترک آنها می باشد.



- محور جذری دو دایره متقاطع عبارت از وتر مشترک دواير مذکور می باشد.




- محور جذری دو دایره متحدالمرکز در بی نهایت قرار دارد، زیرا فاصله $O_1O_2 = 0$ گردیده در نتیجه فاصله بین محور جذری و نقطه تنصیف مرکزین دواير نظر به رابطه بدست می آید.

$$IH = \frac{R_1^2 - R_2^2}{2O_1O_2}$$

$$IH = \frac{R_1^2 - R_2^2}{2(0)} = \frac{R_1^2 - R_2^2}{0} = \infty$$

مرکز جذری: هرگاه بیشتر از دو دواير که نه متقاطع و نه مماس اند، موجود بوده نقطه مانند P که طاقت آن نظر به دواير داده شده با هم مساوی باشند، یعنی نقطه تقاطع محورهاى جذرى دوبدو دواير عبارت از مرکز جذرى دواير یاد می گردد.



محیط دایره: در صورتیکه r طول شعاع دایره باشد محیط دایره از رابطه ذیل بدست می آید.


$$P = 2\pi r$$

مساحت دایره: در صورتیکه r طول شعاع دایره را نشان میدهد، مساحت دایره از رابطه ذیل بدست می آید.

$$A = \pi r^2$$

مساحت قطاع دایره: قسمت از سطح دایره که توسط دو شعاع از دایره جدا شده باشد قطاع دایره گفته می

شود که مساحت آن از رابطه ذیل بدست می آید.




$$A = \frac{\pi \cdot \theta \cdot r^2}{360} \text{ و یا } A = \frac{1}{2} \theta \cdot r^2$$

مساحت قطعه دایره: قسمت از سطح دایره که توسط وتر از دایره جدا شده باشد قطعه دایره نامیده می شود


که مساحت آن از رابطه ذیل حاصل می گردد.

$$S = \frac{1}{2} r^2 (\theta - \sin \theta)$$



یادداشت: بخاطر داشته باشید در صورتیکه a و b نصف اقطار یک بیضی (الیپس) را ارائه نماید، محیط الیپس

از روابط ذیل بدست می آید.




ارتسام قایم:

مستقیم Δ را با یک نقطه P خارج این مستقیم در نظر گرفته هرگاه از نقطه عمود pp' را بالای مستقیم Δ


(یک مستوی) رسم نماییم، درینصورت p' عبارت از مرتسم قایم p میباشد.

به خاطر داشته باشید که:


- مرتسم یک نقطه بالای یک مستقیم (مستوی) یک نقطه است.




- مرتسم یک قطعه خط که موازی به Δ باشد عبارت از یک مستقیم است طوریکه: $\overline{A'B'} = \overline{AB}$



- مرتسم یک قطعه خط که عمود به Δ باشد عبارت از یک نقطه است طوریکه: $\overline{AB}$




- مرتسم یک قطعه خط که یک انجام آن بروی مستقیم Δ باشد. $\overline{A'B'} = \overline{AB} \cdot \cos \alpha$



تمائل


بالای خط مستقیم موجه Δ نقاط مستقر O و A را تعیین نموده و یک عدد ثابت $h \neq 0$ را نیز در نظر می گیریم. هرگاه h را به طول OA ضرب نمایم یک طول OA' قرار رابطه $OA' = h \cdot OA$ حاصل می شود. در این صورت عملیه نقطه O را مرکز تماثل و h را نسبت تماثل می نامند. نظر به قیمت های مختلف h موقعیت نقطه OA واقع است.




- اگر $h = \frac{1}{2}$ باشد نقطه A' در وسط OA واقع است.



- اگر $h = 1$ باشد نقطه A' بروی A واقع می شود.



- اگر $h = 2$ باشد نقطه A در وسط OA واقع می شود.



- اگر $h = -1$ باشد نقطه A' مساوی و مختلف الجهت A می گردد.

به خاطر داشته باشید که ممثله هر شکل هندسی نظر به رابطه $OA' = h \cdot OA$ عبارت است از.

- ممثله یک نقطه A نظر به تماثل (O, h) عبارت از یک نقطه است.
- ممثله هر خط مستقیم عبارت از یک خط مستقیم است موازی به مستقیم اولی.
- ممثله یک مثلث عبارت از یک مثلث است متشابه به مثلث اولی.
- ممثله یک دایره، یک دایره است. طوری که هر دوی آنها در یک مستوی واقع باشند.

هندسه فضائی


به قسمت از علم هندسه گفته می شود که با مستوی ها، خصوصیات آنها، قضایای مربوط و روابطی که بین اشکال و اجسام هندسی از فضا وجود دارد، بحث می نماید. این هندسه را میتوان سه بعدی نیز تعریف نمود که اساس گذار آن اقلیدوس می باشد.

فضاء از جمله مفاهیم اولیه هندسی بوده که می توان فضا را به حیث مجموعه نقاط قبول نمود.

فضا سه بعدی: به آن فضائی گفته می شود که در آن زندگی می نمایم و اجسام جامد که دارای سه بعد (طول، عرض و ضخامت) اند، در آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

مستوی: مستوی نیز از جمله مفاهیم اولیه هندسی بوده که می توان به یک سطح هموار که فقط دو بعد آن یعنی طول و عرض مورد مطالعه باشد، اطلاق نمود. مانند: سطح آب، تخته صنف و غیره مستوی نامید. مانند

مستوی P



بخاطر داشته باشید که هر مستوی فضا را بدو حصه تقسیم می نماید.

حالات تعیین یک مستوی:

- یک مستوی توسط سه نقطه که به امتداد یک خط مستقیم واقع نباشند تعیین می گردد.
- یک مستوی توسط یک خط مستقیم و یک نقطه بشرط آنکه نقطه در امتداد خط مستقیم واقع نباشد تعیین می گردد.
- یک مستوی توسط دو قطعه خط مستقیم متقاطع تعیین گردیده می تواند.
- یک مستوی توسط دو قطعه خط موازی تعیین گردیده می تواند.


نظر به عکس حالات فوق می توان گفت که:

- یک نقطه بی نهایت مستوی ها را تعیین می نماید.
- دو نقطه بی نهایت مستوی ها را تعیین می نماید.
- چندین نقاط که به امتداد یک خط مستقیم واقع باشند بی نهایت مستوی ها را تعیین می نماید.
- یک قطعه خط مستقیم بی نهایت مستوی ها را تعیین نموده می تواند.


حالات نسبی دو خط مستقیم در یک مستوی نظر به یکدیگر در فضا:

هرگاه دو خط مستقیم Δ_1 و Δ_2 در یک مستوی در فضا موجود باشند حالات ذیل امکان پذیر است.


- خطوط موازی اند در صورت که هیچ نقطه مشترک نداشته باشند.



- خطوط متقاطع اند در صورتیکه یک نقطه مشترک داشته باشند.



- خطوط منطبق اند در صورتیکه اقلاً دو نقطه مشترک داشته باشند.




خطوط متنافر (سیاری): دو خط مستقیم که در فضا شامل دو مستوی زمانی متنافر (سیاری) گفته می

شوند که با هم هیچ ارتباط نداشته باشند یعنی نه موازی، نه متقاطع و نه منطبق باشند.


حالات یک مستقیم و یک مستوی در فضا:

هر یک مستقیم Δ و یک مستوی P را در فضا در نظر بگیریم بین آنها سه حالت ذیل وجود دارد:


- خط مستقیم با مستوی موازی گفته می شود زمانی که هیچ نقطه مشترک نداشته باشند.



- خط مستقیم را مستوی متقاطع گفته می شود زمانی که آنها یک نقطه مشترک داشته باشند.




- خط مستقیم با مستوی منطبق گفته می شود وقتی تمام نقاط مستقیم شامل مستوی باشد.




حالات خصوصی مستقیم با مستوی:

الف - از یک نقطه فضا بالای مستوی فقط یک عمود رسم شده می تواند.




ب - هرگاه دو خط مستقیم در یک مستوی عمود باشد، مستقیم ها با هم موازی اند.



$$\begin{aligned} \Delta_1 &\perp P \\ \Delta_2 &\perp P \end{aligned} \Rightarrow \Delta_1 \parallel \Delta_2$$

ج - هرگاه یک خط مستقیم به طور همزمان بالای دو مستوی غیر منطبق عمود باشد، مستوی های مذکور با


همدیگر موازی می باشند.



$$\begin{aligned} \Delta_1 &\perp P \\ \Delta_2 &\perp Q \end{aligned} \Rightarrow P \parallel Q$$

د - هرگاه يك مستقيم با دو مستقيم متقاطع شامل يك مستوي عمود باشد، مستقيم مذکور بالای خود مستوي نیز عمود می باشد.


$$\begin{aligned} \Delta \perp \Delta_1 \\ \Delta \perp \Delta_2 \end{aligned} \Rightarrow \Delta // P$$



حالات دو مستوي در فضا:

دو مستوي P ، Q را در فضا در نظر گرفته حالات ذیل وجود دارد:


- دو مستوي با هم موازی اند وقتی هیچ نقطه مشترك نداشته باشند.



- دو مستوي با هم متقاطع اند زمانیکه اقلاً يك نقطه مشترك داشته باشند، که همیشه تقاطع دو مستوي يك خط مستقيم می باشد مانند AB که بنام فصل مشترك مستوي ها یاد می گردد. به همین ترتیب زاویه که در این حالت بین مستوي های مذکور تشکیل می گردد بنام زوایای دو وجهی یاد می گردد که با هم مساوی اند. یعنی:


فصل مشترك مستوي ها $\overline{AB}$

$\hat{MBN} = \hat{MAN} = \alpha$ زوایای دو وجهی مستوي ها می باشد.



بخاطر داشته باشید که

هرگاه یک مستقیم به هر یک از دو مستوی متقاطع موازی باشد، مستقیم مذکور به فصل مشترک مستوی ها نیز موازی می باشد.




$$\begin{aligned} \Delta \perp P \\ \Delta \perp Q \Rightarrow \Delta // \overline{AB} \end{aligned}$$

- دو مستوی با هم منطبق گفته می شوند وقتی که تمام نقاط آنها با هم مشترک باشند، با نقاط آنها شامل یکدیگر باشند.

منشور: عبارت از جسم جامد هندسی است که توسط سطح منشوری و دو مستوی متوازی که با خط الرأس های سطح منشوری موازی نباشد، محدود گردیده باشد.

در صورتیکه P محیط قاعده h ارتفاع خط الرأس، B مساحت سطح قاعده منشور را ارائه نمائید، پس داریم که:




$$S = p \cdot h \quad \text{مساحت جانبی}$$

$$A = S + 2B \quad \text{مساحت کلی}$$

$$V = B \cdot h \quad \text{حجم}$$

مکعب: عبارت از منشوری قائم است که وجود آن مربعات باشد، یا به عباره دیگر منشوری منظم چهار ضلعی القاعده که تمام وجود آن انطباق پذیر باشد، مکعب نامیده می شود.



$$S = 4a^2 \quad \text{مساحت جانبی}$$


$$A = 6a^2 \quad \text{مساحت کلی}$$

$$V = a^3 \quad \text{حجم}$$

$$d = \sqrt{3} \cdot a \quad \text{قطر}$$

مکعب مستطیل: عبارت از منشور قائم که وجوه آن مستطیل ها باشد، مکعب مستطیل نامیده می شود یا به

عباره دیگر هرگاه وجود یک منشور دویبدو با هم انطباق پذیر باشد، مکعب مستطیل نامیده می شود.



$$S = 2(bc + ac) \quad \text{مساحت جانبی}$$

$$S = 2(ab + bc + ac) \quad \text{مساحت کلی}$$

$$V = a \cdot b \cdot c \quad \text{حجم}$$


$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad \text{قطر}$$

هرم: هرگاه یک ساحه چند ضلعی B در یک مستوی P و یک نقطه S فضا که خارج مستوی P موجود

باشد، هرم با قاعده B و رأس S عبارت از اتحاد تمام خطوط مربوط ساحه B می باشد. هر وجه یک هرم مثلث

بوده طوریکه ارتفاع مثلث (h') ارتفاع جانبی هرم و خط که از رأس هرم بالای قاعده آن عمود باشد. (h) عبارت

از ارتفاع هرم نامیده می شود.



$$S = \frac{1}{2} p \cdot h' \quad \text{مساحت جانبی}$$

$$A = S + B \quad \text{مساحت کلی}$$

$$V = \frac{1}{3} B \cdot h \quad \text{حجم}$$


هرم ناقص:

هرگاه یک هرم توسط مستوی موازی با قاعده قطع گردد، حجم حاصله عبارت از هرم ناقص می باشد. در

صورتیکه h ارتفاع هرم و k ارتفاع مقطع هرم از رأس و B مساحت قاعده هرم و B' مقطع هرم. به همین ترتیب

P محیط قاعده و P' محیط قاعده مقطع هرم، l' ارتفاع جانبی هرم ناقص و h' ارتفاع قائم هرم ناقص را نشان

دهد.




پس روابط ذیل وجود دارد: $h' = h - k$ و $\frac{B'}{B} = \frac{k^2}{h^2}$ است:

$$S = \frac{1}{2} (P + P') \cdot l' \quad \text{مساحت جانبی}$$

$$A = S + B + B' \quad \text{مساحت کلی}$$

$$V = \frac{h'}{3} (B + B' + \sqrt{B \cdot B'}) \quad \text{حجم هرم ناقص}$$


مخروط: هرگاه یک دایره (O) شامل مستوی P و یک نقطه S فضا خارج مستوی p موجود باشد، تمام خطوط مستقیم که از نقطه S به شامل سطح دایره در مستوی P بوجود می آید، مخروط نامیده می شود. یا به عباره دیگر، هرگاه اضلاع مضلع قاعده یک هرم به بی نهایت تقرب نماید، مخروط حاصل می گردد. در صورتیکه l ارتفاع جانبی (مولد) مخروط و h ارتفاع قائم و R شعاع قاعده مخروط را نشان دهد، پس داریم که:



$$\begin{aligned} S &= \pi R \cdot l \\ A &= \pi R(l + R) \\ V &= \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot h \end{aligned}$$

مخروط ناقص:

هرگاه یک مخروط توسط مستوی موازی به قاعده قطع گردد، مخروط ناقص بوجود می آید. در حالیکه R شعاع دایره مخروط، R' شعاع دایره مقطع، l' ارتفاع جانبی، h' ارتفاع قائم مخروط ناقص، k ارتفاع قائم مقطع مخروط از رأس و h ارتفاع قائم مخروط را نشان دهد، پس روابط ذیل وجود دارد:



$$\frac{B'}{B} = \frac{k^2}{h^2} \Rightarrow \frac{\pi R'^2}{\pi R^2} = \frac{k^2}{h^2} \Rightarrow \frac{R'}{R} = \frac{k}{h} \text{ و } h' = h - k$$


$$S = \pi(R + R') \cdot l' \quad \text{مساحت جانبی}$$

$$A = S + B + B' \quad \text{مساحت کلی}$$

$$A = [\pi(R + R') \cdot l' + R^2 + R'^2]$$

$$V = \frac{1}{3} \pi h' (R^2 + R'^2 + RR') \quad \text{حجم مخروط ناقص}$$

استوانه: هرگاه اضلاع مضلعات یک منشور به بی نهایت تقرب نماید، حجم شکل بدست آمده استوانه نامیده می شود. (در حالیکه R شعاع قاعده و h ارتفاع استوانه را نشان دهد، داریم که:




$$S = 2\pi R \cdot h \quad \text{مساحت جانبی}$$

$$A = 2\pi R(h + R) \quad \text{مساحت کلی}$$

$$V = \pi R^2 \cdot h \quad \text{حجم}$$


کره: کره عبارت از ست تمام نقاط فضا است که فاصله آنها از نقطه O دارای فاصله مساوی R باشد.



$$A = 4\pi R^2 \quad \text{مساحت سطح کره}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \quad \text{حجم کره}$$

$$A' = \pi R^2 - \pi S^2 \quad \text{و مساحت مقطع یک کره}$$




هندسه تحلیلی

بخش از علم هندسه بوده که عبارت از علم ارتباط بین الجبر و هندسه است، طوریکه برای معادله الجبری شکل هندسی را بیان کند و برای هر شکل هندسی یک معادله الجبری را معین می سازد، که اساس گذار این هندسه عالم فرانسوی بنام دیکارت می باشد.

سیستم کمیات وضعیه قایم:

دو خط مستقیم به همدیگر عمود، که در هر کدام شان جهت های مثبت و منفی را تعیین می نماید و این مستقیم ها مستوی سطح را به چهار ناحیه تقسیم می نمایند به نام سیستم کمیات ناحیه قایم یاد می گردد. می توان موقعیت هر نقطه مستوی را به وسیله جوړه های مرتب $P(x, y)$ روی سیستم کمیات وضعیه تعیین نمود. مثلاً موقعیت نقطه $P(+3, -4)$ عبارت از:



فاصله بین دو نقطه: در صورتیکه $P(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ معین باشد، فاصله بین آنها عبارت از:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

تقسیم یک قطعه خط به نسبت $\frac{m}{n}$: در حالیکه قطعه خط مستقیم که مختصات انجام های آن

$P_1(x_1, y_1)$ و $P(x, y_2)$ باشد و آنرا داخلی به نسبت $\frac{m}{n}$ تقسیم نمایم مختصات نقطه P عبارت از:

$$P\left(x = \frac{nx_1 + mx_2}{n + m}, y = \frac{ny_1 + my_2}{n + m}\right)$$

به خاطر داشته باشید اگر خط مذکور جارجاً تقسیم گردد نسبت مذکور $-\frac{m}{n}$ می گردد.

مختصات نقطه تنصیف قطعه خط: در صورتیکه $m = n$ باشد قطعه خط مستقیم که انجام های آن $P_1(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ باشد، پس مختصات آن عبارت از:

$$p\left(x = \frac{x_1 + x_2}{2}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

میل خط مستقیم که انجام های آن داده شده باشد: قطعه خط مستقیمی که انجام های آن $P_1(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ باشد، میل خط مذکور از رابطه ذیل بدست می آید.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

همچنان قابل یاد آوریست که:

$$m = \tan \theta$$

معادلات خط مستقیم و شرایط مربوط آن: شکل عمودی معادله خط مستقیم عبارت از:

$$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ y = mx + b \end{cases} \text{ در صورتیکه } \begin{cases} A_1x = B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x = B_2y + C_2 = 0 \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} y = m_1x + b_1 \\ y = m_2x + b_2 \end{cases} \text{ سیستم}$$

معادلات خط مستقیم را ارائه نمایید، داریم که:

• **شرط موازات:**

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2} \text{ یا } m_1 = m_2 \text{ و } b_1 \neq b_2$$

• **شرط متقاطع (عمودیت)**

$$\text{متقاطع } m_1 \neq m_2, \quad b_1 \neq b_2 \text{ یا } b_1 = b_2$$

$$\text{شرط عمودیت } m_1 \cdot m_2 = -1 \text{ یا } m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

$$\text{متقاطع } \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$$

$$\text{شرط عمودیت } A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0$$

• **شرط منطبق بودن**

$$m_1 = m_2, \quad b_1 = b_2 \text{ یا } \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

دریافت معادلات خط مستقیم: بطور عموم در سه حالت ذیل معادله خط مستقیم را دریافت نمود.

- یک نقطه $P(x_1, y_1)$ و میل (m) معلوم باشد، معادله آن عبارت از:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

- دو نقطه آن $P(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ معلوم باشد، معادله آن عبارت از:


$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- تقاطع به محاورات x به اندازه a و y به اندازه b معلوم باشد، معادله آن عبارت از:


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

حالات خصوصی معادله خط مستقیم:

- معادله خط مستقیم که ناصف ناحیه اول و سوم کمیات وضعیه قرار داشته باشد عبارت از: $y = x$




- معادله خط مستقیم که ناصف ناحیه دوم و چهارم کمیات وضعیه قرار داشته باشد عبارت از: $y = -x$




- معادله خط مستقیم که ناصف ناحیه اول و دوم کمیات وضعیه قرار داشته باشد عبارت از تابع قیمت مطلقه $y = |x|$


می باشد.



- معادله خط مستقیم که ناصف ناحیه سوم و چهارم کمیات وضعیه قرار داشته باشد عبارت از تابع قیمت مطلقه $y = -|x|$ می باشد.




- معادله خط مستقیم که موازی با محور x (عمود با محور y) باشد عبارت از $y = c$ می باشد.



با در نظر داشت معادله فوق معادله محور x عبارت از $y = 0$ می باشد.

- معادله خط مستقیم که موازی با محور y (عمود با محور x) باشد عبارت از: $x = c$ می باشد.




با در نظر داشت معادله فوق معادله محور y عبارت از $x = 0$ می باشد.

زاویه بین دو خط مستقیم: در صورتیکه مستقیم Δ_1 و Δ_2 روی سیستم کیمات وضعیه با هم تحت

زاویه θ متقاطع باشند، زاویه بین آنها از رابطه ذیل بدست می آید.

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 + m_2}$$



فاصله عمودی یک نقطه از یک خط مستقیم: فاصله عمودی بین نقطه $P(x_1, y_1)$ از خط


مستقیم $Ax + By + C = 0$ از رابطه ذیل به دست می آید:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

معادله نارمل خط مستقیم: در صورتیکه معادله یک خط مستقیم l بوده و این خط از مبدأ کمیات

وضعی عمودی P و زاویه میل این فاصله θ باشد. پس معادله نارمل خط مستقیم عبارت از:

$$x \cdot \cos\theta + y \sin\theta - P = 0$$



تبدیل معادله خط مستقیم به شکل نارمل:

هرگاه شکل عمومی معادله خط $Ax + By + C = 0$ را به شکل نارمل تبدیل نمایم از رابطه ذیل استفاده می نمایم.

$$\frac{Ax}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} + \frac{By}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} \pm \frac{C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} = 0$$

مثلاً معادله $-x + y - 3 = 0$ را به شکل نارمل تبدیل نمایید.

$$\sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\frac{-1x}{+\sqrt{2}} + \frac{1y}{+\sqrt{2}} - \frac{3}{+\sqrt{2}} = 0$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}x + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}y - \frac{3}{+\sqrt{2}} = 0$$


$$\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \theta = 135^\circ$$

$$\cos 135^\circ \cdot x + \sin 135^\circ \cdot y - \frac{3}{\sqrt{2}} = 0$$


مقاطع مخروطی

هرگاه یک مستوی P را با یک مخروط با قاعده B ارتفاع قایم (محور اصلی) h مولد a و رأس S در نظر بگیریم مستوی مذکور می تواند مخروط را در حالات ذیل قطع نماید.


- هرگاه مستوی مخروط را موازی با قاعده آن قطع نماید یا به عباره دیگر عمود به محور اصلی قطع حاصله آن دایره می باشد.




- هرگاه مستوی مخروط را مایل به محور اصلی قطع نماید قطع حاصله آن الپس (بیضوی) می باشد.



- هرگاه مستوی مخروط از موازی به مولد (ارتفاع جانبی) آن قطع نماید قطع حاصله آن پارابول نامیده می شود.




- هرگاه دو مخروط دارای رأس های منطبق و قاعدتین موازی باشد و توسط مستوی عمود با قاعده آن قطع گردد، های پارابول نامیده می شود.



دایره: محل هندسی نقاط که از یک نقطه معین دارای فاصله مساوی باشد دایره نامیده می شود.

معادلات دایره: در حالیکه $O(h, k)$ مرکز و R شعاع دایره باشد. معادله معیاری از دایره عبارت از:

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = R^2$$



حالات خصوصی معادله دایره:

- اگر دایره با محور x مماس باشد: در این صورت $|k| = R$ گردیده و معادله دایره عبارت از:

$$(x-h)^2 + (y-R)^2 = R^2$$

- اگر دایره با محور y مماس باشد: در این صورت $|h| = R$ گردیده و معادله دایره عبارت از:

$$(x-R)^2 + (y-k)^2 = R^2$$

- اگر دایره با هر دو محور مماس باشد: در این صورت $|k| = |h| = R$ گردیده و معادله دایره عبارت از:

$$(x-R)^2 + (y-R)^2 = R^2$$

- اگر مرکز دایره بالای محور x باشد: در این صورت $k=0$ گردیده و معادله دایره عبارت از:

$$(x-h)^2 + y^2 = R^2$$

- اگر مرکز دایره بالای محور y باشد: در این صورت $h=0$ گردیده و معادله دایره عبارت از:

$$x^2 + (y-k)^2 = R^2$$

- اگر مرکز دایره بالای مبدأ کمیات وضعیه باشد: در این صورت $h=k=0$ گردیده و معادله دایره عبارت از:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

یادداشت: شرط عبور دایره از مبدأ کمیات وضعیه عبارت است از: $h^2 + k^2 = R^2$

معادله انکشاف یافته دایره: هرگاه معادله معیاری دایره انکشاف داده شود معادله انکشاف یافته ذیل

بدست می آید: $Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$ معادله فوق زمان معادله دایره گفته می شود که $A = B$ و


هم اشاره باشد.

$$R = \frac{1}{2} \sqrt{D^2 + E^2 - 4F} \text{ شعاع دایره می باشد. مرکز و } c\left(-\frac{D}{2}, \frac{F}{2}\right)$$

در معادله انکشاف یافته بخاطر داشته باشید که هرگاه:

- $R > 0$ باشد، دایره را حقیقی می گویند.
- $R = 0$ باشد، دایره را صفری می گویند.
- $R < 0$ باشد، دایره را موهومی می گویند.

معادله مماس بر دایره: هرگاه یک مستقیم در نقطه $P_1(x_1, y_1)$ با دایره $c(h, k)$ مماس باشد، با در نظر داشت شکل ذیل میل شعاع دایره عبارت از:



$$m_1 = \frac{k - y_1}{h - x_1}, \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

چون شعاع دایره در نقطه تماس بالای مماس دایره عمود است، بناً:

$$m_1 = -\frac{1}{m_2} \Rightarrow m_2 = -\frac{h - x_1}{k - y_1}$$

و معادله خط مستقیم که یک نقطه و میل آن معلوم باشد عبارت از:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - y_1 = -\frac{h - x_1}{k - y_1}(x - x_1)$$

معادله اخیر عبارت از معادله مماس بر دایره است.

هرگاه مرکز دایره در مبدأ کمیات وضعیه قرار گیرد $h = k = 0$ گردد، پس معادله مماس به دایره عبارت از:


$$y - y_1 = -\frac{h - x_1}{k - y_1}(x - x_1)$$

طول مماس دایره: هرگاه یک نقطه $P_1(x_1, y_1)$ خارج دایره با معادله $(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$ رسم

گردد، طول مماس مذکور با در نظر داشت قضیه فیثاغورث از رابطه ذیل به دست می آید:

$$\overline{P_1T}^2 = \overline{P_1C}^2 - \overline{TC}^2$$


$$P_1T = \sqrt{(x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2 - R^2}$$



دوایر قایم: هرگاه دو دایره با معادله $x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ و $x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ در نظر باشد، شرط لازم برای اینکه دوایر مذکور با هم قایم باشند، عبارت از:

$$D_1P_2 + E_1E_2 = 2(F_1 + F_2)$$

پارابول: محل هندسی نقاط که از یک نقطه ثابت و یک مستقیم متساوی الفاصله باشد پارابول نامیده میشود. نقطه ثابت F محراق پارابول، مستقر (l) خط مؤجه (هادی) پارابول و خط مستقیم که از محراق پارابول گذشته و بالای خط مؤجه عمود باشد محور محراقی (محور تناظر) پارابول یاد می گردد، همچنان نقطه تقاطع منحنی پارابول با محور محراقی را (S) رأس پارابول و فاصله P عبارت از پارامتر پارابول نامیده می شود. همچنان خطی که از محراق گذشته و دو نقطه منحنی پارابول را وصل می کند وتر پارابول و اگر محراق بگذرد وتر محراقی یا وتر عمودی گفته می شود که طول آن $L = 4P$ می باشد.



معادلات پارابول

حالت اول: هرگاه محور محراقی موازی به محور x باشد،


$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

مختصات رأس $S(h, k)$

مختصات محراق $F(h + p, k)$

خط مؤجه (هادی) $x = h - p$

محور تناظر (محراقی) $y = k$



هرگاه رأس پارابول در مبدأ کمیات قرار داشته باشد در این صورت: $h = k = 0$ گردیده و معادله پارابول عبارت

$$y^2 = 4px$$

بخاطر داشته باشید که هرگاه $P < 0$ باشد دهنه پارابول بطرف چپ باز می باشد.

حالت دوم: هرگاه محور محراقی موازی به محور y باشد. محور محراقی (محور تناظر)


$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

مختصات رأس $s(h, k)$

مختصات محراق $F(h, k + p)$

خط مؤجه (هادی) $y = k - p$

محور تناظر (محراقی) $x = h$



هرگاه رأس پارابول در مبدأ کمیات قرار گیرد در این صورت: $h = k = 0$ گردیده و معادله پارابول عبارت از:

$$x^2 = 4py$$

بخاطر داشته باشید که هرگاه $P > 0$ باشد دهنه پارابول بطرف بالا و اگر $P < 0$ باشد دهنه پارابول دهنه پارابول

بطرف پایین باز می باشد.

الیپس (بیضوی): محل هندسی نقاط که مجموعه فواصل آنها از دو نقطه مستقر در مستوی مساوی به یک


عدد ثابت $(2a)$ گردد، الیپس نامیده می شود. نقاط ثابت (F_1) و (F) محراق های الیپس یاد می گردد. طوریکه

نقطه تنصیف محراق ها را $o(h, k)$ مرکز الیپس و فاصله F_1F_2 را فاصله محراقین الیپس یاد می نمایند. همچنان

خط مستقیمی که از محراق های الپس گذشته و محیط الپس را در دو نقطه A و A' قطع نماید محور محراقی (محور تناظر) الپس و نقاط A و A' بنام رأس های الپس یاد می گردد. طوریکه فاصله $\overline{AA'}$ قطر اطول الپس یاد می گردد، به همین ترتیب خط مستقیم که از مرکز الپس یاد می گردد، این خط منحنی الپس را در دو نقطه B و B' قطع می نماید که این نقاط نیز بنام رأس های الپس یاد می گردد، طوریکه فاصله $\overline{BB'}$ قطر اصغر الپس یاد می گردد.

عن المركزیت الپس: عبارت از نسبت فاصله بین هر نقطه منحنی الپس از محراق و مستقیم مؤجه (هادی) الپس می باشد، که در بیضوی این نسبت همیشه کوچک تر از یک می باشد، یعنی $e < 1$ است.

وتر عمودی (لتس ریگتم): عبارت از خط مستقیم است که از محراق الپس گذشته و بالای محور محراقی عمود باشد و منحنی الپس را در دو نقطه قطع نماید.



بخاطر داشته باشید که در الپس همیشه $a > b$ و $a > c$ بوده و جزئیات الپس عبارت از:

$$AA' = 2a \quad \text{قطر اطول الپس}$$

$$BB' = 2b \quad \text{قطر اصغر الپس}$$

$$F_1F_2 = 2c \quad \text{فاصله محراقین الپس}$$


$$e = \frac{c}{a} \quad \text{عن المركزیت الپس}$$

$$MM' = L = \frac{2b^2}{a} \quad \text{وتر عمودی (لتس ریگتم) الپس}$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \quad \text{رابطه الپس}$$

معادلات الیپس

حالت اول: هرگاه محور محراقی موازی به محور x باشد، معادله الیپس عبارت از: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$



مختصات مرکز الیپس $O(h, k)$

مختصات رأس ها $AA'(h \pm a, k)$

مختصات رأس ها $BB'(h, k \pm b)$

مختصات محراق ها $F_1F_2(h \pm c, k)$


معادلات خطوط مؤجه (هادی) $x = h \pm \frac{a}{e}$

معادله محور محراقی (محور تناظر) $y = k$

معادله محور غیر محراقی $x = h$

در صورتیکه مرکز الیپس در مبدأ کمیات وضعیه قرار گیرد در این صورت $h = k = 0$ گردیده و معادله الیپس شکل ذیل را بخود اختیار می نماید:

حالت دوم: هرگاه محور محراقی موازی به محور y باشد، معادله الیپس عبارت از: $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$



مختصات مرکز $O(h, k)$

مختصات رأس ها $A(h \pm a, k)$

مختصات رأس ها $B(h \pm b, k)$

مختصات محراق ها $F(h, k \pm c)$

معادلات خطوط مؤجه (هادی) $y = k \pm \frac{a}{e}$


معادله محور محراقی (محور تناظر) $x = h$

معادله محور غیر محراقی

$$y = k$$

هایپربول: محل هندسی نقاطی که حاصل تفریق فواصل شان از دو نقطه مستقر در مستوی مساوی به یکی عدد ثابت $2a$ باشد، هایپربول نامیده می شود. این دو نقطه ثابت F_1 و F_2 محراقین هایپربول می گویند، نقطه تنصیف محراق ها O مرکز و هایپربول یاد می گردد.

خط مستقیم که از محراق های هایپربول گذشته بنام محور محراقی (محور تناظر) یاد می گردد، این مستقیم منحنی هایپربول را در نقاط A و A' قطع می کند که بنام رأس های حقیقی یاد می گردد، به همین ترتیب خط مستقیم که از مرکز هایپربول گذشته و بالای محور محراقی عمود باشد، بنام محور غیر محراقی یاد می گردد روی این محور نقاط متناظر B و B' قرار دارد که بنام رأس های غیر واقعی یاد می گردد. به همین ترتیب خطوط مستقیم که از مرکز هایپربول گذشته و یا منحنی هایپربول در بی نهایت مماس باشد، مجانب های هایپربول نامیده می شود.



بخاطر داشته باشید که در هایپربول عن المركزیت $e > 1$ بوده و $a > b$ یا $a > b$ و $a = b$ بوده و همیشه $c > a$ است که جریثات هایپربول عبارت از:

$$AA' = 2a \quad \text{فاصله رأس های حقیقی هایپربول}$$

$$BB' = 2b \quad \text{فاصله رأس های غیر حقیقی هایپربول}$$

$$F_1F_2 = 2c \quad \text{فاصله محراقین هایپربول}$$

$$e = \frac{c}{a} \quad \text{عن المركزیت هایپربول}$$

$$MM' = L = \frac{2b^2}{c} \quad \text{وتر عمودی (لتس ریکتم) هایپربول}$$


$$c^2 = a^2 + b^2$$

رابطه هایپربول

معادلات هایپربول

حالت اول: هرگاه محور محراقی موازی به محور x باشد، معادله هایپربول عبارت از:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



$O(h, k)$

مختصات مرکز

$AA'(h \pm a, k)$

مختصات رأس های حقیقی هایپربول

$BB'(h, k \pm b)$

مختصات رأس های غیر حقیقی هایپربول

$F_1F_2(h \pm c, k)$

مختصات محراق های هایپربول

$$y - k = k \pm \frac{a}{e}(x - h)$$

معادلات مجانب های هایپربول

$$x = h \pm \frac{a}{e}$$

معادله خطوط مؤجه (هادی)

$$y = k$$

معادله محور محراقی (محور تناظر)

$$x = h$$

معادله محور غیر محراقی


هرگاه مرکز هایپربول بالای مبدأ کمیات وضعیه قرار گیرد در اینصورت $h = k = 0$ گردیده و معادله هایپربول

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

شکل ذیل را بخود اختیار می نماید:

حالت دوم: هرگاه محور محراقی موازی به محور y باشد، معادله هایپربول عبارت از:

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$



$O(h, k)$ مختصات مرکز

$A(h, k \pm a)$ مختصات رأس های حقیقی

$B(h \pm b, k)$ مختصات رأس های غیر حقیقی

$F(h, k \pm c)$ مختصات محراق ها

$y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$ معادله مجانب ها

$x = h$ معادله محور محراقی (محور تناظر)

$$y = k \pm \frac{a}{e}$$

$y = k$ معادله محور غیر محراقی

هرگاه مرکز هایپربول بالای مبدأ کمیات وضعیه قرار گیرد، در اینصورت $h = k = 0$ گردیده و معادله هایپربول

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

شکل ذیل را بخود اختیار می نماید:

سوالات

1. محیط مثلث مستاوی الاضلاع 104cm است، ارتفاع مثلث را دریافت نمایید:

$$\frac{104}{3}\sqrt{3}\text{ cm} \quad (1) \qquad \frac{52}{6}\sqrt{12}\text{ cm} \quad (2)$$

$$\frac{104}{6}\sqrt{3}\text{ cm} \quad (3) \qquad \frac{52}{3}\sqrt{12}\text{ cm} \quad (4)$$

2. اگر دو ضلع مثلث 10 واحد و 4 واحد و زاویه بین آن دو ضلع 45° باشد، مساحت مثلث را دریابید:

$$10\sqrt{2} \quad (1) \qquad 18\sqrt{2} \quad (2) \qquad 20\sqrt{2} \quad (3) \qquad 15\sqrt{2} \quad (4)$$

3. اگر اضلاع دو زاویه در فضا، دو به دو موازی و همجهت باشند، این دو زاویه باهم:

(1) دو چند یکدیگر اند (2) مساوی اند

(3) مختلف اند (4) نصف یکدیگر اند

4. دو دایره کیفی اگر یکدیگر را در دو نقطه قطع نمایند در این صورت آنها را دایره های:

(1) متقاطع می نامند (2) مماسی می نامند

(3) غیر مماسی می نامند (4) متداخل می نامند

5. معادله خط مستقیم که از نقاط $(7, -1)$ و $(5, 4)$ می گذرد، عبارت است از:

$$y + \frac{5}{2}x - \frac{22}{5} = 0 \quad (1) \qquad y + \frac{5}{2}x - \frac{33}{2} = 0 \quad (2)$$

$$y - \frac{5}{2}x + \frac{33}{2} = 0 \quad (3) \qquad y + \frac{5}{2}x + \frac{33}{2} = 0 \quad (4)$$

6. معادله خط مستقیم که محور x را در نقطه $x = 3$ و محور y را در نقطه $y = 2$ قطع می نمایند، عبارت است از:

$$(1) \quad \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1 \quad (2) \quad \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1 \quad (3) \quad \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1 \quad (4) \quad \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1$$

7. فاصله نقطه $P(2, -2)$ از خط مستقیم $2x + 2y - 2 = 0$ مساوی است به:

$$(1) \quad \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} \quad (2) \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) \quad \frac{1}{3\sqrt{2}} \quad (4) \quad \sqrt{2}$$

8. معادله دو خط مستقیم به ترتیب $x - 6y + 4 = 0$ و $-4x + 10y + 4 = 0$ است این دو خط مستقیم با دارای کدام حالت زیر است:

$$(1) \quad \text{مقاطع اند} \quad (2) \quad \text{موازی اند} \quad (3) \quad \text{مقاطع اند} \quad (4) \quad \text{هیچکدام}$$

9. معادله خط مستقیم که از نقطه $(-\sqrt{5}, 4)$ میگذرد و با محور y موازی باشد، عبارت است از:

$$(1) \quad x = -4 \quad (2) \quad x = \sqrt{5} \quad (3) \quad x = 4 \quad (4) \quad x = -\sqrt{5}$$

10. معادله خط مستقیم که از نقطه $P(0, 1)$ میگذرد و زاویه میل آن با محور x ، $\theta = 30^\circ$ می باشد عبارت از:

$$(1) \quad \sqrt{3}y + x = \sqrt{3} \quad (2) \quad y - \sqrt{3}x = \sqrt{3} \\ (3) \quad \sqrt{3}y - x = \sqrt{3} \quad (4) \quad y + \sqrt{3}x = \sqrt{3}$$

11. خطی که از نقاط $(-1, 0)$ و $(4, -8)$ میگذرد نقطه تنصیف کمیات وضعیه آن عبارت است از:

$$(1) \quad p(1, 4) \quad (2) \quad p\left(4, \frac{2}{3}\right) \quad (3) \quad p\left(-4, \frac{2}{3}\right) \quad (4) \quad p\left(\frac{3}{2}, -4\right)$$

12. معادله خط مستقیم که از نقطه $P_1(3, \sin \pi)$ عبور کرده و موازی با محور y باشد عبارت است از:

$$x = 0 \quad (1) \quad x = 3 \quad (2) \quad x = \frac{1}{3} \quad (3) \quad x = \frac{1}{6} \quad (4)$$

13. فاصله خط مستقیم $4x - 3y - 45 = 0$ از مبدأ کمیات وضعیه مساوی میشود به:

$$7 \quad (1) \quad 8 \quad (2) \quad 9 \quad (3) \quad 3 \quad (4)$$

14. میل معادله خط مستقیم $x - \frac{1}{5}y + 2 = 0$ عبارت است از:

$$m = 5 \quad (1) \quad m = \frac{1}{5} \quad (2) \quad m = -5 \quad (3) \quad m = -\frac{1}{5} \quad (4)$$

15. معادله خط مستقیم که میل آن 2 و از نقطه $(0, -1)$ عبور مینماید، عبارت است از:

$$\begin{aligned} y + 2x + 1 &= 0 \quad (1) \\ y - 2x - 1 &= 0 \quad (2) \\ y - 2x + 1 &= 0 \quad (3) \\ y + 2x - 1 &= 0 \quad (4) \end{aligned}$$

16. معادله خط مستقیم که از نقطه $\left[0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ گذشته و دارای میل $\frac{3}{\sqrt{2}}$ باشد عبارت است از:

$$\begin{aligned} x + \sqrt{2}y &= 1 \quad (1) \\ 3x + \sqrt{2}y &= 1 \quad (2) \\ 3x - \sqrt{2}y &= 1 \quad (3) \\ x - \sqrt{2}y &= 1 \quad (4) \end{aligned}$$

17. میل خط مستقیم $y = 2x + x \ln 2 + 1$ عبارت است از:

$$m = \ln 2 e^2 \quad (1) \quad m = 2 \ln 2 e \quad (2) \quad m = \ln 2 \quad (3) \quad m = 2 \quad (4)$$

18. میل خط مستقیم $y = 2x + \frac{1}{2}x + 1$ عبارت است از:

$$m = \frac{1}{2} \quad (1) \quad m = \frac{5}{2} \quad (2) \quad m = \frac{3}{2} \quad (3) \quad m = 2 \quad (4)$$

19. فاصله بین نقاط $P_1(\ln 3, 2)$ و $P_2\left(-\ln \frac{1}{3}, 2\right)$ عبارت است از:

(1) 2 (2) صفر

(3) $\ln^3 1$ (4) 2 و 3 درست است

20. در سیستم کمیات وضعیه قایم موقیعت نقطه $p\left(\log \frac{1}{4}, \log \frac{1}{5}\right)$ عبارت از:

(1) IV (2) II (3) I (4) III

21. فاصله بین نقاط $P_1(-3, -1)$ و $P_2(-4, 4)$ مساوی است به:

(1) $\sqrt{26}$ (2) $\sqrt[3]{2}$ (3) $\sqrt{24}$ (4) $\sqrt{27}$

22. فاصله بین دو خط موازی $x + 2y = 2$ و $100x + 200y = 10$ عبارت است از:

(1) $\frac{19}{10\sqrt{5}}$ (2) $\frac{190}{\sqrt{5000}}$ (3) $\frac{191}{\sqrt{5000}}$ (4) $\frac{19}{10}$

23. معادله خط مستقیم $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ به شکل نورمال عبارت است از:

(1) $x \cos 30^\circ - y \sin 30^\circ + 21 = 0$

(2) $x \cos 30^\circ + y \sin 30^\circ - 21 = 0$

(3) $x \cos 30^\circ - y \sin 30^\circ = 0$

(4) $x \cos 30^\circ + y \sin 30^\circ = 0$

24. معادله خط مستقیم $-3x + y - 9 = 0$ به شکل نورمال عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} \frac{-3x}{\sqrt{10}} + \frac{y}{\sqrt{10}} + \frac{24}{\sqrt{10}} = 0 & (1) \\ \frac{-3x}{\sqrt{10}} - \frac{y}{\sqrt{10}} - \frac{9}{\sqrt{10}} = 0 & (2) \\ \frac{-3x}{\sqrt{10}} - \frac{y}{\sqrt{10}} + \frac{24}{\sqrt{10}} = 0 & (3) \\ \frac{-3x}{\sqrt{10}} + \frac{y}{\sqrt{10}} - \frac{9}{\sqrt{10}} = 0 & (4) \end{array}$$

25. معادله خط مستقیم $x + 2y + 4 = 0$ به شکل نورمال عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} \frac{x}{\sqrt{5}} - \frac{2y}{\sqrt{5}} - \frac{4}{\sqrt{5}} = 0 & (1) \\ \frac{x}{\sqrt{5}} - \frac{2y}{\sqrt{5}} - \frac{4}{\sqrt{25}} = 0 & (2) \\ \frac{x}{\sqrt{5}} + \frac{2y}{\sqrt{5}} - \frac{4}{\sqrt{5}} = 0 & (3) \\ -\frac{x}{\sqrt{5}} - \frac{2y}{\sqrt{5}} - \frac{4}{\sqrt{5}} = 0 & (4) \end{array}$$

26. طول مماس از نقطه $(10, 4)$ به دایره $x^2 + y^2 - 100 = 0$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} 5 & (1) & 8 & (2) \\ 4 & (3) & 10 & (4) \end{array}$$

27. طول مماس از نقطه $P(-2, -11)$ بر دایره $x^2 - 8 + y^2 + 6y = -21$ عبارت است از:

$$\begin{array}{llll} 8\sqrt{6} & (1) & 4\sqrt{6} & (2) \\ 5\sqrt{2} & (3) & 8\sqrt{2} & (4) \end{array}$$

28. اگر سه نقطه $A(-1, 2)$, $B(3, 0)$ و $C(4, b)$ روی یک خط قرار داشته باشد، قیمت b عبارت است

از:

$$\begin{array}{llll} \frac{1}{2} & (1) & -\frac{1}{2} & (2) \\ 3 & (3) & -2 & (4) \end{array}$$

29. معادله خط مستقیمی که از نقطه $(-1, 1)$ عبور نموده با محور x زاویه 45° را تشکیل می نماید،

عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} x - y + 2 = 0 & (1) \\ x - y = 2 & (2) \\ x + 5y = -4 & (3) \\ 2x - y = 3 & (4) \end{array}$$

30. نقطه تقاطع مستقیم های $x = -4$ و $y = 5$ عبارت است از:

- (1) $(4, 5)$ (2) $(4, -5)$ (3) $(5, -4)$ (4) $(-4, 5)$

31. اگر زاویه میل یک خط مستقیم 100° باشد، پس میل آن عبارت است از:

- (1) مثبت است (2) منفی است (3) صفر (4) هیچکدام

32. کمیات وضعیه نقطه p که خط مستقیم $\overline{p_1 p_2}$ را که از نقاط $A(5, 6)$ و $B(-2, -3)$ گذشته داخلی

به نسبت $\frac{3}{5}$ تقسیم می نماید:

- (1) $\left(\frac{11}{4}, \frac{15}{4}\right)$ (2) $\left(\frac{21}{8}, \frac{19}{8}\right)$ (3) $\left(\frac{19}{8}, \frac{21}{8}\right)$ (4) $\left(\frac{15}{4}, \frac{11}{4}\right)$

33. فاصله نقطه $(\log_3 27, 4 \cos 100\pi)$ از مبدأ کمیات وضعیه مساوی است به:

- (1) 4 (2) 5 (3) $\sqrt{6}$ (4) 6

34. اگر رأس های مثلث ABC به ترتیب $A(1,1)$, $B(1,2)$ و $C(2,1)$ باشند، مساحت این مثلث عبارت است از:

$$(1) 3 \quad (2) \frac{1}{2} \quad (3) 1 \quad (4) \frac{1}{3}$$

35. هرگاه $A(0,5)$, $B(5,0)$, $C(0,-5)$ و $D(-5,0)$ رأس های یک چهار ضلعی باشند، درین صورت نوعیت چهار ضلعی عبارت است از:

$$(1) \text{مربع} \quad (2) \text{ذوزنقه} \quad (3) \text{لوزی} \quad (4) \text{مستطیل}$$

36. کمیات وضعیه نقطه P که خط مستقیم $\overline{P_1P_2}$ را که از نقاط $P_1(4,5)$ و $P_2(-2,-3)$ گذشته و خارجاً به نسبت $\frac{3}{5}$ تقسیم می نماید عبارت است از:

$$(1) P\left(\frac{21}{3}, \frac{31}{3}\right) \quad (2) P\left(\frac{21}{2}, \frac{91}{2}\right) \quad (3) P\left(\frac{31}{3}, \frac{21}{3}\right) \quad (4) P\left(\frac{39}{2}, \frac{31}{2}\right)$$

37. کدام یک از مستقیم های ذیل با محور x زاویه 60° را می سازد:

$$(1) y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + 1 \quad (2) y = -x + 1$$

$$(3) y - \sqrt{3}x + 1 = 0 \quad (4) \sqrt{3}y + x + 1 = 0$$

38. معادله دایره که مرکز آن $(0,-5)$ و شعاع آن 9 واحد باشد عبارت است از:

$$(1) x^2 + y^2 + 10y + 56 = 0 \quad (2) x^2 + y^2 = 81$$

$$(3) x^2 + y^2 = 56 \quad (4) x^2 + y^2 + 10y - 56 = 0$$

39. اگر $x^2 + y^2 - 4x - 18y - 20 = 0$ معادله دایره است، طول شعاع این دایره مساویست به:

- (1) $\sqrt{102}$ (2) $\sqrt{193}$ (3) $\sqrt{104}$ (4) $\sqrt{105}$

40. اگر معادله دایره به شکل $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - 2x - 2y = 0$ باشد، پس مختصات مرکز دایره عبارت

است از:

- (1) (2,2) (2) (-2,2) (3) (2,-2) (4) (-2,-2)

41. اگر $C(1,0)$ مرکز دایره $(4,5)$ یک نقطه محیط دایره باشد، طول شعاع دایره مساوی است به:

- (1) $\sqrt{43}$ (2) $\sqrt{41}$ (3) $\sqrt{34}$ (4) $\sqrt{42}$

42. هرگاه یک مخروط توسط یک مستوی طوری قطع شود، که مستوی به محور اصلی مخروط موازی و

عمود نباشد شکل حاصله عبارت است از:

- (1) دایره (2) بیضوی (3) پارابولا (4) هایپربول

43. اگر کمیات وضعیه محراق یک پارابولا $F\left(0, \frac{0)02}{0)05}\right)$ باشد، پس معادله پارابولا عبارت از:

- (1) $y^2 = \frac{0)800}{0)500} x$ (2) $x^2 = \frac{0)800}{0)500} y$
 (3) $x^2 = \frac{0)800}{0)500} y$ (4) $y^2 = -\frac{0)800}{0)500} x$

44. کمیات وضعیه راس پارابول $[(\log 0)001)x - (9)^2 = 9[100y - \sin(8\pi)]$ عبارت از:

$$(3,0)(4) \quad (9, \sin 8\pi)(3) \quad (-3,0)(2) \quad (-9, \sin 8\pi)(1)$$

45. رأس پارابول $y = bx^2 + a$ عبارت است از:

$$\left(0, \frac{a^2}{4a}\right)(4) \quad \left(0, \frac{b^2}{4a}\right)(3) \quad (0, a)(2) \quad \left(-\frac{a}{2b}, -\frac{a^2}{4a}\right)(1)$$

46. دهن پارابولای $x^2 = y \cdot \log 0)05$ به کدام طرف باز میگردد:

$$(1) \text{ پایین} \quad (2) \text{ چپ} \quad (3) \text{ راست} \quad (4) \text{ بالا}$$

47. دهن پارابولا $x^2 = y \cos 5\pi$ به کدام طرف باز میگردد:

$$(1) \text{ چپ} \quad (2) \text{ بالا} \quad (3) \text{ راست} \quad (4) \text{ پایین}$$

48. معادله محور تناظر پارابولا $y^2 - 18y - x + 73 = 0$ عبارت است از:

$$y = 9(1) \quad y = -9(2) \quad x = 9(3) \quad x = -9(4)$$

49. معادله خط موجه پارابولای $(x - 44)^2 = 14(y - 44)$ مساوی است به:

$$y = -40(1) \quad y = -40(2) \quad y = 40(3) \quad y = 40(4)$$

50. اگر در یک پارابولا معادله هادی آن $x = -0)001$ باشد، پس معادله پارابولا عبارت است از:

$$\begin{aligned} (1) \quad x^2 &= -\frac{1}{250}y \\ (2) \quad y^2 &= \frac{1}{250}x \\ (3) \quad x^2 &= \frac{1}{250}y \\ (4) \quad y^2 &= -\frac{1}{250}x \end{aligned}$$

51. کمیات وضعیه محراق یک پارابولا $F(0,75,0)$ باشد، معادله پارابولا عبارت است از:

$$(1) \quad y^2 = 3x \quad (2) \quad x^2 = 3 \quad (3) \quad y^2 = -3x \quad (4) \quad x^2 = -3y$$

52. اگر کمیات وضعیه محراق یک پارابولا $F(0,001,0)$ باشد معادله آن عبارت است از:

$$(1) \quad x^2 = \frac{1}{25}y \quad (2) \quad x^2 = \frac{1}{250} \\ (3) \quad y^2 = \frac{1}{250}x \quad (4) \quad y^2 = \frac{1}{25}x$$

53. انجام های وتر عمودی پارابولا در صورتیکه $x = 2$ و معادله آن به شکل $y^2 = 8x$ باشد، عبارت

است از:

$$(1) \quad M(-4,2), M'(4,2) \quad (2) \quad M(-2,4), M'(-2,-4) \\ (3) \quad M(-2,4), M'(-2,0) \quad (4) \quad M(2,4), M'(2,-4)$$

54. اگر مختصات انجام های قطر اصغر یک بیضوی $(9,0), (-9,0)$ و عن المרכזیت آن $\frac{\sqrt{88}}{13}$ باشد، پس

معادله آن:

$$(1) \quad \frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{169} = 1 \quad (2) \quad \frac{x^2}{88} + \frac{y^2}{169} = 1 \\ (3) \quad \frac{x^2}{88} + \frac{y^2}{169} = 1 \quad (4) \quad \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{81} = 1$$

55. در معادله $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ عن المركزیت بیضوی مساوی است به:

$$e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (1) \quad e = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad (2) \quad e = \frac{\sqrt{2}}{4} \quad (3) \quad e = \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (4)$$

56. اگر معادله بیضوی به شکل $\frac{(x+\sin\frac{\pi}{4})^2}{800} + \frac{(y+\sin\frac{\pi}{3})^2}{900} = 1$ باشد، پس عن المركزیت آن مساوی

است به:

$$e = \frac{1}{4} \quad (1) \quad e = \frac{1}{2} \quad (2) \quad e = \frac{1}{3} \quad (3) \quad e = \frac{1}{5} \quad (4)$$

57. در معادله بیضوی $0.0168(x+3)^2 + 0.0165(y-2)^2 = 1$ خاصیت قطر بزرگ عبارت از:

(1) موازی با محور x است

(2) بالای محور y است

(3) موازی با محور y است

(4) بالای محور x است

58. معادله بیضوی $\frac{x^2}{0.49} + \frac{y^2}{0.25} = 1$ باشد قطر اصغر آن دارای کدام خاصیت ذیل میباشد:

(1) روی محور x قرار دارد

(2) روی محور y قرار دارد

(3) موازی به محور y است

(4) موازی به محور x است

59. هرگاه محراق های بیضوی روی محور x و مرکز آن در مبدأ کیمات وضعیه بوده و $a > b$ باشد،

درینصورت معادله آن عبارت است از:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (1) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (2)$$

$$\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (3) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

60. عن المركزیت الپس که معادله آن به صورت $16x^2 + 4y^2 + 96x - 8y + 84 = 0$ باشد،

مساوی است به:

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} (4) \quad \frac{\sqrt{3}}{2} (3) \quad \frac{\sqrt{2}}{2} (2) \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} (1)$$

61. محور محراقی هایپربولای $5x^2 - 2y^2 = 1$ (خاصیت زیر را دارد:

(1) روی محور x است (2) روی محور y است

(3) موازی با محور x است (4) موازی با محور y است

62. اگر معادله هایپربول به صورت $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ باشد، مختصات رأس نمونه هایپربول عبارت از:

$$V_1(0,2), V_2(0,-2) (1) \quad V_1(4,0), V_2(-4,0) (2)$$

$$V_1(0,4), V_2(0,-4) (3) \quad V_1(2,0), V_2(-2,0) (4)$$

63. اگر معادله هایپربول به صورت $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$ باشد، معادلات خطوط هادی آن عبارت از:

$$y = \frac{4}{\sqrt{13}}, y - \frac{4}{\sqrt{13}} (1) \quad y = \frac{\sqrt{13}}{2}, y - \frac{\sqrt{13}}{2} (2)$$

$$y = \frac{\sqrt{15}}{4}, y - \frac{\sqrt{15}}{4} (3) \quad y = \frac{2}{\sqrt{13}}, y - \frac{2}{\sqrt{13}} (4)$$

64. معادلات خطوط هادی هایپرβολا که محراق هایش روی محور y و مرکز آن مبدأ کمیات وضعیه قرار

داشته باشد عبارت است از:

$$y = \frac{e}{a}, y = -\frac{e}{a} \quad (2)$$

$$y = \frac{a}{e}, y = -\frac{a}{e} \quad (1)$$

$$y = \frac{b}{a}, y = -\frac{b}{a} \quad (4)$$

$$y = \frac{a}{b}, y = -\frac{a}{b} \quad (3)$$

65. مستقیم $x = 0$ دایره $x^2 + y^2 = 16$ را در چند نقطه قطع میکند:

(1) سه نقطه (2) یک نقطه (3) قطع نمیکند (4) دو نقطه

66. از نقطه $(1, 2)$ به دایره $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 4 = 0$ چند مماس رسم شده میتواند:

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) مماس رسم شده نمیتواند

67. نقطه تقاطع دایره $x^2 + y^2 = 9$ با خط مستقیم $y = -3$ عبارت است از:

(1) $(3, 0)$ (2) $(0, -3)$ (3) $(-3, 0)$ (4) $(0, 3)$

68. $C > 0, A > 0$, باشد، مربوط کدام یک از منحنی های ذیل است:

(1) پارابول (2) هایپرβολا
(3) دایره (4) بیضوی

فصل نهم

لیمت توابع

لیمت که به معنی حد یا هدف است یکی از مباحث عمده ریاضیات می باشد که توسط عالم انگلیسی به نام «ویرس ترس» بطور مفصل تشریح و توضیح گردیده است.

تقرب متحول: هرگاه متحول x به عدد معین a تقرب نماید، طوریکه تفاوت بین x و a از هر عدد کوچک ($\delta > 0$) کوچکتر گردد، یعنی:

$$\forall \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow x \rightarrow a$$

تقرب متحول از دست راست: اگر یک مترادف متناقص قیمت های x وجود داشته باشد.

$$x : a + 0.1, a + 0.01, a + 0.001, \dots (x \rightarrow a^+)$$

تقرب متحول از دست چپ: اگر یک مترادف متزاید قیمت های x وجود داشته باشد.

$$x : a - 0.1, a - 0.01, a - 0.001, \dots (x \rightarrow a^-)$$

تعریف: هرگاه در تابع $y = f(x)$ متحول $(x \rightarrow a^+, x \rightarrow a^-)$ یعنی $x \rightarrow a$ نماید، طوریکه $|x - a| < \delta$ گردد، در این صورت تابع مربوط $y \rightarrow l$ می نماید، طوریکه $|y - l| < \varepsilon$ می گردد، (در حالیکه δ و ε دو عدد بی نهایت کوچک انتخابی مثبت می باشد) پس می توان نوشت:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

خواص لیمت:

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} c = c (c = \text{const})$
- 2) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 3) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 4) $\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- 5) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$
- 6) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$
- 7) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$
- 8) $\lim_{x \rightarrow a} [\log_b f(x)] = \log_b \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]$

توابع بی نهایت کوچک: تابع $\varepsilon(x)$ در صورتیکه $x \rightarrow a$ بی نهایت کوچک گفته می شود، اگر $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ گردد.

قضیه ساندویچ: اگر توابع مانند $f(x)$ ، $g(x)$ و $h(x)$ را در نظر بگیریم برای قیمت های x از یک انتروال باز که عدد a شامل آن باشد، طوریکه $x = a$ و یا امکان دارد

$x \neq a$ باشد، شرطی $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ را صدق نماید، هرگاه
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$ باشد، پس $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ می باشد.

مثلاً اگر تابع $g(x)$ دارای خاصیت $\left(2 - \frac{x}{5} \leq g(x) \leq 2 + \frac{x}{5}\right)$ باشد، $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ را مشخص می نماییم.

چون:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{x}{5}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{x}{5}\right) = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 2$$

اشکال نامعین: اشکال نامعین عبارت اند از:

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty - \infty, 0^0, 0^\infty, \infty^0, \infty^\infty$ که هر یک از اشکال به کمک لیمت به روش و طریقه های خاصی دارای قیمت حدی می گردد.

رفع اشکال نامعین:

1. **رفع شکل $\frac{0}{0}$:** برای دریافت لیمت تابع که در شکل $\frac{0}{0}$ باشد آنرا به وسیله تجزیه

پولینوم های الجبری، تقسیم ترکیبی، ضرب مزدوج و یا تعویض ساده می نماییم.

2. **رفع شکل $\frac{\infty}{\infty}$:** جهت دریافت لیمت

$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$ زمانی که $x \rightarrow \infty$ نماید، سه نتیجه ذیل وجود دارد.

❖ هرگاه $n = m$ باشد لیمت تابع $\left(\frac{a_n}{b_m}\right)$ است.

❖ هرگاه $n < m$ باشد لیمت تابع (0) است.

❖ هرگاه $n > m$ باشد لیمت تابع (∞) است.

3. **رفع شکل** $(\infty - \infty)$ و $(0 \cdot \infty)$: اولاً توابع اشکال فوق را به کمک مخرج

مشترک یا ضرب مزدوج و یا سایر عملیات ریاضی به شکل $\frac{0}{0}$ و یا $\frac{\infty}{\infty}$ تبدیل نموده

، بعداً مانند حالت اول و دوم به حل آن می پردازیم.

4. **رفع شکل** 1^∞ : جهت دریافت لیمت تابع که در شکل 1^∞ قرار داشته باشد با

استفاده از روابط ذیل می توان عمل نمود.

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \qquad 2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

طوری که $e = 2.718281000$ بنام عدد ایلر *Euler* یاد می گردد، همچنان نتایج دو قضیه فوق عبارت از:

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\beta x} = e^{\alpha \cdot \beta} \qquad 2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{\alpha}{x}} = e^{\alpha}$$

و به همین ترتیب شکل عمومی مبهم 1^∞ را اختیار نماید، در نتیجه:

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} [u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} [v(u-1)]}$$

لیمت توابع مثلثاتی: جهت دریافت لیمت های توابع مثلثاتی سه قضیه اساسی ذیل را در نظر داشته باشید.

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

نتایج قضیه (3) عبارت است از:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \csc x) = 1$
 c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
 d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$
 e) $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \cot x) = 1$

بخاطر داشته باشید که $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ می گردد.

متمادیت توابع: از دیدگاه لیمیت توابع یک تابع $y = f(x)$ در نقطه $x = a$ متمادی گفته می شود زمانی که:

1. نقطه a در ناحیه تعریف $f(x)$ شامل باشد، یعنی $f(a)$ موجود باشد.

2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجود باشد.

3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ گردد.

یادداشت: به خاطر داشته باشید که در محاسبه لیمیت توابع ناطق (کسری) هرگاه تابع شکل

مبهم $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ را داشته باشد، استعمال قاعده هوپیتال یعنی $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$ (به

کمک مشتق صورت و مخرج کسر) خیلی مفید است.

قابل یادآوری است که اگر بعد از مشتق اول باز هم تابع در شکل نامعین قرار گیرد، مشتق دوم، سوم، ... (n) - ام آنرا تشکیل نموده تا رفع ابهام گردد.

سوالیات

1. مساوی است به: $\lim_{x \rightarrow \sqrt{e}} \left(\frac{1}{x} \right)^{-2 \ln x}$

- (1) $e^{\frac{1}{2}}$ (2) $e^{-\frac{1}{2}}$ (3) $\frac{1}{e}$ (4) e

2. مساوی است به: $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{e^2}} (1 + \ln x)^{\frac{1}{\ln x}}$

- (1) 2 (2) $\sqrt{-1}$ (3) e (4) $\frac{1}{i}$

3. اگر $f(x)$ در نقطه $x = 2$ متمادی و $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ ، $f(2) = a - 5$ باشد، پس قیمت a مساوی است به:

- (1) $a = 2$ (2) $a = 9$ (3) $a = 3$ (4) $a = -1$

4. هرگاه برای هر $x \in (a - \delta, a + \delta)$ ، $f(x) \leq g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ موجود باشند پس:

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
(3) هر دو صحت دارد (4) هر دو غلط است

5.

مساوی است به: $\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{\sin(x - \pi)}{\pi - x} \right)^{\frac{\pi - x}{\sin(x - \pi)}}$

- (1) -1 (2) 1 (3) 0 (4) 2

6. رابطه بین δ و ε در لیمت $\lim_{x \rightarrow 100} (3x + 100) = 400$ مساوی است به:

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3} \quad (1) \quad \delta = 3 + \varepsilon \quad (2) \quad \delta = \frac{3}{\varepsilon} \quad (3) \quad \delta = 3\varepsilon \quad (4)$$

7. اگر $\varepsilon(x) = e^{\sin x}$ باشد در لیمیت $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x)$ تابع $\varepsilon(x)$ به کدام قیمت a یک تابع بی نهایت کوچک است:

$$(1) \text{ برای } a \text{ هیچ عدد حقیقی موجود نیست} \quad (2) a = \frac{10\pi}{4}$$

$$(3) a = \frac{\pi}{100} \quad (4) a = \pi$$

8. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\log^4(36-8x)}{\log^3(36-8x)^3}$ مساوی است به:

$$(1) \frac{256}{81} \log 4 \quad (2) \frac{128}{27} \log 16$$

$$(3) \frac{256}{27} \log 2 \quad (4) \frac{64}{27} \log 4$$

9. اگر $\varepsilon(x)$ در $x \rightarrow a$ یک تابع بی نهایت کوچک و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ باشد پس تابع $\varepsilon(x)$ مساوی است به:

$$(1) \varepsilon(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + g(x) \quad (2) \varepsilon(x) = 0$$

$$(3) \varepsilon(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} - g(x) \quad (4) \varepsilon(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) - \frac{5}{8}$$

10. $\lim_{x \rightarrow 0.01} \frac{1 - \cos^2 \frac{1}{200}}{1 - \cos x}$ مساوی است به:

$$(1) \sin(0.01) - 1 \quad (2) \frac{1}{100}$$

$$(3) \sin^2(0.01) - 1 \quad (4) \text{هیچکدام}$$

11. اگر $x \rightarrow d, g(x)$ یک تابع بی نهایت کوچک $\lim_{x \rightarrow 4} k(x) = \frac{3}{\sqrt{2}}$ باشد، پس تابع مساوی است به:

$$K(x) = \frac{6 + \sqrt{8}g(x)}{\sqrt{8}} \quad (1) \quad k(x) = \frac{3\sqrt{2}}{2} g(x) \quad (2)$$

$$k(x) = \frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{1}{g(x)} \quad (3) \quad k(x) = \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{g(x)} \quad (4)$$

12. اگر $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ x+2, & x = 1 \end{cases}$ باشد، پس $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ مساوی است به:

$$2 \quad (1) \quad 1 \quad (2) \quad -1 \quad (3) \quad 2 \quad (4)$$

13. اگر $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) \neq f(6)$ باشد، پس $f(x)$ در نقطه $x = 6$ دارای یکی از خاصیت های زیر است:

(1) مشتق پذیر است (2) متمادی نیست (3) انتیگرا ل پذیر است (4) متمادی است

14. $\lim_{x \rightarrow \ln \frac{1}{2}} \frac{\ln 2 + \ln 2 \cos x}{\cos^2 \ln \frac{1}{\sqrt{2}}}$ مساوی است به:

$$\ln 4 \quad (1) \quad \cos^2 \ln \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (2) \quad 2 \quad (3) \quad \ln 2 + \ln 2 \cos x \quad (4)$$

15. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\ln^2(x+1)}{\ln^2(x-1)}$ مساوی است به:

$$9 \quad (1) \quad 9 \ln \frac{2}{3} \quad (2) \quad \frac{1}{9} \quad (3) \quad \frac{9}{\ln 2} \quad (4)$$

16. اگر $g(x) = \begin{cases} \sin x + x & : x \geq 0 \\ x^2 - 1 & : -1 < x < 0 \\ x^3 + \sqrt{x^2 + 1} & : -3 < x \leq -1 \end{cases}$ باشد، پس $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ مساوی است به:

$$0 \quad (1) \quad -1 \quad (2) \quad 1 \quad (3) \quad 2 \quad (4)$$

$$17. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{10}} (\cos 10x)(1 + \tan^2 10x) \text{ مساوی است به:}$$

$$\sec^2 1 \quad (1) \quad \tan^2 1 \quad (2) \quad \sec 1 \quad (3) \quad \tan 1 \quad (4)$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 7x + 12}{(x-1)^2 + 1} \text{ مساوی است به:}$$

$$8 \quad (1) \quad 5 \quad (2) \quad 6 \quad (3) \quad 7 \quad (4)$$

$$19. \text{ اگر } \varepsilon(x) \text{ در } x \rightarrow a \text{ یک تابع بی نهایت کوچک و } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ پس تابع } \varepsilon(x) \text{ مساوی است به:}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon(x) &= -\frac{\sqrt{2}}{2} + g(x) \quad (1) \\ \varepsilon(x) &= \frac{\sqrt{2}}{2} - g(x) \quad (3) \\ \varepsilon(x) &= \lim_{x \rightarrow a} g(x) - \frac{5}{8} \quad (4) \\ \varepsilon(x) &= 0 \quad (2) \end{aligned}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 10} \frac{\log^4(29-2x)^2}{\log^3(29-2x)} \text{ مساوی است به:}$$

$$17 \log 9 \quad (1) \quad 81 \log 9 \quad (2) \quad 27 \log 3 \quad (3) \quad 81 \log 3 \quad (4)$$

$$21. \text{ اگر } \varepsilon(x), x \rightarrow a, \text{ یک تابع بینهایت کوچک و } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{8}{7} \text{ باشد، پس تابع } f(x) \text{ مساوی است به:}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{16}{14} - \frac{1}{\varepsilon(x)} \quad (2) \quad f(x) = \varepsilon(x) - \frac{8}{7} \quad (1) \\ f(x) &= \frac{8}{7} \varepsilon(x) \quad (4) \quad f(x) = \frac{8+7\varepsilon(x)}{7} \quad (3) \end{aligned}$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 5^+} 3^{\frac{3}{x-5}} \text{ عبارت است از:}$$

$$-\infty \quad (4) \quad e^3 \quad (3) \quad 0 \quad (2) \quad \infty \quad (1)$$

23. لیمت $\lim_{x \rightarrow \sin 1} \frac{1-x^2}{1+\cos 2}$ مساوی است به:

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\sin 1 + 1$ (3) $2 \sin 1$ (4) 2

24. در $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 1) = 4$ رابطه بین δ و ε مساوی است به:

(1) $\delta = \varepsilon$ (2) $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$ (3) $\delta = 2\varepsilon$ (4) $\delta = \frac{5}{\varepsilon}$

25. $\lim_{x \rightarrow \log 5} (10^x + \frac{1}{10^x})$ مساوی است به:

(1) $\frac{5}{26}$ (2) 5 (3) $\frac{26}{5}$ (4) $\frac{1}{5}$

26. تابع $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & ; x > 0 \\ x^2 + 1 & ; -2 < x \leq 0 \\ 4x - 1 & ; -5 < x \leq -2 \end{cases}$ باشد، پس کدام رابطه ذیل درست است:

(1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) \geq g(-2)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = g(-2)$

(3) هیچکدام (4) $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) < g(-2)$

27. اگر $f(x)$ در نقطه $x = a$ متمادی $f(a) = -1$ باشد، پس $\lim_{x \rightarrow a} 5^{f(x)}$ مساوی است به:

(1) 5^{-1} (2) 25 (3) -5 (4) 5

28. اگر $f(a) = 3$ و $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2y + 1$ باشد $f(x)$ در نقطه $x = a$ متمادی باشد، پس قیمت

y مساوی است به:

(1) 2 (2) 1 (3) -2 (4) -1

29. لیمت $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cdot \sin 5x}{(x-x^3)^2}$ مساوی اس به :

(1) 50 (2) $\sqrt{15}$ (3) $\frac{1815}{121}$ (4) 0

30. لیمت $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{\frac{2x}{3}}}{\sin^{\frac{3x}{5}}}$ مساوی است به:

(1) $\frac{25}{81}$ (2) 1 (3) $\frac{81}{25}$ (4) 0

31. اگر $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{5}$ باشد مجانب مایل $f(x)$ مساوی است به:

(1) مجانب مایل ندارد (2) $y = -\left(x + \frac{1}{5}\right)$ (3) $y = x + \frac{1}{5}$ (4) $y = x - \frac{1}{5}$

32. لیمت $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^5 - 8x^3)$ مساوی است به:

(1) 0 (2) 1 (3) ∞ (4) -1

33. لیمت $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\tan x - \sin x}{12 \tan x}$ مساوی است به:

(1) $\frac{\sin^2 3}{6}$ (2) $\frac{\sin^2 \frac{3}{2}}{6}$ (3) $\frac{\sin^2 2}{3}$ (4) $\frac{\sin^2 2}{6}$

34. لیمیت $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 2x}{\sin x}$ مساوی است به:

(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) 3

35. لیمت $\lim_{x \rightarrow 0.01} \frac{1 - \cos^2 \frac{1}{200}}{1 - \cos x}$ مساوی است به:

(1) $\sin(0.01) - 1$ (2) $\frac{1}{100}$ (3) $\sin^2(0.01) - 1$ (4) هیچکدام

36. لیمت $\lim_{x \rightarrow \ln \frac{1}{2}} \frac{\ln 2 + \ln 2 \cos x}{\cos^2 \ln \frac{1}{\sqrt{2}}}$ مساوی است به:

(1) $\cos^2 \ln \frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\ln^2 + \ln 2 \cos x$ (3) $\ln 4$ (4) 2

37. اگر $f(x) = \sin x + x$ باشد پس $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\pi+h)-f(\pi)}{h}$ مساوی است به:

(1) -1 (2) 0 (3) موجود نیست (4) 1

38. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$ مساوی است به:

(1) 1 (2) 0 (3) موجود نیست (4) -1

39. اگر $g(x) = \frac{e^x - 1}{2x^2}$ باشد، پس حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ یکی از گزینه های ذیل است:

(1) 6 (2) ∞ (3) $-\infty$ (4) موجود نیست

40. لیمت $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{\pi}}} \frac{\pi^{-\frac{2}{4}} - x}{\pi^{-1} - x^2}$ مساوی است به:

(1) $2\sqrt{\pi}$ (2) $\frac{2}{\pi}$ (3) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (4) $\frac{\sqrt{4\pi}}{4}$

41. لیمت $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{3 \ln(x+\Delta x)} - e^{3 \ln x}}{\Delta x}$ مساوی است به:

(1) $3e^{\ln x^2}$ (2) $e \ln x^2$ (3) $e^{\ln x}$ (4) $3e \ln x^2$

42. $\lim_{x \rightarrow \ln 10} \frac{x^2 - \ln^2 10}{x - \ln 10}$ مساوی است به:

(1) $\frac{1}{2} \ln 10000$ (2) $\frac{1}{2} \ln 10$ (3) $\ln 10$ (4) $\ln 1000$

$$.43 \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2}x + \sqrt{2}h)^3 - (\sqrt{2}x)^3}{h} \text{ مساوی است به:}$$

$$\begin{array}{ll} 6 - \sqrt{2}(2x)^2 & (2) \quad 3 - \sqrt{2}x & (1) \\ 3\sqrt{8}x^2 & (4) \quad 3\sqrt{2}(2x)^2 & (3) \end{array}$$

$$.44 \quad \lim_{x \rightarrow \ln 3} \frac{k^2 - \ln^2 3}{k - \ln 3}, k \neq \ln 3 \text{ مساوی است به:}$$

$$\ln 3 \quad (4) \quad \text{صفر} \quad (3) \quad 2\ln 3 \quad (2) \quad k + \ln 3 \quad (1)$$

$$.45 \quad \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt{x}-\sqrt{8}} \text{ مساوی است به:}$$

$$4\sqrt{2} \quad (4) \quad 3\sqrt{2} \quad (3) \quad 2\sqrt{2} \quad (2) \quad \sqrt{2} \quad (1)$$

$$.46 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(9x+2)^2 - 4}{x} \text{ مساوی است به:}$$

$$40 \quad (4) \quad 36 \quad (3) \quad 32 \quad (2) \quad 16 \quad (1)$$

$$.47 \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} \text{ مساوی است به:}$$

$$1 \quad (4) \quad -1 \quad (3) \quad \text{صفر} \quad (2) \quad \text{موجود نیست} \quad (1)$$

$$.48 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{50} + 2x^{25}}{x^{25} + 1} \text{ مساوی است به:}$$

$$1 \quad (4) \quad 0 \quad (3) \quad 2^{25} \quad (2) \quad \infty \quad (1)$$

$$.49 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(9x^4+1)^{30} + (5x^4+2)^{20}}{(3x^2+3)^{30} + (3x^4+4)^{20}} \text{ عبارت است از:}$$

$$3^{30} \quad (4) \quad 9^9 \quad (3) \quad \infty \quad (2) \quad 9^0 \quad (1)$$

50. لیمت $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^{100} + (x^2 - 1)^{100} + x^{50}}{x^{100} + 9x^{100} + 1}$ مساوی است به:

(1) ∞ (2) $\frac{8}{9}$ (3) 1 (4) 0

51. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{50} + 2x^{25}}{x^{25} + 1}$ مساوی است به:

(1) ∞ (2) 2^{25} (3) 0 (4) 1

52. قیمت لیمت $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^4 - (n-1)^4}{(2n+1)^4 + (n-1)^4}$ عبارت از:

(1) $\frac{5}{17}$ (2) $\frac{15}{17}$ (3) صفر (4) بی نهایت

53. مقدار لیمت $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{7n + \sqrt{5}}}{\sqrt{343n + \sqrt{2}}}$ عبارت از:

(1) $-\frac{1}{4}$ (2) $-\frac{1}{7}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{7}$

54. قیمت $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left[\pi \left(\sqrt{n^2 + n} - n \right) \right]$ مساوی است به:

(1) 1 (2) 2 (3) 0 (4) ∞

55. لیمت تابع $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^{x+2} + 6^{x+1}}{5 \cdot 6^x + 2^x}$ عبارت از:

(1) $\frac{3}{4}$ (2) 1 (3) $\frac{6}{5}$ (4) $\frac{1}{2}$

56. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\sqrt{2}x}$ مساوی است به:

(1) $\sqrt{e}$ (2) $e^{\sqrt{2}}$ (3) $e^{-\sqrt{2}}$ (4) $-\sqrt{2}$

57. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^{x+2}$ مساوی است به:

- $e^{\frac{1}{2}}$ (4) e^2 (3) e^4 (2) e^5 (1)

58. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$ مساوی است به:

- $e^{\frac{1}{2}}$ (4) 0 (3) 1 (2) e (1)

59. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{x^2}$ لیمت مساوی است به:

- e (4) -1 (3) 1 (2) $-e$ (1)


60. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\frac{\sin x}{x}}$ مساوی است به:

- ∞ (4) e (3) 1 (2) (1) موجود نیست

61. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[x]{1 + \frac{1}{4x}} \right)$ مساوی است به:

- $\frac{1}{e^{10}}$ (4) 1 (3) $\sqrt{e}$ (2) $\sqrt[4]{e}$ (1)

62. در شکل ذیل $\lim_{x \rightarrow -4} f(x) + \lim_{x \rightarrow -3} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ عبارت است از:



- 3 (2) 1 (1)

- 5 (4) 4 (3)

63. هرگاه $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) + x - 5] = 4$ باشد در این صورت $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ عبارت از:

- 3 (1) 5 (2) 6 (3) 7 (4)

64. هرگاه $x_n = \sqrt[n]{5}$ و $y_n = 2 + \frac{1}{n}$ باشد $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n)$ عبارت از:

- 2 (1) -1 (2) n (3) 0 (4)

65. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$ باشد در این صورت $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(f(x)-3)(f^2(x)-4f(x)+1)}{x+3}$ عبارت از:

- 0 (1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4)

66. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-3)x^3 - 4x^2 + x - 5}{(b-2)x^2 + 3} = 4$ لیمت در این صورت قیمت $a + b$ عبارت از:

- 2 (1) 3 (2) 5 (3) 4 (4)

67. لیمت $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x^{\cos x}$ عبارت از:

- 0 (1) 1 (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4)

68. لیمت $\lim_{x \rightarrow \infty} [\ln \sqrt{e^3 x^2 + 2} - \ln \sqrt{e^4 x^2}]$ عبارت از:

- 1 (1) 1 (2) $-\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4)

69. هرگاه $f(x) = \left[1 + \frac{4x^2}{3x^3 + 1}\right]^x$ باشد در این صورت $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ عبارت از:

- $\sqrt{e}$ (1) $\sqrt[3]{e^4}$ (2) $\sqrt[3]{e}$ (3) 1 (4)

70. لیمت $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{1 - 2x}$ عبارت از:

- e^{-2} (1) e^{-1} (2) e (3) e^2 (4)

فصل دهم

مشتقات

یکی از مباحث اساسی علم ریاضیات مشتق بوده که سهولت بیشتر را در علوم ساینس بوجود آورده است ، مشتق توسط «اسحاق نیوتن» عالم انگلیسی بوجود آمده که بعداً عالم جرمنی «ویلم لبنز» آنرا بطور مفصل توضیح و تشریح نمود.

افزایش تابع: در تابع $y = f(x)$ اگر متحول x به اندازه Δx افزایش نماید، واضح است که تابع مربوط نیز به اندازه Δy افزایش خواهد کرد. یعنی:

$$y = f(x)$$

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x) - y$$

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

رابطه اخیر افزایش یک تابع را نشان میدهد در صورتیکه متحول مربوط افزایش نموده باشد. حالا به تحلیل افزایش تابع ، میتوان مشتق یک تابع را از نگاه هندسی و تحلیل الجبری چنین تعریف نمود.

تعریف:

به تعبیر هندسی، مشتق عبارت از میل مماس در یک نقطه معین از منحنی است. به تحلیل الجبری هرگاه $y = f(x)$ یک تابع را ارائه نماید، پس مشتق آن عبارت از:

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

قوانین مشتق:

در صورتیکه a, c, n اعداد ثابت، x متحول و $u = f(x), v = g(x), w = h(x), \dots$ توابع را ارائه نمایند، پس داریم که:

- 1) $y = c \Rightarrow y' = 0$
- 2) $y = ax^n \Rightarrow y' = anx^{n-1}$
- 3) $y = u \pm v \pm w \pm \dots \Rightarrow y' = u' \pm v' \pm w' \pm \dots$
- 4) $y = u.v \Rightarrow y' = u'.v + u.v'$
- 5) $y = c \cdot u \Rightarrow y' = c \cdot u'$
- 6) $y = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'.v - uv'}{v^2}$
- 7) $y = \frac{c}{v} \Rightarrow y' = -\frac{cv'}{v^2}$
- 8) $y = \sqrt{u} \Rightarrow y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
- 9) $y = au^n \Rightarrow y' = anu^{n-1}.u'$

که این نوع مشتق را بنام مشتق توابع مرکب یاد می کنند، که میتوان چنین ارائه نمود.

$$u = g(x) \Rightarrow y = f(u) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$y'_x = f'(u) \cdot u'(x)$$

$$10) \quad y = \sqrt[n]{u^m} \Rightarrow y' = \frac{m \cdot u'}{n \cdot \sqrt[n]{u^{n-m}}}$$

مشتقات ضمنی: هرگاه در بعضی از روابط x با y یکجا باشند، مشتق ضمنی آن چنین دریافت میگردد.

$$y'_{(x)} = -\frac{f'(x)}{f'(y)}$$

مثلاً: مشتق ضمنی رابطه $5x^2y + 3x^3 - y^2 + 3 = 0$ را دریابید؟

$$y'_{(x)} = -\frac{f'(x)}{f'(y)} = -\frac{(10xy + 9x^2 - 0 + 0)}{5x^2 + 0 - 2y + 0}$$

$$y'_{(x)} = \frac{-10xy - 9x^2}{5x^2 - 2y}$$

مشتقات توابع مثلثاتی: در حالیکه x متحول و $u = f(x)$ یک تابع را ارائه نماید . مشتقات توابع مثلثاتی عبارت از:

$$11) \quad y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$$

$$y = \sin u \Rightarrow y' = u' \cdot \cos u$$

$$12) \quad y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$$

$$y = \cos u \Rightarrow y' = -u' \cdot \sin u$$

$$13) \quad y = \tan x \Rightarrow y' = \sec^2 x$$

$$y = \tan u \Rightarrow y' = u' \sec^2 u$$

$$14) \quad y = \cot x \Rightarrow y' = -\csc^2 x$$

$$y = \cot u \Rightarrow y' = -u' \csc^2 u$$

$$15) \quad y = \sec x \Rightarrow y' = \sec x \cdot \tan x$$

$$y = \sec u \Rightarrow y' = u' \sec u \cdot \tan u$$

$$16) \quad y = \csc x \Rightarrow y' = -\csc x \cdot \cot x$$

$$y = \csc u \Rightarrow y' = -u' \csc u \cdot \cot u$$

مشتقات توابع لوگارتیمی و نمائی (اکسپوننشیل): در حالیکه x متحول و

$u = f(x)$ یک تابع را ارائه نماید، توابع لوگارتیمی و نمائی قرار ذیل اند.

$$17) \quad y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$y = \ln u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u}$$

$$18) \quad y = \log_a^x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \cdot \log_a^e$$

$$y = \log_a^u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u} \cdot \log_a^e$$

$$19) \quad y = e^x \Rightarrow y' = e^x$$

$$y = e^u \Rightarrow y' = u' \cdot e^u$$

$$20) \quad y = a^x \Rightarrow y' = a^x \cdot \ln a, \quad a \neq 1, a > 0$$

$$y = a^u \Rightarrow y' = u' \cdot a^u \cdot \ln a, \quad a \neq 1, a > 0$$

$$21) \quad y = u^v \Rightarrow y' = u^v \left(v' \cdot \ln u + \frac{v \cdot u'}{u} \right)$$

مشتقات توابع معکوس مثلثاتی:

22. هرگاه $x = \sin y$ باشد، پس تابع معکوس آن $y = \arcsin x$ بوده که مشتق آن

عبارت از:

$$22) \quad y = \arcsin x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \arcsin u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

23. هرگاه $x = \cos y$ باشد، پس تابع معکوس آن $y = \arccos x$ بوده که مشتق آن عبارت از:

$$23) \quad y = \arccos x \Rightarrow y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \arccos u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

24. هرگاه $x = \tan y$ باشد، پس تابع معکوس آن $y = \arctan x$ بوده که مشتق آن عبارت از:

$$24) \quad y = \arctan x \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y = \arctan u \Rightarrow y' = \frac{u'}{1+u^2}$$

25. هرگاه $x = \cot y$ باشد، پس تابع معکوس آن $y = \operatorname{arc} \cot x$ بوده که مشتق آن عبارت از:

$$25) \quad y = \operatorname{arc} \cot x \Rightarrow y' = \frac{-1}{1+x^2}$$

$$y = \operatorname{arc} \cot u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{1+u^2}$$

26. هرگاه $x = \sec y$ باشد، پس تابع معکوس آن $y = \arcsec x$ بوده که مشتق آن عبارت از:

$$26) \quad y = \arcsec x \Rightarrow y' = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$y = \arcsec u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u\sqrt{u^2 - 1}}$$

27. هرگاه $x = \csc y$ باشد، پس تابع معکوس آن $y = \operatorname{arccsc} x$ بوده که مشتق آن عبارت از:

$$27) \quad y = \operatorname{arccsc} x \Rightarrow y' = \frac{-x'}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$y = \operatorname{arccsc} u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{u\sqrt{u^2 - 1}}$$

مشتقات مرتبه بلند: هرگاه تابع $y = f(x)$ مشتق پذیر باشد، مشتق مرتبه اول آن $y' = f'(x)$ ، مشتق مرتبه دوم آن $y'' = f''(x)$ ، مشتق مرتبه سوم آن $y''' = f'''(x)$ و ... $y^{(n)} = f^{(n)}(x)$ می باشد.

قابل یادآوری است که در تابع پولینومیل $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ مشتق $f^{(n)}(x) = a_n \cdot n!$ و مشتق $f^{(n+1)}(x) = 0$ یعنی $f^{(n+1)}(x) = 0$


تحولات توابع (موارد استعمال مشتق)

مشتق موارد استعمال زیاد دارد، مثلاً در فزیک تمام معادلات مربوط به حرکت، سرعت و تعجیل با استفاده از مشتق حل می‌گردد. تحولات تابع، نقطه اعظمی، نقطه اصغری، ساحه متزاید، ساحه متناقص توابع، در محاسبات علم کیمیا، کیمیا صنعتی، انجینیری و غیره میتوان از آن استفاده به عمل آورد، که ذیلاً به تحلیل آن می‌پردازیم.

1. **تابع ثابت:** هرگاه مشتق اول یک تابع برای همیشه صفر باشد، یعنی $f'(x) = 0$ باشد، در این صورت $f(x) = c$ تابع ثابت گفته میشود.

2. **تابع متزاید:** هرگاه اشاره مشتق اول تابع $y = f(x)$ در یک انتروال (a, b) مثبت باشد، یعنی $f'(x) > 0$ باشد، تابع در همان انتروال متزاید گفته می‌شود.

یا به عباره دیگر اگر $x_1 < x_2$ باشد، تابع متزاید گفته می‌شود اگر $f(x_1) < f(x_2)$ باشد.




3. **تابع متناقص:** هرگاه اشاره مشتق اول تابع $y = f(x)$ در یک انتروال (a, b)

منفی باشد، یعنی $f'(x) < 0$ باشد، تابع در همان انتروال متناقص گفته می شود.

یا به عباره دیگر اگر $x_1 < x_2$ باشد، تابع متناقص گفته می شود اگر

$f(x_1) > f(x_2)$ باشد.



نقاط بحرانی (Extreme) توابع: نقاط بحرانی توابع عبارت از نقاط اصغری و

اعظمی توابع میباشد که عبارت اند از:

1. **نقطه اصغری Minimum:** هرگاه اشاره مشتق یک تابع در یک نقطه معین x_0


از منفی به مثبت تبدیل گردد، یعنی در همان نقطه معین x_0 منحنی تابع از حالت

تناقص به حالت تزايد تبدیل گردد همان نقطه تابع را نقطه اصغری ($\min$) می نامند.

به عباره دیگر هرگاه در تابع $y = f(x)$ $f'(x) = 0$ ، $f''(x) > 0$ باشد، نقطه

$[x_0, f(x_0)]$ را اصغری ($\min$) نامیده و خصوصیت گراف منحنی مذکور مقعر


است.



2. **نقطه اعظمی** Maximum: هرگاه اشاره مشتق یک تابع در یک نقطه معین


x_0 از مثبت به منفی تبدیل گردد، یعنی در همان نقطه معین x_0 منحنی تابع از حالت تزايد به حالت تناقص تبدیل گردد همان نقطه تابع را نقطه اعظمی (max) می نامند.

به عباره دیگر هرگاه در تابع $y = f(x)$ ، $f'(x) = 0$ ، $f''(x) < 0$ باشد، نقطه $[x_0, f(x_0)]$ را اعظمی (max) نامیده و خصوصیت گراف منحنی مذکور محذب است.



نقطه انعطاف Inflection: نقطه که انتروال های محذب بودن و مقعر بودن گراف تابع را از همدیگر جدا می سازد بنام نقطه انعطاف یاد می گردد، و یا به عباره دیگر هرگاه اشاره مشتق یک تابع در یک نقطه معین x_0 از منفی به صفر و دوباره به منفی و یا از مثبت به صفر و دوباره به مثبت تبدیل گردد نقطه مذکور را نقطه انعطاف (In) می نامند.

زمانی یک تابع دارای نقطه انعطاف می باشد که $f''(x) \neq 0$ بوده که جهت دریافت آن $f''(x) = 0$ قرار داده میشود.



تحولات توابع مثلثاتی:

1. **تحول تابع** $y = \sin x$: این تابع پریودیک بوده که ساحه تحول آن بین $[-1, +1]$ و پریود آن به اندازه (2π) می باشد، و در انتروال $[0, 2\pi]$ دارای نقاط ذیل می باشد.

$$f(x) = \sin x, \quad [0, 2\pi]$$


دارای یک نقطه اعظمی در $\max\left(\frac{\pi}{2}, +1\right)$

دارای یک نقطه اصغری در $\min\left(\frac{3\pi}{2}, -1\right)$

و دارای سه نقطه انعطاف در $(0, 0), (\pi, 0), (2\pi, 0)$ می باشد.

که به طور عموم برای n پریود دارای $\max(n), \min(n), (2n+1)\pi$ می باشد

که گراف فوق در انتروال $[0, 2\pi]$ عبارت از:




در نتیجه تابع $y = \sin x$ در انتروال های $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ و $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ متزایند و در

انتروال های $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ و $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ متناقص می باشد.

2. **تحول تابع** $y = \cos x$: این تابع پریودیک بوده که ساحه تحول آن بین $[-1, +1]$ و پریود آن به اندازه (2π) می باشد، و در انتروال $[0, 2\pi]$ دارای نقاط ذیل می باشد.

$$f(x) = \cos x, \quad [0, 2\pi]$$



در نتیجه تابع $y = \cos x$ در انتروال های $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ و $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ متناقص و در

انتروال های $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ و $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ متزاید می باشد.

طوری که قبلاً ذکر نمودیم تابع $y = \sin x$ و $y = \cos x$ توابع پریودیک می باشد، یعنی $\sin(x \pm 2\pi) = \sin x$ و $\cos(x \pm 2\pi) = \cos x$ است. بنأ پریود را که در انتروال $[0, 2\pi]$ دارند عین پریود را در انتروال های $[2\pi, 4\pi], [4\pi, 6\pi], \dots$ نیز طی خواهند کرد.

3. **تحول تابع** $y = \tan x$: این تابع نیز پریودیک بوده که پریود آن به اندازه π

است، یعنی $\tan(x \pm \pi) = \tan x$ بوده و ساحه تحول آن بین $(-\infty, +\infty)$ و یک تابع همیشه متزاید است، نقاط اکستريم (اعظمی و اصغری) ندارد، اما بی نهایت نقاط

انعطاف دارد، چون تابع مذکور در شکل $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ تبدیل می گردد،


پس ناحیه تعریف تابع مذکور $\cos x \neq 0$ بوده، یعنی:

زوایا تابع دارای مجانب های عمودی می باشد که این مجانب ها عبارت اند از:

$$\dots, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}$$

گراف تابع فوق در انتروال $(-\infty, \infty)$ عبارت از:

x	$-\infty \dots$	-2π	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
y	$\dots \dots$	0	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$



طوری که در شکل ملاحظه می گردد تابع مذکور دارای بی نهایت نقاط انعطاف مانند: $(-2\pi, 0), (-\pi, 0), (0, 0), (\pi, 0)$ می باشد.

4. **تحول تابع** $y = \cot x$: این تابع نیز پریودیک بوده که پریود آن به اندازه π

است، یعنی $\cot(x \pm \pi) = \cot x$ بوده و ساحه تحول آن بین $(-\infty, +\infty)$ و یک

تابع همیشه متناقص است، نقاط اکستريم (اعظمی و اصغری) ندارد، اما بی نهایت

نقاط انعطاف دارد، چون تابع مذکور در شکل $y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ تبدیل می


گردد، پس ناحیه تعریف تابع مذکور $\cos x \neq 0$ بوده، یعنی:

زوایا تابع دارای مجانب های عمودی می باشد که این مجانب ها عبارت اند از:

$$\dots, -2\pi, -\pi, 0, +\pi, +2\pi, \dots$$

گراف تابع فوق در انتروال $(-\infty, \infty)$ عبارت از:

x	$-\infty \dots$	-2π	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
y	$\dots \dots$	$+1$	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$	$+1$	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$



طوری که در شکل ملاحظه می گردد تابع مذکور دارای بی نهایت نقاط انعطاف مانند:

$$\dots, \left(-\frac{3\pi}{2}, 0\right), \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right), \left(\frac{\pi}{2}, 0\right), \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right) \text{ می باشد.}$$

5. **تحول تابع** $y = \sec x$: این تابع نیز پرودیك بوده که پرود آن به اندازه 2π

است، و ساحه تحول آن بین $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ بوده، دارای نقاط اکستريم

(اعظمی و اصغری) می باشد، نقطه انعطاف ندارد، زیرا تابع مذکور در شکل


$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

تبدیل می گردد، پس ناحیه تعریف تابع مذکور $\cos x \neq 0$ بوده، یعنی:

زویا تابع دارای مجانب های عمودی می باشد که این مجانب ها عبارت اند از:

$$\dots, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}, +\frac{3\pi}{2}, +\frac{5\pi}{2}, \dots$$

گراف تابع فوق در انتروال $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ عبارت از:



6. **تحول تابع** $y = \csc x$: این تابع نیز پریودیک بوده که پریود آن به اندازه 2π

است، و ساحه تحول آن بین $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ بوده، دارای نقاط اکستريم (اعظمی و اصغری) می باشد، نقطه انعطاف ندارد، زیرا تابع مذکور در شکل


$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x} \quad \sin x \neq 0$$

بوده، یعنی: $set\ domain = IR - \{x / x = n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$ ، زیرا به همین قیمت

زویا تابع دارای مجانب های عمودی می باشد که این مجانب ها عبارت اند از:

$$\dots, -4\pi, -3\pi, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi \dots$$

گراف تابع فوق در انتروال $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ عبارت از:



سوالات

1. اگر $f(3x - 4) = (x^2 - 2)^3$ باشد آن وقت قیمت $f'(3x - 4)$ عبارت از:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) $2x(x^2 - 2)^2$ | (2) $2x(x^2 - 4)$ |
| (3) $6x(x^2 - 2)^2$ | (4) $2x(x^2 + 5x)$ |

2. اگر $g(x) = f(-25x)$, $g'(0) = 125$ باشد آنگاه قیمت $f'(0)$ عبارت است از:

- | | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| (1) 5 | (2) -5 | (3) 25 | (4) -25 |
|-------|--------|--------|---------|

3. اگر $f(x) = x^5$ و $g(x) = x$ باشد، پس $\frac{d[f(x) \cdot g(x)]}{dx}$ مساوی است به:

- | | | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| (1) $6f(x)$ | (2) $3f(x)$ | (3) $[f(x)]^5$ | (4) $6g(x)$ |
|-------------|-------------|----------------|-------------|

4. اگر $x^2 + y^2 = 100$ باشد، پس $y''(x)$ مساوی است به:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) $y''(x) = \frac{100}{y^2}$ | (2) $y''(x) = -\frac{100}{x^2}$ |
| (3) $y''(x) = \frac{100}{y^{-4}}$ | (4) $y''(x) = -\frac{100}{y^3}$ |

5. تغییرات متوسط تابع $f(x) = 10x^2 + 10$ در انتروال $[2, 5]$ مساوی است به:

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (1) 72 | (2) 70 | (3) 80 | (4) 90 |
|--------|--------|--------|--------|

6. تابع $f(x) = 3x^{50} + x^{40} + 1$ داده شده است، پس $\frac{d^{49}f(x)}{dx^{49}}$ مساوی است به:

- | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------------|
| (1) $150! x$ | (2) $50! \cdot 3x$ | (3) $150!$ | (4) $3 \cdot 50!$ |
|--------------|--------------------|------------|-------------------|

7. $f(x) = \frac{\ln^3 x^3 + 27}{\ln^3 x^3 + 8}$ باشد، پس $f'(1)$ مساوی است به:

$$\frac{27}{8} \quad (1) \quad \frac{54}{16} \quad (2) \quad \ln^2 1 \quad (3) \quad \frac{8}{27} \quad (4)$$

8. هرگاه تابع $f(x) = |x^2 - 2x| + |3x - 4| + x^3$ داده شده باشد در این صورت $f'(-2)$ عبارت از:

$$-5 \quad (1) \quad 5 \quad (2) \quad 3 \quad (3) \quad -1 \quad (4)$$

9. هرگاه $f(x) = 3x^2 + 2x$ و $g(x) = 3x - 4$ داده شده باشد، در این صورت $(fog)'(-1)$ عبارت از:

$$-40 \quad (1) \quad -60 \quad (2) \quad -80 \quad (3) \quad -120 \quad (4)$$

10. هرگاه $f(x) = 2x^2 - x$ و $g(x) = 1 - x^2$ داده شده باشد در این صورت $(gof)'(2)$ عبارت از:

$$-102 \quad (1) \quad -84 \quad (2) \quad -64 \quad (3) \quad -48 \quad (4)$$

11. تابع $f(x) = \left| \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \right|$ در کدام یکی از نقاط ذیل مشتق ندارد:

$$x = -1 \quad (1) \quad x = \frac{1}{2} \quad (2) \quad x = -\frac{1}{2} \quad (3) \quad x = 1 \quad (4)$$

12. اگر $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

$$\frac{-2x}{(x^2 - 2)^2} \quad (1) \quad \frac{-x}{(x^2 - 2)^2} \quad (2) \quad \frac{2}{(x^2 - 2)^2} \quad (3) \quad \frac{x}{(x^2 - 2)^2} \quad (4)$$

13. تابع $f(x) = 3x^{50} + x^{40} + 1$ داده شده است، پس $\frac{d^{49}f(x)}{dx^{49}}$ مساوی است به:

$$150! \cdot x \quad (1) \quad 50! \cdot 3x \quad (2) \quad 150! \quad (3) \quad 3 \cdot 50! \quad (4)$$

14. میل منحنی $f(x) = x^2 - 1$ در نقطه $P(1,0)$ مساوی است به:

$$4 \quad (1) \quad 4 \quad (2) \quad -2 \quad (3) \quad 2 \quad (4)$$

15. اگر $3x^2 + y^2 = 2$ باشد، پس $y''(x)$ مساوی است به:

$$y'' = -\frac{1}{y^3} \quad (1) \quad y'' = -\frac{2}{y^3} \quad (2) \quad y'' = -\frac{3}{y^3} \quad (3) \quad y'' = \frac{6}{y^3} \quad (4)$$

16. اگر $f(x) = e^{\ln(x+1)}$ باشد، پس $f'(2)$ مساوی است به:

$$1 \quad (1) \quad \infty \quad (2) \quad -1 \quad (3) \quad \text{صفر} \quad (4)$$

17. مشتق مرتبه اول تابع $y = \ln \sqrt[3]{x^4 + 1}$ مساوی است به:

$$\frac{4x^3}{3(x^4+1)} \quad (1) \quad \frac{2x^3}{x^4+1} \quad (2) \quad \frac{x^4}{x^4+1} \quad (3) \quad \frac{x^3}{x^4+1} \quad (4)$$

18. اگر $f(x) = \tan \theta$ و $g(x) = x^{15}$ باشند پس $\frac{d[f(x)g(x)]}{dx}$ مساوی است به:

$$15x^{14} \tan \theta + x^{15} \quad (1) \quad 0 \quad (2) \quad 15x^{14} f(x) \quad (3) \quad 15x^{14} \sec^2 \theta \quad (4)$$

19. مشتق مرتبه پنجم تابع $f(x) = x^5 \sin^5 \alpha$ مساویست به:

$$120 \quad (1) \quad 120 \sin^5 \alpha + \sin \alpha - 1 \quad (2) \quad 12 \sin^5 \alpha \quad (4) \quad 12 \sin^5 \alpha - \sin \alpha \quad (3)$$

20. تابع $f(x) = \frac{2x^{9!}}{(9!)!}$ داده شده است، $\frac{d^{9!}f(x)}{dx^{9!}}$ مساوی است به:

$$0! \quad (1) \quad (9!)! \quad (2) \quad 2! \quad (3) \quad \frac{1}{9!} \quad (4)$$

21. تابع $f(x) = (x^2 - y)^2$ داده شده است $\frac{df(x)}{dx}$ مساوی است به:

$$6x(x^2 - y)^3 \quad (1) \quad 3x(x^2 - y)^2 + \sec^2 y \quad (2)$$

$$3(x^2 - y)^2 + \sec^2 y \quad (3) \quad 6x(x^2 - y)^2 \quad (4)$$

22. در تابع $f(x) = (6x^{50} + 1)^3 + (3x^{40} + 1)^4$, $\frac{d^{159}f(x)}{dx^{159}}$ عبارت از:

$$\ln 2 + \ln 2 \cos x \quad (3) \quad \ln 4 \quad (2)$$

$$\cos^2 \ln \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (4)$$

23. قیمت مشتق تابع $f(x) = \ln(\cos e^x)$ در $x = \ln \frac{\pi}{4}$ عبارت است از:

$$-\frac{\pi}{4} \quad (1) \quad e^{\frac{\pi}{4}} \quad (2) \quad \frac{\pi}{2} \quad (3) \quad -\frac{\pi}{2} \quad (4)$$

24. $f(2x - 1) = x^3 - x^2 + 4x + 1$ باشد آنگاه قیمت $f(3) + f'(3) = ?$ عبارت از:

$$15 \quad (1) \quad 17 \quad (2) \quad 19 \quad (3) \quad 21 \quad (4)$$

25. اگر $y = \tan\left(\ln \frac{1}{2}x\right)$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

$$\frac{1}{x} \sec^2(\ln x - \ln 2) \quad (2) \quad \frac{1}{x} \sec^2(\ln x) \quad (1)$$

$$\frac{1}{x} \sec^2\left(\ln \frac{1}{2}x\right) \quad (4) \quad \frac{1}{2x} \sec^2(\ln x) \quad (3)$$

26. اگر $f(x) = \sin^5(2a + 1), a \in \mathbb{R}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

$$5 \sin^4 a \quad (2) \quad 1 \quad (3) \quad 5 \sin a \quad (4) \quad 0 \quad (1)$$

27. حاصل $\frac{1}{2\cos 2x} \cdot \frac{d}{dx}(\sin^2 x)$ عبارت از:

$$\begin{array}{ll} \frac{\tan 2x}{2} (1) & \frac{\cot x}{2} (2) \\ \frac{\tan x}{2} (3) & \frac{\cot 2x}{2} (4) \end{array}$$

28. مشتق تابع $y = \operatorname{arccot} x$ عبارت است از:

$$\begin{array}{llll} -\frac{1}{1+x^2} (1) & -\frac{2}{1+x^2} (2) & \frac{1}{1+x^2} (3) & \frac{2}{1+x^2} (4) \end{array}$$

29. مشتق مرتبه اول تابع $y = \cos^3 x$ عبارت است از:

$$\begin{array}{ll} y' = -3 \sin^3 x (1) & y' = -3 \sin x \cdot \cos^2 x (2) \\ y' = 3 \sin x \cdot \cos^2 x (3) & y' = 3 \sin^3 x (4) \end{array}$$

30. اگر $f(x) = \frac{2 \tan 2x}{1 - \tan^2 2x}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} -4 \sec^2 4x (1) & -\sec^2 x (2) \\ \sec^2 4x (3) & 4 \sec^2 4x (4) \end{array}$$

31. مشتق تابع $y = \arcsin e^x$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} -\frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}} (1) & \frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}} (2) & \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} (3) & -\frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} (4) \end{array}$$

32. مشتق مرتبه اول تابع $y = e^{x^2+1}$ مساوی است به:

$$\begin{array}{llll} xe^{x^2+1} (1) & -2xe^{x^2+1} (2) & 2xe^{x^2+1} (3) & -xe^{x^2+1} (4) \end{array}$$

33. اگر $f(x) = 3^{3x \cos \alpha}$ باشد، پس $\frac{d^5 f(x)}{dt^5}$ مساوی است به:

$$\begin{array}{ll} \ln 9 (1) & 0 (2) \\ \cos \alpha \ln 9 (3) & \cos \alpha \ln 3 (4) \end{array}$$

$$34. \quad f(x) = \tan\left(\ln \frac{1}{2}x\right) \text{ باشد، پس } f'(x) \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{1}{x} \sec^2(\ln x - \ln 2) \quad (2) \qquad \frac{1}{x} \sec^2(\ln x) \quad (1)$$

$$\frac{1}{x} \sec^2\left(\ln \frac{1}{2}x\right) \quad (4) \qquad \frac{1}{2x} \sec^2(\ln x) \quad (3)$$

$$35. \quad \text{مشتق مرتبه اول تابع } y = \ln \sqrt{x^2 + 4x + 4} \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{x-2}{x^2+4x+4} \quad (4) \qquad \frac{x+2}{x^2+4x+4} \quad (3) \qquad \frac{x+1}{x^2+4x+4} \quad (2) \qquad \frac{x-1}{x^2+4x+4} \quad (1)$$

$$36. \quad \text{مشتق ضمنی } x^2 + xy + y^2 - 3 = 0 \text{ را دریابید:}$$

$$y' = \frac{2x+y}{x+2y} \quad (2) \qquad y' = \frac{2x+2y}{2x+2y} \quad (1)$$

$$y' = -\frac{2x+y}{x+2y} \quad (4) \qquad y' = -\frac{2x+2y}{2x+2y} \quad (3)$$

$$37. \quad \text{اگر } x^2 + y^2 = 100 \text{ باشد، پس } y''(x) \text{ مساوی است به:}$$

$$y'(x) = -\frac{100}{y^{-5}} \quad (2) \qquad y'(x) = \frac{100}{y^2} \quad (1)$$

$$y'(x) = -\frac{100}{y^2} \quad (4) \qquad y'(x) = -\frac{100}{y^{-4}} \quad (3)$$

$$38. \quad \text{تابع } f(x) = 5 + x^2 - x \text{ دارای نقطه اصغری است به خاطریکه:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + x^2 - x) = +\infty \quad (2) \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} (5 + x^2 - x) = -\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + x^2 + x) = -\infty \quad (4) \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} (5 + x^2 - x) = \pm\infty \quad (3)$$

$$39. \quad \text{نقطه انعطاف تابع } f(x) = x^8 + 1 \text{ عبارت از:}$$

$$(1,2) \quad (4) \qquad (1,0) \quad (3) \qquad \text{نقطه انعطاف ندارد} \qquad (0,1) \quad (1)$$

40. تابع $f(x) = (x - 1)^2$ در یکی از انتروال های ذیل متزايد است:

- (1) $(\infty, 1)$ (2) $(-\infty, -2)$ (3) $(-\infty, -3)$ (4) $(-\infty, 1)$

41. انتروال محدبیت تابع $y = -4x^2 + x^4$ عبارت از:

- (1) $(\sqrt{\frac{2}{3}}, \infty)$ (2) $(-\infty, \frac{\sqrt{6}}{3})$ (3) $(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$ (4) $\{\sqrt{\frac{2}{3}}\}$

42. انتروال تناقص تابع $f(x) = 22x^{15} + 22$ عبارت از:

- (1) $(-\infty, +\infty)$ (2) انتروال تناقص ندارد (3) $(0, +\infty)$ (4) $(-\infty, 0)$

43. نقطه اکسترمم تابع $f(x) = x^{100}$ عبارت است از:

- (1) $(1, 1)$ (2) $(-1, 1)$ (3) $(0, 0)$ (4) نقطه اکسترمم ندارد

44. نقطه اکسترمم تابع $f(x) = 50x^5$ عبارت است از:

- (1) $(1, 50)$ (2) $(0, 0)$ (3) $(-1, -50)$ (4) نقطه اکسترمم ندارد

45. معادله محور تناظر تابع $f(x) = 5x^2 - 6x^3 + x - 1$ عبارت است از:

- (1) $y = \frac{5}{18}$ (2) $y = -\frac{5}{18}$ (3) $x = -\frac{5}{18}$ (4) $x = \frac{5}{18}$

46. گراف تابع $f(x) = 2^x$ در کدام یکی از نقاط ذیل انعطاف دارد:

- (1) 2 (2) نقطه انعطاف ندارد (3) -2 (4) $\ln 2$

47. مختصات مرکز تناظر تابع $f(x) = \frac{8}{3}x^3 - 8x^2 + 1$ عبارت است از:

- (1) $A\left(-1, -\frac{29}{3}\right)$ (2) $A\left(-1, \frac{13}{3}\right)$
(3) $A(0, 1)$ (4) $A\left(1, -\frac{13}{3}\right)$

48. راس گراف تابع $f(x) = -(x - 21)^2 + 11$ عبارت است از:


- (1) $(-21, 11)$ (2) $(-21, -11)$ (3) $(21, -11)$ (4) $(21, 11)$

49. انتروال تناقص تابع $f(x) = 22x^{15} + 22$ عبارت است از:

- (1) $(-\infty, +\infty)$ (2) انتروال تناقص ندارد (3) $(0, +\infty)$ (4) $(-\infty, 0)$

50. پریود تابع $f(x) = 100 \tan \frac{12x}{5}$ مساوی است به:


- (1) $\frac{12\pi}{10}$ (2) $\frac{12\pi}{5}$ (3) $\frac{5\pi}{6}$ (4) $\frac{5\pi}{12}$



51. با در نظر داشت شکل ذیل هرگاه $\begin{cases} f(x) = x^3 + ax^2 + x \\ d: y = x - 3 \end{cases}$

داده شده باشد، قیمت a عبارت از:

- (1) $-\frac{5}{2}$
(2) $-\frac{3}{2}$
(3) $-\frac{1}{2}$
(4) $\frac{5}{2}$




52. با در نظر داشت شکل ذیل هرگاه $f(x) = 2x^3 + x^2 - ax$

داده شده باشد، قیمت a عبارت از:

- (1) -27
(2) 17
(3) -23
(4) 21


53. بادر نظر داشت شکل ذیل هر گاه $h(x) = g(x) \cdot f(x) - 3x^2$ باشد، قیمت $h'(5)$ عبارت

از:



- (1) -16
- (2) -14
- (3) -12
- (4) -10

54. با در نظر داشت شکل ذیل هر گاه $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ باشد قیمت $g'(5)$ عبارت از:



- (1) $-\frac{3}{5}$
- (2) $-\frac{3}{25}$
- (3) $\frac{3}{5}$
- (4) $\frac{3}{25}$

55. نزدیکترین فاصله نقطه $(0,0)$ از منحنی $y^2 = 2x + 3$ عبارت است از:

- (1) 2
- (2) $\sqrt{2}$
- (3) $\sqrt{3}$
- (4) $2\sqrt{3}$

56. نزدیکترین فاصله نقطه $(0,0)$ از منحنی $y^2 = 2x + 5$ عبارت است از:

- (1) -2
- (2) 2
- (3) $\sqrt{7}$
- (4) $\sqrt{5}$

57. مجانب عمودی تابع $y = \csc x$ در انتروال $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ عبارت است از:

- (1) $x = \frac{3\pi}{2}, x = -\frac{3\pi}{2}$
- (2) $x = -\frac{\pi}{2}, x = \frac{\pi}{2}$
- (3) $x = -\frac{3\pi}{2}, x = \frac{\pi}{3}$
- (4) $x = -\pi, x = \pi, x = 0$

58. نقطه اکستريمم تابع $f(x) = 200x^{15}$ عبارت است از:

- (1) نقطه اکستريمم ندارد
- (2) $(-1, 200)$
- (3) $(1, 200)$
- (4) $(0, 0)$

فصل دوازدهم

انتیگرال

قبل بر اینکه بر مفهوم انتیگرال وارد شویم میخواهیم بدانید زمانیکه مساحت سطح که توسط یک منحنی گراف تابع $y = f(x)$ که در یک انتروال بسته $[a, b]$ متمادی و تعریف گردیده است و دارای شکل هندسی نمی باشد چطور قابل ملاحظه می باشد؟ تیوری این نوع محاسبه اولاً توسط ارشمیدس و بعداً به کمک انتیگرال توسط علمای دیگر مانند برنولی، نیوتن، لایبنز، کوشی، مالکورین ... دنبال گردید است انتروال بسته $[a, b]$ منحنی تابع مذکور را به n مستطیل ها تقسیم می نماییم طوری که عرض مستطیل ها از رابطه $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ و طول این مستطیل ها عبارت از قیمت تابع در همان نقطه می باشد پس (با در نظر مجموع ریمان این مجموع عبارت از $\sum_{i=1}^n (f(x_i) \cdot \Delta x)$ بوده که اگر از مجموعه مذکور لیمت بگیریم یعنی $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (f(x_i) \cdot \Delta x)$ می توان مساحت سطح را که توسط منحنی احاطه گردیده دریافت نماییم.

پس می توان گفت انتیگرال عبارت از تابع است که مشتق آن معین می باشد و یا به عبارت دیگر انتیگرال عبارت از لیمت مجموعه عددی است (مجموع ریمان را انتیگرال می نامند) که به وسیله علامه $\int$ (اِراثه) می گردد. یعنی:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (f(x_i) \cdot \Delta x) = \int f(x) dx$$

که در رابطه فوق $f(x)$ را تابع و dx را متغیر انتگرال گیری نظر به متحول x می گویند.

انتگرال ها معمولاً بدو نوع اند: انتگرال غیر معین و انتگرال معین که هر یک را توضیح می نماییم.

انتگرال غیر معین:

تعریف: هرگاه تابع $f(x)$ در انتروال بسته $[a, b]$ تعریف و $F(x)$ یک تابع اولیه از $f(x)$ باشد، ست توابع $f(x) + C$ (درحالیکه C یک عدد ثابت اختیاری است) بنام انتگرال غیر معین از تابع $f(x)$ گفته می شود، و چنین ارایه می گردد.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

خواص اولیه انتگرال غیر معین:

1. در صورتیکه K یک عدد ثابت باشد، داریم که:

$$\int K dx = K \int dx = Kx + c$$

2. در صورتیکه $n \neq -1$ باشد، داریم که:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

3. در حالیکه K یک عدد ثابت و $f(x)$ یک تابع را ارایه نماید، داریم که:

$$\int K \cdot f(x) dx = K \int f(x) dx$$

4. هرگاه $f(x)$ و $g(x)$ توابع را ارائه نمایند، پس حاصل جمع و حاصل تفریق آنها تحت انتگرال عبارت

از:

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

5. انتیگرال ترادف توابع مساوی است به مجموع انتیگرال هر حد آن ، یعنی:

$$\int [f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)]dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \dots + \int f_n(x)dx$$

به خاطر داشته باشید که:

$$1) \quad \int f(x) \cdot g(x)dx \neq \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx$$

$$2) \quad \int \frac{f(x)}{g(x)}dx \neq \frac{\int f(x)dx}{\int g(x)dx}, g(x) \neq 0$$

انتیگرال های اساسی: با در نظر داشت مشتقات توابع ، انتیگرال بعضی توابع اساسی را بحیث اولین منبع انتیگرال گیری برای ساده ترین شکل راه حل سوالات انتیگرال قرار ذیل در نظر گرفت.

$$1) \quad \int k dx = kx + c$$

$$2) \quad \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c \quad \int u^a du = \frac{u^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$$

$$3) \quad \int \frac{dx}{x} = \ln x + c \quad \int \frac{du}{u} = \ln u + c, u \neq 0$$

$$4) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + c, a > 1$$

$$5) \quad \int e^x dx = e^x + c \quad \int e^u du = e^u + c$$

$$6) \quad \int \cos x dx = \sin x + c \quad \int \cos u du = \sin u + c$$

$$7) \quad \int \sin x dx = -\cos x + c \quad \int \sin u du = -\cos u + c$$

$$8) \quad \int \tan x dx = \ln |\sec x| + c \quad \int \tan u du = \ln |\sec u| + c$$

$$9) \quad \int \sin^2 u du = \frac{1}{2}u - \frac{1}{4}\sin 2u + c$$

$$10) \quad \int \frac{du}{\cos^2 u} = \tan u + c$$

$$11) \quad \int \frac{du}{\sin^2 u} = -\cot u + c$$

$$12) \quad \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + c$$

$$13) \quad \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + c$$

$$14) \quad \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm 1}} = \ln \left(\left| u + \sqrt{u^2 \pm 1} \right| \right) + c$$

$$15) \quad \int \frac{du}{u^2 - 1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + c$$

$$16) \quad \int x e^{-ax} dx = -\frac{1}{a^2} (ax + 1) e^{-ax} + c$$

$$17) \int x^2 e^{-ax} dx = -\frac{1}{a^3} (a^2 x^2 + 2ax + 2) e^{-ax} + c$$

$$18) \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2}) + c$$

$$19) \int \frac{xdx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{(x^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} + c$$

$$20) \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{a^2(x^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} + c$$

$$21) \int \frac{xdx}{x+d} = x - d(\ln x + d) + c$$

انتیگرال گیری بوسیله تعویض: با در نظر داشت مشتق توابع مرکب یعنی:

$$\frac{dF(g(x))}{dx} = F'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\int F'(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + c$$

می توان انتیگرال آنرا چنین نوشت:

رابطه اخیر که اساس انتیگرال گیری بوسیله تعویض را بیان می نماید طوریکه اگر $g(x)=u, F' = f$ تعویض گردد ، پس $du = g'(x) \cdot dx$ خواهد گردید ، بناً می توان نوشت:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du = F(u) + c = F(g(x)) + c$$

بناً در این طریقه توجه گردد که متحول تابع تحت انتیگرال از جنس یک متحول مناسب طوری تعویض گردد که انتیگرال مربوط آن نظر به متحول جدید پیشبینی شده بتواند که باید بعد از دریافت انتیگرال ، متحول قبلی در تابع اولیه مجدداً گذاشته شود.

انتیگرال های قسمی: با استفاده از مشتق حاصل ضرب دو تابع $u = f(x)$ و $v = g(x)$ می توان نوشت:

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$v' \cdot u = (u \cdot v)' - u' \cdot v$$

$$\int v' \cdot u dx = \int (u \cdot v)' - \int u' \cdot v dx$$

$$\Rightarrow \int u dv = u \cdot v - \int v du$$

محاسبه انتیگرال بوسیله کسور قسمی: با استفاده از تجزیه کسر ها به کسور قسمی آن که قبلاً مطالعه نمودیم ، می توان انتیگرال بعضی از توابع را به چند انتیگرال تبدیل نموده و به حل آن اقدام نماییم ، بطور مثال:

$$1) \quad \int \frac{x+5}{x^2+4} dx = ?$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+5}{x^2+4} dx = \int \left(\frac{x}{x^2+4} + \frac{5}{x^2+4} \right) dx = \underbrace{\int \frac{xdx}{x^2+4}}_{I_1} + \underbrace{\int \frac{5dx}{x^2+4}}_{I_2}$$

$$I_1 = \int \frac{xdx}{x^2+4} = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} u = x^2 + 4 \\ du = 2xdx \\ \frac{du}{2} = xdx \end{array} \right\} \Rightarrow \int \frac{xdx}{x^2+4} = \int \frac{\frac{du}{2}}{u} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln|u| + c_1$$

$$= \int \frac{xdx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \ln|x^2+4| + c_1$$

$$I_2 = \int \frac{5dx}{x^2+4} = ?$$

$$\Rightarrow \int \frac{5dx}{x^2+4} = 5 \int \frac{dx}{4 \left(\left(\frac{x}{2} \right)^2 + 1 \right)} = \frac{5}{4} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{2} \right)^2 + 1}$$

$$\left. \begin{array}{l} u = \frac{x}{2} \\ du = \frac{1}{2} dx \\ dx = 2du \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{5}{4} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{2} \right)^2 + 1} = \frac{5}{4} \int \frac{2du}{u^2+1} = \frac{5}{2} \int \frac{du}{u^2+1} = \frac{5}{2} \arctan u + c_2$$

$$= \int \frac{5dx}{x^2+4} = \frac{5}{2} \arctan \left(\frac{x}{2} \right) + c_2$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+5}{x^2+4} dx = I_1 + I_2$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+5}{x^2+4} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+4| + \frac{5}{2} \arctan \left(\frac{x}{2} \right) + C$$

انتیگرال معین: لیمت مجموع ریمان تابع $f(x)$ در انتروال بسته $[a, b]$ زمانیکه $n \rightarrow \infty$ و بزرگترین طول انتروال های فرعی Δx به طرف صفر تقرب نماید، انتیگرال معین تابع $f(x)$ از $x = a$ الی $x = b$ یاد می گردد،

یعنی:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

که a را سرحد پایینی و b را سرحد بالایی انتیگرال مذکور می نامند.

خواص انتیگرال معین:

- 1) $\int_a^a f(x) dx = 0$
- 2) $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
- 3) $\int_a^b K \cdot f(x) dx = K \int_a^b f(x) dx, K = \text{const}$
- 4) $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
- 5) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
- 6) $m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

مثال 1: قیمت انتیگرال ذیل را دریابید؟

$$\int_1^3 5x^2 dx = ?$$

$$\int_1^3 5x^2 dx = 5 \int_1^3 x^2 dx = 5 \cdot \frac{x^{2+1}}{2+1} \Big|_1^3 = \frac{5}{3} x^3 \Big|_1^3 = \frac{5}{3} (3^3 - 1^3) = \frac{5}{3} (27 - 1) = \frac{130}{3} = 43.3$$

سوالات

1. $\int \frac{\ln^2 x^8 dx}{\ln^2 x^4}$ مساوی است به:

(1) $\frac{1}{2} \ln^2 x^8 + c$ (2) $4x + c$ (3) $2x + c$ (4) $\frac{1}{2} \ln x^4 + c$

2. $\int \sqrt{3^x} 3^x dx$ مساوی است به:

(1) $5\sqrt[3]{3^x}$ (2) $\frac{2}{3}(\sqrt{3^x})^3$
 (3) $\frac{2}{\ln 27} 3^{2x} \sqrt{3^x} + c$ (4) $\frac{2 \cdot 3^{x-1}}{\ln 3} \sqrt{3^x} + c$

3. انتگرال $\int (ax^2 + x + 1)^5 (2ax + 1) dx$ مساوی است به:

(1) $-\frac{(ax^2+x+1)^6}{6} + c$ (2) $\frac{(ax^2+x+1)^2}{6} + c$
 (3) $\frac{(ax^2+x+1)^6}{6} + c$ (4) $\frac{(ax^2+x+1)^6}{6} + c$

4. $\int \frac{(x+2)^2-16}{x+6} dx$ مساوی است به:

(1) $\frac{x^2}{2} - 6x + c$ (2) $-\frac{x^2-4x}{2} + c$
 (3) $-\frac{4x^2-x}{2} + c$ (4) $\frac{x^2}{2} + 6x + c$

5. $\int \tan x d(\tan x)$ مساوی است به:

(1) $-\ln|\cos x| + c$ (2) $\frac{\tan^2 x}{2} + c$ (3) $\ln|\cos x| + c$ (4) $\tan^2 x = c$

$$6. \int \frac{(x^6-1)(x^6+1)}{x^8} dx \text{ مساوی است به:}$$

$$x^5 + x^{-7} + C \quad (1)$$

$$\frac{x^5}{5} + \frac{1}{7x^7} + C \quad (2)$$

$$x^5 - x^{-7} + C \quad (3)$$

$$\frac{x^5}{5} - \frac{1}{7x^7} + C \quad (4)$$

$$7. \int 10^x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x dx \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{5^x}{\ln 5} + C \quad (1)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x + C \quad (2)$$

$$\frac{10^x}{\ln 10} + C \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{2}\right) + C \quad (4)$$

$$8. \int \sqrt{\tan x} \sec^2 x dx \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{2}{3} \tan x \sqrt{\tan x} + c \quad (1)$$

$$\frac{2}{3} \sqrt{\tan x^3} + c \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \sqrt{\tan^3 x} + c \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \sqrt{\tan^3 x} + c \quad (4)$$

$$9. \int \sin x^2 d(x^2) \text{ مساوی است به:}$$

$$-\cos x^2 + c \quad (1)$$

$$\frac{\sin^2 x}{2} + c \quad (2)$$

$$-\cos^2 x + c \quad (3)$$

$$-\cos x + c \quad (4)$$

$$10. \int e^x \sqrt{e^x + 2} dx \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{2e^{x+4}}{3} \sqrt{e^x + 2} + c \quad (1)$$

$$\frac{3}{2} \sqrt{(e^x + 2)3} + c \quad (2)$$

$$\frac{2}{5} \sqrt[3]{e^x + 3} + c \quad (3)$$

$$\frac{2}{3} e^x \sqrt{e^x + 2} + c \quad (4)$$

$$11. \int x e^{x^2} dx \text{ مساوی است به:}$$

$$(1) 2xe^{x^2} + c \quad (2) \frac{1}{2}e^{x^2} + c \quad (3) -\frac{1}{2x}e^{x^2} + c \quad (4) \frac{1}{2x}e^{x^2} + c$$

$$12. \text{ حاصل انتیگرال } \int \tan^2 x dx \text{ مساوی است به:}$$

$$(1) \tan x - x + c \quad (2) \tan x + x + c \quad (3) \tan x \quad (4) \cot x$$

$$13. \int e^{e^{\ln x}} dx \text{ مساوی است به: } x > 0,$$

$$(1) e^{\ln x} \quad (2) e^{\ln x} + c \quad (3) \ln x e^{\ln x} + c \quad (4) \frac{1}{\ln x} e^{\ln x} + c$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{x} \csc \sqrt{x}} \text{ مساوی است به:}$$

$$(1) \frac{2}{\sqrt{x} \csc \sqrt{x}} \quad (2) -\frac{1}{2 \sec \sqrt{x}} + c \quad (3) -\frac{2}{\sec \sqrt{x}} + c \quad (4) \frac{1}{2 \sec \sqrt{x}} + c$$

$$15. \int \frac{dx}{\log_x 7} \text{ مساوی است به: } x \neq 1, x > 0,$$

$$(1) \frac{x}{\log_7 x} + c \quad (2) \frac{x}{\log_7 \left(\frac{x}{c}\right)} + c \quad (3) x \log_{\frac{x}{3}} 7 + c \quad (4) x \log_7 \frac{x}{e} + c$$

$$16. \int \ln 2x dx \text{ مساوی است به:}$$

$$(1) x(\ln|2x| - 1) + c \quad (2) 2x \ln 2x + c \quad (3) x \ln 2x + c \quad (4) x \ln(2x + 1) + c$$

$$17. \int \ln(\sqrt{x})^7 dx \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{7}{2}x(\ln|x| - 1) + C \quad (1)$$

$$\frac{2}{7}x(\ln|x| - 1) + C \quad (3)$$

$$-\frac{2}{7}x(\ln|x| - 1) + C \quad (2)$$

$$-\frac{7}{2}x(\ln|x| - 1) + C \quad (4)$$

$$18. \text{انتیگرال } \int_1^2 \tan^2\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8}\right) dy \text{ مساوی است به:}$$

$$4 \quad (1) \quad \frac{\pi}{4} \quad (2) \quad \frac{\pi}{8} \quad (3) \quad 1 \quad (4)$$

$$19. \text{نتیگرال } \int_0^2 3^x dx \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{9}{\ln 3} \quad (1) \quad \frac{11}{\ln 3} \quad (2) \quad \frac{10}{\ln 3} \quad (3) \quad \frac{8}{\ln 3} \quad (4)$$

$$20. \int_{\frac{4\pi}{8\sqrt{10}}}^{\frac{\pi}{\sqrt{40}}} dx \text{ مساوی است به:}$$

$$0 \quad (1) \quad 1 \quad (2) \quad -1 \quad (3) \quad \pi/\sqrt{40} \quad (4)$$

$$21. \text{حاصل انتیگرال } \int_0^1 e^{-x} dx + \int_1^0 e^{-x} dx \text{ مساوی است به:}$$

$$1 \quad (1) \quad 0 \quad (2) \quad e^{-1} \quad (3) \quad 2e^{-1} \quad (4)$$

$$22. \int_0^1 x^2(1+2x^3)^5 dx \text{ مساوی است به:}$$

$$\frac{183}{9} \quad (1) \quad \frac{184}{9} \quad (2) \quad \frac{182}{9} \quad (3) \quad \frac{180}{9} \quad (4)$$

23. حاصل $\int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) dx$ مساوی است به:

$\frac{3}{8}$ (1) $\frac{5}{8}$ (2) $\frac{7}{8}$ (3) $\frac{9}{8}$ (4)

24. اگر $\int_8^{12} f(x) dx = 7$ و $\int_0^8 f(x) dx = 9$ باشد، پس $\int_0^{12} f(x) dx$ مساوی است به:

18 (1) 16 (2) 17 (3) 14 (4)

25. $\int_0^2 \frac{dx}{(3-2x)^2}$ مساوی است به:

$x = \frac{1}{3}$ (1) $x = \frac{1}{2}$ (2) $x = \frac{1}{5}$ (3) $x = -\frac{2}{3}$ (4)

26. مساحت سطح محصور شده توسط دو منحنی

$f(x) = -x^2 + 4x + 2$ و $g(x) = x^2 - 2x + 2$ مساوی است به:

16 (1) 9 (2) $\frac{1}{6}$ (3) $\frac{1}{5}$ (4)

27. $\int_e^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin^2 x - \cos^2 x)}{\cos 2x} dx$ مساوی است به:

$-\pi$ (1) $-\frac{\pi}{2}$ (2) 2μ (3) 0 (4)

28. مساحت محصور شده توسط منحنی $y = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}x^2$ و محور x مساوی است به:

$\frac{4}{15}$ (1) $\frac{6}{15}$ (2) $\frac{15}{4}$ (3) $\frac{15}{6}$ (4)

29. اگر سطحی توسط دو منحنی $y_1 = y_1(x)$ و $y_2 = y_2(x)$ محصور شده باشد طوری که $y_1 > y_2$

باشد، مساحت سطح مذکور از کدام رابطه دریافت می گردد؟

$$A = \int_a^b (y_1 + y_2) dx \quad (1) \quad A = \int_a^b (y_2 - y_1) dx \quad (2)$$

$$A = \int_a^b (y_1 - y_2) dx \quad (3) \quad A = \int_a^b (y_2 - y_1) dx \quad (4)$$

30. مساحت بین منحنی $y = \sin x$ و محور x و خطوط $x = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{2}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (1) \quad \sqrt{2} \quad (2) \quad 3 \quad (3) \quad \frac{1}{2} \quad (4)$$

31. مساحت سطحی که به منحنی $y = \frac{(x+1)^2}{4}$ در انتروال $[0,1]$ و بین محور x واقع است، مساوی است

به:

$$\frac{7}{12} \quad (1) \quad 12 \quad (2) \quad \frac{5}{12} \quad (3) \quad \frac{1}{12} \quad (4)$$

32. مساحت سطحی که به منحنی $y = \frac{(x+1)^2}{4}$ در انتروال $[0,1]$ و بین محور x واقع است، مساوی است

به:

$$\frac{7}{12} \quad (1) \quad 12 \quad (2) \quad \frac{5}{12} \quad (3) \quad \frac{1}{12} \quad (4)$$

33. حجم جسمی که از دوران مساحت بین منحنی $y = \sqrt{x}$ و خط $y = 2$ حول محور y به دست می

آید مساوی است به:

$$\frac{32}{5}\pi \quad (1) \quad \frac{1}{3}\pi \quad (2) \quad \frac{5}{3}\pi \quad (3) \quad \frac{2}{3}\pi \quad (4)$$

34. حجم جسمی که از دوران مساحت بین منحنی $y = x^3$ و خط $y = 1$ حول محور y بدست می آید

مساوی است به:

$$\frac{3\pi}{5} (1) \quad \frac{3\pi}{10} (2) \quad \frac{3\pi}{15} (3) \quad \frac{3\pi}{4} (4)$$

35. حجم جسمی را که از دوران منحنی $y = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)^2$ و خط $y = 1$ به حول محور y به دست می آید

عبارت است از:

$$\frac{2\pi}{3} (1) \quad \frac{3\pi}{2} (2) \quad \frac{2\pi}{5} (3) \quad \frac{5\pi}{2} (4)$$

36. حجم جسمی که از دوران منحنی $y = \left(\frac{x}{\sqrt{6}}\right)^2$ و خط $y = 1$ به حول محور y تشکیل می شود

مساوی است به:

$$2\pi (1) \quad 3\pi (2) \quad 5\pi (3) \quad 4\pi (4)$$

37. حجم جسم از دوران سطح تحت منحنی $y = \sin x$ در انتروال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ حول محور x عبارت است

از:

$$\frac{\pi^2}{4} (1) \quad \frac{\pi^2}{8} (2) \quad \frac{\pi^2}{2} (3) \quad \pi^2 (4)$$

38. طول قوس تابع $x = \sqrt{3}y + 5$ در انتروال $[9,10]$ مساوی است به:

$$2 (1) \quad 4 (2) \quad 3 (3) \quad 1 (4)$$

39. تغییرات متوسط تابع $f(x) = 10x^2 + 10$ در انتروال $[2,5]$ مساوی است به:

$$72 (1) \quad 70 (2) \quad 80 (3) \quad 90 (4)$$

40. تغییرات متوسط تابع $f(x) = 100x + 100$ در انتروال $[1,2]$ مساوی است به:

$$150 (1) \quad 100 (2) \quad 300 (3) \quad 1401 (4)$$

41. انتیگرال $\int \sin^3 x \, dx$ عبارت از:

$$-\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + c \quad (1)$$

$$-\cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x + c \quad (2)$$

$$\cos x + \frac{1}{3} \sin^3 x + c \quad (3)$$

$$\cos x - \sin^3 x + c \quad (4)$$

42. انتیگرال $\int \cos^2 x \, dx$ عبارت از:

$$\frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} x + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} x + c \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{2} x + c \quad (3)$$

$$\frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{2} x + c \quad (4)$$

43. هرگاه $\int x^2 \cdot f(x) dx = x^5 + 8x^3$ داده شده باشد قیمت $f'(1)$ عبارت از:

$$5 \quad (1)$$

$$8 \quad (2)$$

$$10 \quad (3)$$

$$12 \quad (4)$$

44. قیمت $\frac{d}{dx} \int (3^x + \ln x) dx$ عبارت از:

$$3^x - \ln x \quad (1)$$

$$3^x + \ln x \quad (2)$$

$$3x - \ln x \quad (3)$$

$$3x + \ln x \quad (4)$$

45. حاصل $\int [f(x)]^2 \cdot f'(x) dx$ عبارت از:

$$[f(x)]^3 + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} [f(x)]^3 + c \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} [f(x)]^3 + c \quad (3)$$

$$\frac{1}{4} [f(x)]^3 + c \quad (4)$$

46. هرگاه $F(x) = \int (x^2 - 1)e^{x^3-3x} dx$ و $F(\sqrt{3}) = 3$ باشد، در این صورت تابع $F(x)$ عبارت از:

$$e^{x^2-3x} + \frac{3}{4} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} e^{x^3-3x} + \frac{8}{3} \quad (2)$$

$$(x^2 - 1)e^{x^2-1} + \frac{9}{4} \quad (3)$$

$$\frac{1}{3} e^{x^3-3x} + \frac{11}{3} \quad (4)$$

47. هرگاه $f(x) = \frac{2x}{x^2+5}$ و $f(1) = \frac{1}{3}$ و $\int d\left(\frac{2x}{x^2+5}\right) = \frac{3}{7}$ باشد، قیمت $\sum x$ عبارت از:
- (1) 4 (2) $\frac{13}{3}$ (3) $\frac{14}{3}$ (4) 5
48. هرگاه $\int f(2x+1)dx = 3x^2 - 4x + 5$ داده شده باشد، در این صورت $f(5)$ عبارت از:
- (1) 6 (2) 7 (3) 8 (4) 10
49. هرگاه $f(x) = \int \sin^3 x \cdot \cos^5 x dx$ داده شده باشد، در این صورت $f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ عبارت از:
- (1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 0
50. قیمت عددی انتیگرال معین $\int_{-4}^1 |x+2| dx$ عبارت از:
- (1) $\frac{5}{2}$ (2) $\frac{7}{2}$ (3) $\frac{9}{2}$ (4) $\frac{13}{2}$
51. قیمت عددی انتیگرال معین $\int_{-3}^3 |x^2 - 4| dx$ عبارت از:
- (1) $\frac{46}{3}$ (2) $\frac{44}{3}$ (3) $\frac{38}{3}$ (4) $\frac{29}{3}$
52. هرگاه $f(x) \begin{cases} x^{-1}, & x < e \\ x, & x \geq e \end{cases}$ داده شده باشد، در این صورت $\int_1^3 f(x)dx$ عبارت از:
- (1) $\ln 3$ (2) $\ln 3 + \frac{9}{2}$ (3) $\frac{1}{2} - e$ (4) $11 - \frac{e^2}{2}$
53. قیمت a در انتیگرال معین $\int_0^1 (x^2 + 4x + a)dx = \frac{1}{3}$ عبارت از:
- (1) -3 (2) -2 (3) 2 (4) 3
54. هرگاه $\int_2^{16} f(x)dx = 20$ و $\int_6^{16} f(x)dx = 8$ باشد در این صورت $\int_6^2 f(x)dx$ عبارت از:
- (1) -6 (2) -12 (3) 6 (4) 12
55. قیمت عددی انتیگرال معین $\int_0^4 x^2 \cdot \operatorname{sgn}(2x)dx$ عبارت از:
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{10}{3}$ (3) $\frac{64}{3}$ (4) $\frac{37}{3}$

فصل چهاردهم

احصائیه

روش جمع آوری معلومات:

وقت که برای جمع آوری اطلاعات ، سوال می کنید ، سوال می کنید ، سوال را میتوان به شکل شفاهی یا کتبی پرسید. برخی اوقات بهتر است سوال نکنیم در این مورد به مشاهده آن پردازیم تا اطلاعات بهتر به دست آوریم و بعضی اوقات باید آزمایشی را انجام داد تا اطلاعات را جمع آوری نماییم.

مثال:

① اگر بخواهیم در آمد یک خانواده را بدانیم ، از چه روش بهتر است اطلاعات را جمع آوری نماییم یا از اطلاعاتی که از قبل ثبت شده ، استفاده نماییم؟

جواب: هرگاه در آمد کم باشد ، ممکن است شاگردان خوش نداشته باشد که معلومات دهد ، پس بهتر است بدون نام از آنها پرسیم.

② اگر بخواهیم نمره ریاضی شاگردان صنف ششم را بدانم ، از چه روش بهتر است اطلاعات را جمع نماییم؟

جواب: چون ممکن است شاگردان نمره واقعی خود را نگویند، پس بهتر است از دفاتر ثبت شده استفاده نمایم.

③ اگر بخواهیم تعداد خواهران و برادران شاگردان را بدانیم از چه روش اطلاعات را جمع آوری مینماییم؟

جواب: از پرسش شفاهی یا کتبی استفاده مینماییم.

④ اگر بخواهیم وزن نوزادان را بررسی کنیم، از چه روش بهتر است اطلاعات را جمع آوری نماییم؟

جواب: باید وزن نوزادان را اندازه گیری نماییم.

✓ جمع آوری داده ها را اطلاعات می گویند.

✓ روش های جمع آوری اطلاعات عبارت اند از: پرسش (شفاهی، مصاحبه) مشاهده و انجام آزمایش و یا استفاده از اطلاعات ثبت شده.

✓ جامعه احصائیوی یا به طور خلاصه جامعه، مجموعه یی از افراد و اشیای است که در باره اعضای آن اطلاعات مورد نیاز را دریافت می کنیم.

جامعه و نمونه:

در یک بررسی، مجموعه همه افراد و یا اشیای که از آن ها اطلاعات مورد نیاز را دریافت می کنیم جامعه می نامیم. هرگاه اطلاعات از همه اعضای جامعه به دست آوریم، این عمل را رأی پرسی همگانی می گویند. برخی اوقات به دلیل مشکلات چون کمبود وقت، مشکلات اقتصادی، امکان نداشتن دسترسی به همه افراد جامعه مجبور هستیم فقط اطلاعات بخشی از اعضای جامعه را به دست آوریم.

نمونه بخشی از جامعه است، یک نمونه از جامعه باید خاصیت و صفات کل جامعه را داشته باشد.

✓ بخشی از جامعه را نمونه می گویند.

• تعداد اعضای جامعه را اندازه جامعه و تعداد اعضای نمونه را اندازه نمونه می نامند.

✓ به خاطر شناخت جامعه، نمونه یی را که از آن جامعه انتخاب می کنیم، باید نمونه تصادفی باشد روش انتخاب نمونه به گونه یی باشد که:

○ انتخاب هر فرد به عنوان عضوی از نمونه امکان پذیر باشد.

○ پیش از انتخاب یک نمونه باید نتوانیم درباره مشخصات آن قضاوت کنیم.

مثال های از جامعه و موضوع مورد بررسی آن ها:

جامعه	موضوع مورد بررسی
➤ سابقه تدریس معلمان در هرات	معلمان ولایت هرات
➤ محصول پنبه سمت شمال	میزان تولید پنبه
➤ محصول زراعتی افغانستان	انواع محصولات افغانستان

مثال های از نمونه:

- ❖ یک مثلث برنج ، نمونه یی از یک بوجی برنج است.
- ❖ شاگردان صنف هفتم مکتب شما نمونه یی از شاگردان صنف هفتم افغانستان است.
- ❖ معلمان ریاضی کندز نمونه یی از معلمان کندز است.
- ❖ گندم نمونه یی از محصولات زراعتی افغانستان است.

نمونه تصادفی:

برای آن که یک نمونه ، نشان دهنده یک جامعه و دارای خصوصیات جامعه باشد باید خصوصیات ذیل را داشته باشد.

- ① امکان انتخاب هر فرد و یا شی به عنوان عضوی از نمونه امکان پذیر باشد.
- ② قبل از انتخاب نمونه نتوانیم در باره اعضای نمونه قضاوت کنیم.
- ③ تمام اعضای جامعه به عنوان یک نمونه سهم برابر داشته باشد.

مثال: کدام یک از نمونه های ذیل یک نمونه تصادفی است.

موضوع: بررسی سواد اهالی شهر

جامعه: اهالی شهر

نمونه اول: آن فرد که ساعت 5 بعد از ظهر از سرک عبور کند؟

جواب: این یک نمونه تصادفی است زیرا از قبل سواد فردی را که از سرک می گذرد نمی توان پیش بینی کرد.

نمونه دوم: دکتوران یک شفاخانه؟

جواب: این یک نمونه غیر تصادفی است زیرا از قبل می توان نتیجه را پیش بینی کرد و این نمونه نشان دهنده همه جامعه نیست.

متحول تصادفی و انواع آن:

اگر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد مطالعه از یک عضو جامعه به عضو دیگر قابل پیش بینی نباشد موضوع را متحول تصادفی می نامیم.

این دسته از متحول ها را بنام متحول کمی یا عددی می نامیم ، هرگاه در متحول کمی نتوانیم بین دو واحد پشت سر هم ، عددی پیدا کنیم آن را کمی مجزا می نامیم. اگر بین دو واحد پشت سر هم بتوانیم عددی را پیدا نماییم آن را کمی پیوسته می نامیم. در صورت که اطلاعات را توصیف و بدون عدد بیان کنیم متحول کیفی یا توصیفی می نامیم.

✓ اطلاعات جمع آوری شده از یک موضوع را متحول های تصادفی می گویند.

متحول های تصادفی دو نوع است.

❖ کمی یا عددی که قابل اندازه گیری باشد.

❖ کیفی یا غیر عددی که قابل اندازه گیری نمی باشد.

متحول های کمی دو نوع است.

A . پیوسته: که بین هر دو مقدار آن میتوان مقدار دیگر را دریافت کرد.

B . مجزا: که پیوسته نباشد.

مثال:

متحول تصادفی با شمارش	متحول تصادفی با اندازه گیری	متحول تصادفی با توصیف
کمی مجزا	کمی پیوسته	کیفی
① تعداد اعضای خانواده	① طول قد شاگردان	① رنگ چشم شاگردان
② تعداد صنف های مکتب	② درجه حرارت شهر شما	② میزان سواد کارگران
③ تعداد موتر های که از سرک می گذرد	③ وزن گوسفندان	③ موسیقی مورد علاقه مردم

جدول کثرت *Frequency Table*:

در یک بررسی ، داتا های جمع آوری شده را که روی آن هیچ عمل انجام نشده باشد ، داتای خام می نامند. در هر بررسی با منظم کردن داتاها جدولی تشکیل نموده که آن را جدول کثرت می نامیم. برخی اوقات یک جدول را به شکل سطری ترتیب نموده و مقدار دفعات را که یک داتا تکرار شده است ، کثرت آن داتا می نامیم.

مجموع کثرت داتاها در یک نمونه برابر با کل داتاها یا تعداد اعضای نمونه می باشد، اگر f_1 کثرت داتای اول ، f_2 کثرت داتای دوم f_n کثرت داتای n -ام و تعداد کل داتاها مساوی به n باشد پس:

$$n = f_1 + f_2 + \dots + f_n$$

اطلاعات جمع آوری شده را داتا *Data* می گویم.

✓ اگر $x_1, x_2, \dots, x_n$ تعداد داده های یک موضوع باشد ، تعداد دفعاتی که یک داده تکرار می شود ، به نام کثرت آن داده ها می گویند ، و معمولاً آن را به $f_1, f_2, \dots, f_n$ نشان می دهند.

مثال:

تعداد اعضای خانواده	1	2	3	4	5	6	7	8	مجموع
تعداد خانواده	4	7	9	8	6	3	2	1	40

جدول بالا نشان می دهد که تعداد 6 خانواده 5 نفر عضو داشته و تعداد یک خانواده 8 نفر عضو دارد.

گراف تصویری:

گاهی برای دانستن اطلاعات داده شده از سمبول ها و اشکال استفاده مینماییم ، این روش را به نام گراف تصویری می گویند. در صورت که کثرت داده ها زیاد باشد ، از مقیاس استفاده مینماییم.

_____ Mode :

داتایی که بیشترین کثرت را دارد *Mode* می نامیم که میتوان در موضوعات رأی گیری ها ، فروش کالا و غیر استفاده نمود.

اوسط Mean :

اوسط داده ها را میتوان از تقسیم حاصل جمع داده ها بر تعداد داده ها پیدا کرد.

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

جدول کثرت داتا های گسسته:

بعضی اوقات وقت تعداد داتاها زیاد یا کثرت بسیاری از داتاها صفر یا عدد کم باشد ، جدول کثرت مجزا کمک زیادی نموده ، یا تشکیل آن خیلی مشکل است ، بنابراین در این حالت از جدول کثرت به شکل دسته بندی استفاده می کنیم، کثرت هر دسته نشان می دهند که در دسته چند داتا وجود دارد ، ولی نمیتوانیم بگوییم آن داتا ها کدام اند.

خواص و اجزای جدول کثرت:

کم ترین مقدار که میتواند در یک دسته قرار گیرد ، سرحد پائینی و بیشترین مقدار را که میتوان در یک دسته قرار گیرد ، سرحد بالایی می نامیم. تعداد داتا های که می تواند در یک دسته قرار گیرد به نام طول دسته ، نامگذاری نموده اند، برای پیدا کردن طول دسته کافی است تفاوت بین دو سرحد بالایی دو دسته متواتر را دریافت مینماییم.

کثرت تجمعی:

مجموع کثرت مطلق هر دسته و کثرت دسته های قبل از آن را کثرت تجمعی آن دسته می نامند، و کثرت آخرین دسته برابر است با تعداد کل داتا ها.

یادداشت:

- ✚ برای یکسان نشان دادن هر دسته از عددی که اوسط هر دسته است استفاده می نماییم.
- ✚ تکرار هر داتا را کثرت مطلق آن داتا در جدول کثرت می گوئیم.
- ✚ در هر دسته بندی داتا ها تمام داتاهای واقع در یک دسته را برابر مرکز آن دسته در نظر می گیریم.
- ✚ مرکز دسته ها به تعداد اعضای که در آن دسته قرار دارند تکرار می شود یعنی کثرت مرکز دسته ها برابر تعداد اعضای است که در آن دسته قرار گرفته و این کثرت را کثرت مطلق آن دسته می گوئیم.

کثرت نسبی:

در بعضی حالات برای مقایسه دو وضعیت نمیتوان کثرت های مطلق را به هم مقایسه کرد. در چنین حالت از کثرت مطلق استفاده مینماییم. مقدار این نسبت را کثرت نسبی می گوئیم. برای مقایسه بهتر، این عدد را با فیصدی نشان کثرت کل داتا می دهیم و فیصد کثرت نسبی می نامیم.

:Note

- ① آن دسته که *Data* معلوم نمی شود و یا هم کثرت مطلق ندارد قیمت کثرت نسبی مساوی به صفر است.
- ② به هر دسته (طبقه) مجموع کثرت نسبی در یک دسته یا طبقه مساوی به یک است.
- ③ قیمت کثرت نسبی یک طبقه همیشه مساوی به یک عدد مثبت که از 1 کوچک است میگردد.

گراف میله ای (گراف نواری):

یک گراف میله ای باید دارای عنوان، مقیاس و مشخصه محور باشد، در گراف میله ای محل قرار گرفتن داتاها مهم نیست، طول میله ها نشان دهنده کثرت داتاها می باشد. از گراف میله ای بیشتر برای ترسیم متحول مجزا و کیفی استفاده می کند، در ترسیم گراف میله ای ترتیب قرار گرفتن میله ها اهمیت ندارد، آن چه که در این گراف مهم است، کثرت داتاها است.

گراف خط منکسر:

اگر اطلاعات جمع آوری شده را توسط نقاط در مستوی مختصات ترسیم نموده و این نقاط را به کمک خطوط منکسر با هم وصل نماییم، گراف که توسط نقاط وصل شده به دست می آید به نام گراف خط منکسر یاد می شود.

اوسط داتاهای گسسته با کثرت:

برای پیدا کردن اوسط داتاها در صورت تکرار داتاها میتوان به جای جمع داتاها از ضرب کثرت در داتاها استفاده نمود اگر در حالت کل یک داتا را به X و کثرت آن به f نشان دهیم، این حاصل ضرب برابر $f \cdot X$ خواهد بود. اگر داتا اول و کثرت آن را به f_1 و x_1 ، داتا دوم و کثرت آن را به f_2 و x_2 و داتا آخر را به f_n و کثرت آن را به f_n نشان دهیم، اوسط داتاها عبارت است از:

$$\bar{X} = \frac{f_1x_1+f_2x_2+\dots+f_nx_n}{f_1+f_2+\dots+f_n} = \frac{f_1x_1+f_2x_2+\dots+f_nx_n}{n}$$

اوسط داتاهای پیوسته:

در داتاهای پیوسته، مرکز دسته ها را در کثرت های آن ضرب و با هم جمع کرده و پس از آن بر مجموع کثرت (که همان تعداد داتاها است) تقسیم کرد.

$$\bar{X} = \frac{f_1x_1+f_2x_2+\dots+f_nx_n}{f_1+f_2+\dots+f_n}$$

روش دسته بندی داتاها:

برای دسته بندی داتاها مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم.

- ① وسعت بیشترین مقدار و کم ترین مقدار داتاها را به دست آورید.
- ② این وسعت را بر تعداد دسته ها تقسیم و طول دسته را به دست آورید در صورت که حاصل عددی طبیعی نباشد، میتوان آن را به بالا گرد (*Round Off*) کرد.
- ③ دسته ها را به این مقدار تشکیل دهید.

مراحل دسته بندی داتا:

- A. ساحه تحول: وسعت بين بیشترین و کمترین داتا.
- B. طول دسته: نسبت ساحه تحول بر تعداد دسته ها.
- C. کثرت دسته: تعداد داتاهایی که در هر دسته قرار دارد.
- D. کثرت دسته: محاسبه وسط هر دسته.

دسته بندی داتاهای پیوسته:

در دسته بندی اگر متحول ها پیوسته باشد ، سرحد بالایی دسته بعدی برابر سرحد پایانی دسته قبلی است. در صورتیکه داتا برابر به سرحد بالایی دسته باشد آن داتا متعلق به دسته بعدی می باشد.

اوسط وزنی:

اگر داتاها با ضریب خاص بیان شده باشند ، به این معنا است که تأثیر داتاها یکسان نبوده ، بسته گی به ضریب آن دارد ، در این حالت در جدول کثرت ضریب ها به عنوان کثرت آن داتا به حساب آمده و به w نشان داده می شوند ، اوسط به دست آمده در این حالت را اوسط وزنی می نامیم.

$$\bar{x} = \frac{w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}$$

داتا ها	x_1	x_2		x_n
ضریب (وزن)	w_1	w_2		w_n

گراف مستطیلی Histogram:

در نمایش داتاهای پیوسته ، از گراف مستطیلی استفاده می کنیم، در این گراف عرض مستطیل ها برابر طول دسته ها است در گراف مستطیلی ، مساحت های مستطیل نشان دهنده کثرت هر دسته بوده ، و با یکدیگر خوبتر مقایسه می شوند، مساحت مستطیل ها کثرت دسته ها را نشان می دهند. اگر طول دسته ها با هم برابر باشند ، میتوان عوض مساحت ها کثرت را مستقیماً مقایسه نماییم ، در این وضعیت محور عمودی کثرت را نشان می دهد.

✓ هتوگرام یا گراف مستطیلی عبارت از گراف است که در آن توزیع کثرت توسط مستطیل ها نشان داده می شود. عرض مستطیل یا قاعده مستطیل برابر به طول دسته و طول مستطیل یا ارتفاع مستطیل برابر به کثرت دسته است. مساحت هر مستطیل برابر به حاصل ضرب طول دسته و کثرت دسته می باشد ، در گراف مستطیلی ، مستطیل ها با هم پیوسته و از متحولین پیوسته برای نشان دادن گراف استفاده می شود.

گراف دایره یی:

نشان دادن داتاها به کمک دایره را بنام گراف دایره یی میگویند. در گراف دایره یی ابتدا نسبت کثرت هر دسته را بر تعداد کل داتاها تقسیم و ضرب در 360° که زاویه مرکزی همان دسته را نشان می دهد، مینماییم.

$$360^\circ \cdot \frac{\text{کثرت داتاها}}{\text{تعداد کل داتاها}} = \text{کثرت بر حسب درجه}$$

✓ دایره یی را به شعاع اختیاری به وسیله زاویه مرکزی به n قسمت تقسیم می کنیم به قسم که اندازه زاویه مرکزی هر یک از این قسمت ها متناسب به کثرت آن قسمت باشد، در این صورت زاویه مرکزی نظر به دسته اول عبارت است از:

$$360^\circ \cdot \frac{\text{کثرت داتاها}}{\text{تعداد کل داتاها}} = \text{کثرت بر حسب درجه}$$

میانۀ Median:

پس از مرتب کردن داده ها مقداری را که تعداد داتاها بعد از آن با تعداد داتاها قبل از آن برابر باشد میانه می گوئیم. اگر تعداد داتاها تاق باشد ، میانه خود یکی از داتاها مابینی است ، ولی اگر تعداد داتا جفت باشد ، میانه وسط دو داتا مابینی است.

ساحه تحول Range:

طول فاصله یی که متحول در آن امکان تغییر را دارد ، به نام ساحه تحول یاد می کند. این معیار ، وسعت بین بیشترین و کم ترین داتا را نشان می دهد ، متوجه باید بود که بزرگی ساحه تحول نشان دهنده فرق یا پراگنده گی زیاد در جامعه است ، هر اندازه این فرق کم تر باشد پراگندگی افراد کم تر است. افراد جامعه از لحاظ این خصوصیت به هم نزدیکتر اند ، اگر ساحه تحول صفر باشد ، خصوصیت مورد بررسی همه افراد با هم برابر و یکسان اند در آن حالت جامعه را یک جامعه متجانس می نامیم.

✓ ساحه تحول عبارت از تفاوت کوچکترین داتا از بزرگترین داتا در مجموع داتاها می باشد یا به عبارت دیگر ساحه تحول عبارت است از طول فاصله است که متحول در آن ساحه تغییر مینماید.

اوسط انحراف *Average deriation*:

وسعت که بین داتاها و اوسط موجود است آن را انحراف از اوسط می گویند. مجموع انحراف از اوسط داتاها همیشه صفر است، به این دلیل برای بررسی داتاها از قیمت مطلقه انحراف ها استفاده می کنیم. اگر قیمت مطلق همه انحراف ها را جمع نموده و تقسیم بر تعداد داتاها نماییم اوسط انحراف گفته می شود.

$$\text{اوسط انحراف} = \frac{|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

هر چه انحراف اوسط عدد بزرگتر باشد، به همان اندازه پراگندگی داتاها از اوسط بیشتر است.

✓ تفاضل اوسط از هر داتا را انحراف از اوسط گویند.

گراف چند ضلعی کثرت:

در گراف چند ضلعی، مرکز هر دسته روی محور افقی و کثرت مطلق یا کثرت نسبی هر یک از دسته ها روی محور عمودی نشان داده می شود. متقابل با مرکز هر دسته و کثرت آن یک نقطه در مستوی مشخص میگردد که عرض آن مرکز دسته و طول آن برابر با کثرت آن دسته است. به تعداد دسته های جدول در مستوی سیستم مختصات نقطه به وجود می آید. اگر به نقاط مذکور دو نقطه اختیاری دیگر $(x_1 - c, 0)$ و $(x_n + c, 0)$ را در اول و آخر دسته ها اضافه کنیم، طوریکه c وسعت هر صنف (سرحد بالایی منفی سرحد پائینی صنف) است از اتصال این نقاط به یکدیگر، یک گراف حاصل می شود که آن را گراف چند ضلعی کثرت می نامند.

✓ هر یک از راس های گراف چند ضلعی کثرت در نقاط مابینی ضلع بالایی یک مستطیل مربوطه به جدول کثرت مورد مطالعه قرار دارد.

✓ مساحت سطح زیر گراف چند ضلعی کثرت و مساحت گراف مستطیلی با هم برابر است.

✓ گراف چند ضلعی کثرت نسبی بیش تر برای دیتا *Data* پیوسته یا متصل به کار می رود.

✓ جوهره های مرتب نقاطی را که عرض آن ها مرکز دسته ها و طول آن ها برابر کثرت همان دسته باشد با هم

وصل می کنیم گراف چند ضلعی کثرت به وجود می آید، در گراف چند ضلعی کثرت دو نقطه با کثرت

صفر به ابتدا و انتهای دسته ها اضافه می شود تا گراف چند ضلعی کثرت به محور x متصل شود.

گراف ساقه و برگ:

برای رسم گراف ساقه و برگ از اعداد استفاده می شود. دیتای احصائیوی را به صورت اعداد در آورده و پس از این اعداد گراف ساقه و برگ را تشکیل می دهیم. این گراف برای دیتای که تفاوت کوچکترین و بزرگترین دیتا از نظر تعداد رقم ها اندک باشد ، مناسب است.

مثلاً: در عدد 37 ، عدد 3 ساقه و 7 برگ می باشد. به خاطر نمایش گراف ساقه و برگ عدد 8.3 را به صورت 083 عدد 11.2 را به صورت 112 و 12 را به صورت 120 می نویسیم.

چارک ها:

عددی که جامعه مرتب را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند ، میانه نامیده می شود. حال اعدادی را در نظر بگیرید که جامعه مرتب را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنند. این اعداد را با Q_1 ، Q_2 و Q_3 نشان می دهند و آن ها را به ترتیب چارک های اول تا سوم می نامند، واضح است که Q_2 میانه است.

✓ اعداد که دیتای مرتب را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنند آن ها را چارک های اول ، دوم و سوم می نامند ، و به Q_1 ، Q_2 و Q_3 نشان می دهند.

- چارک اول مقداری است که 25% دیتای جامعه پائین تر آن و 75% بالاتر از آن قرار می گیرد.
- چارک دوم مقداری است که 50% دیتای جامعه پائین تر از آن و 50% دیتا بالاتر از آن قرار می گیرد.
- چارک سوم مقداری است که 75% دیتای جامعه پائین تر از آن و 25% دیتا بالاتر از آن واقع است.
- اگر دیتا را به صورت صعودی مرتب کنیم میانه دیتا مساوی به Q_2 و میانه نیمه اول دیتا مساوی به Q_1 و میانه دوم دیتا مساوی به Q_3 است.

محاسبه چارک ها:

① دیتای مرتب شده را از 1 تا n شماره گذاری مینماییم.

② محل P - ام ($P = 1,2,3$) را با استفاده از رابطه ذیل به دست می آوریم.

$$C_{QP} = \frac{P.n}{4} + \frac{1}{2}$$

③ با استفاده از محل چارک ، مقدار چارک ها را تعیین مینماییم.

گراف صندوقچه یی:


گراف تصویری است که پراگندگی دیتا را نسبت به گراف های دیگر بهتر نشان می دهد. این گراف دیتا را بر اساس مقادیر ذیل نمایش می دهند.

- ① کمترین دیتا ② چارک اول ③ میانه
④ چارک سوم ⑤ بیش ترین دیتا

گراف صندوقچه یی نشان دهنده چارک ها ، حد اقل و حد اکثر دیتا است.


مراحل تهیه گراف صندوقچه یی:

- ① کوچکترین دیتا ② بیش ترین دیتا ③ میانه
④ چارک اول ⑤ چارک سوم ⑥ ترسیم گراف




مقایسه شاخص های مرکزی توسط منحنی نارمل:

اگر منحنی نارمل متناظر باشد ، در این صورت موقعیت میانه و اوسط در منحنی نارمل یکسان می باشد، و چون منحنی نارمل نقطه اعظمی دارد ، بنابر این موقعیت مود آن نیز ، برابر اوسط و میانه است.



اگر منحنی نارمل متناظر نباشد در این صورت داریم که:



اگر اوسط و میانه مساوی باشد، تعداد دیتای که قبل و بعد از اوسط و میانه قرار دارند مساوی باشند، اگر اوسط در سمت چپ میانه واقع باشد، تعداد دیتای که در سمت راست اوسط قرار دارند، بیشتر از تعداد دیتای اند که در سمت چپ اوسط قرار دارند. مانند شکل (a).

اگر اوسط در سمت راست میانه واقع باشد، تعداد دیتای که در سمت راست اوسط قرار دارند کمتر از تعداد دیتای اند که در سمت چپ اوسط قرار گرفته. مانند شکل (b).

انحراف چارک ها :

ساحه تحول در بعضی مواقع به علت موجودیت دو مقدار خیلی کوچک و خیلی بزرگ در جامعه ممکن است تعبیر های نامناسب از جامعه را ارائه کند، بنابر این در همچو مواقع از شاخص دیگری به نام انحراف چارک ها که بتواند ساحه تحول جامعه را بهتر مشخص نماید استفاده مینماییم.

اگر Q_1 و Q_3 به ترتیب چارک اول و سوم مجموعه ای از دیتا باشند، انحراف چارک ها را به Q نمایش داده و قرار ذیل تعریف می کند.

$$Q = Q_3 - Q_1$$

انحراف چارک ها یکی از شاخص های نشان دهنده پراگندگی دیتا است، زیرا از روی تعریف چارک اول و سوم بر می آید که 50% جامعه در فاصله $Q_3 - Q_1$ قرار دارند، هر مقدار این فاصله کوچکتر باشد، دیتا جمع تر و به عبارت دیگر پراگندگی آن کم تر است.

گاهی انحراف چارک ها را به صورت $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$ نیز تعریف می کند، و آن را نیم چارک می نامند.

واریانس *Variance* :

شاخص های پراگندگی، اندازه هایی هستند که وضع پراگندگی دیتا را نسبت به یکدیگر و نسبت به اوسط مشخص می کنند. واریانس یکی از مهم ترین شاخص های پراگندگی است که با S^2 نشان داده می شود و از رابطه ذیل به دست می آید.

$$S^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

محاسبه واریانس از جدول کثرت توسط فرمول S^2 به دست می آید.

x_i : مرکز دسته ها

مراحل محاسبه واریانس:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1) \text{ اوسط دیتا را دریافت می نماییم.}$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2 \quad (2) \text{ مجموع مربع های انحراف ها یعنی:}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (3) \text{ مجموع فوق را بر تعداد اعضای مجموعه ، } n \text{ تقسیم نموده و مساوی به } S^2 \text{ نشان می دهیم.}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

برخی اوقات برای محاسبه واریانس از فرمول ذیل نیز استفاده مینماییم.

انحراف معیاری:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

جذر مربع واریانس را به S نشان می دهند و آن را انحراف معیاری می گویند.

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i}}$$

محاسبه انحراف معیاری از جدول کثرت توسط فرمول ذیل به دست می آید.

ضریب تغییرات *Coefficient Variations*:

ضریب تغییرات یا پراگندگی نسبی موارد استعمال زیاد دارد که واریانس و انحراف معیاری فاقد آن ها است. یکی از کاربرد های آن مقایسه نمودن دو جامعه احصائیوی نا متجانس و نا همگون است. ضریب تغییرات که به سمبول CV نشان داده می شود ، عبارت از خارج قسمت انحراف معیاری بر اوسط که عدد مطلق (بدون واحد) است .

یعنی:

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \quad \text{یا} \quad \frac{\text{انحراف معیاری}}{\text{اوسط}} = \text{ضریب تغییرات}$$


ضریب تغییرات را اکثراً به صورت فیصدی می نویسند. اگر ضریب تغییرات به 100 ضرب بشود ضریب تحول بدست می آید.

$$CV\% = 100 \frac{S}{\bar{X}} \quad \text{ضریب تحول}$$

- ❖ ضریب تغییرات فقط برای *data* مثبت تعریف می شود.
- ❖ اگر همه *data* با هم برابر باشند ، ضریب تغییرات صفر است.
- ❖ اگر همه دیتا را در یک عدد مثبت ضرب کنیم ضریب تغییرات تغییر نمی کند.
- ❖ اگر به همه دیتا یک عدد مثبت را اضافه کنیم ، ضریب تغییرات جدید کوچکتر از ضریب تغییرات دیتا اولیه است.

پراگندگی در منحنی نورمال *Normal Curve*:

منحنی نورمال وسیله مهم برای توصیف از مجموع های آماری است. در توزیع نورمال در حالت که اداره ها دارای توزیعی نورمال و منحنی کثرت متناظر باشد ، واریانس نقشی عمده یی دارد. در واقع با مشخص بودن دو پارامتر اوسط و انحراف معیاری در توزیع نورمال ، این توزیع در کل مشخص خواهد بود و محاسبه هر نوع شاخص مساعد است.



شاخص های شکل توزیع نورمال:

شاخص های شکل توزیع را میتوان در دو حالت مطالعه نمود.

① شاخص خمیدگی *Skewness*:

توزیع که در اطراف اوسط متناظر نباشد خمیدگی گفته می شود این شاخص را توسط دو ضریب زیر نشان می دهند.

I. **ضریب خمیدگی:** شاخص است که برای تعیین میزان خمیدگی به کار می رود.

$$\alpha_3 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3}{S^3}$$

اگر $\alpha_3 = 0$ توزیع متناظر، اگر $\alpha_3 > 0$ توزیع خمیدگی مثبت و اگر $\alpha_3 < 0$ توزیع دارای خمیدگی منفی است.

II. **ضریب خمیدگی پیرسون:** ضریب پیرسون به صورت زیر تعریف می شود.

$$Sk_{(p)} = \frac{3(\bar{x} - med)}{S}$$

در توزیع متناظر ضریب خمیدگی پیرسون برابر صفر است، کمیت های مثبت و منفی ضریب خمیدگی پیرسون به ترتیب نشان دهنده خمیدگی مثبت و یا منفی توزیع است.

② شاخص کشیدگی *Kurtosis*:

شاخص کشیدگی نشان دهنده آن است که یک توزیع چه وقت دارای اوج و چه وقت دارای پخشی می باشد.

ضریب کشیدگی معمولترین شاخص است که برای اندازه گیری کشیدگی به کار رفته به صورت ذیل تعریف می

$$\alpha_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^4}{S^4} \text{ گردد.}$$

$$\frac{1}{n} \sum f_i (x_i - \bar{x})^4 \text{ در صورت جدول کثرت فورمول شاخص کشیدگی است.}$$

شاخص کشیدگی بستگی به موقعیت و پراگندگی توزیع ندارد، این شاخص برای مقایسه مورد استفاده قرار می گیرد.

جامعه های چند متحوله:

یکی از اهداف عمده در اکثر تحقیقات احصائیوی پیش بینی و پیش گویی نمودن و تعیین یک متحول از جنس متحول دیگر است، زمان که ارتباط بین دو شی را مورد بررسی قرار می دهیم منظور از جامعه دو متحوله می باشد. مانند رابطه بین حجم و فشار گاز، ارتباط بین صحت و میزان مرگ و میر رابطه بین سطح کشت و مقدار محصول، رابطه بین شعاع دایره و مساحت آن.

برای سهولت، معمولاً ارتباط بین دو یا چندین متحول را به وسیله معادلات ریاضی ارائه می دارند. در قدم اول به منظور تشخیص و تشکیل معادلات مورد ضرورت معلومات لازم جمع آوری می گردد، در قدم دوم معلومات جمع آوری شده به شکل ارزش متحول های مورد مطالعه در یک مستوی مختصات قایم، نقطه گذاری می گردد، که از وصل این نقاط به دست می آید یک گراف را به ما می دهد.

گراف پراگندگی *Scater diagram*:

برای ترسیم نمودن گراف پراکنش (پراگندگی) داده ها را به صورت جوهره های مرتب ارائه و توسط نقاط در یک مستوی محور های مختصات نمایش می دهیم. گراف پراکنش می تواند سه نوع اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد.

- نمونه یی که نشان دهنده نوعی ارتباط بین مشاهدات باشد موجود است یا نه؟
- در صورت موجودیت نوعی ارتباط آیا ارتباط خطی است یا غیر خطی؟
- در صورت که رابطه خطی باشد نوع ارتباط چگونه است؟

همبسته گی و ضریب همبسته گی:

همبسته گی به سنجش و دریافت درجه ارتباط بین متحول ها می باشد، ارتباط بین متحول ها می تواند به صورت خطی توسط یک خط مستقیم و یا به صورت غیر خطی به وسیله یک منحنی ارائه می گردد.

همبسته گی عموماً به دو صورت مثبت و منفی بین دو متحول بیان می شود، اگر اندازه دو متحول در یک جهت تغییر کند یعنی x و y هر دو بزرگ یا هر دو کوچک شوند همبسته گی مثبت (خط مستقیم) است.

بهترین معیاری تشخیص وجود همبسته گی یا عدم آن و حتی نوع، جهت و میزان همبسته گی خط، ضریب همبسته گی است که توسط فورمول ذیل ارائه می گردد.

$$r = \frac{\frac{1}{n} \sum xy - (\bar{x})(\bar{y})}{S_x \cdot S_y}$$

S_x : انحراف معیاری x

S_y : انحراف معیاری y

اگر نقاط به شکل یک خط مستقیم هر قدر که نزدیکتر باشد، خطای متحول y نظر به x کمتر است، و برعکس هر قدر که از خط دورتر باشند، خطای y بیشتر است.

خط رگرسیون: Regression

رگرسیون (تخمین)، سنجش و دریافت ارزش یک متحول تابع نظر به ارزش یک یا چند متحول مستقل می باشد. معادله که ارتباط بین متحول ها را افاده می نماید به نام معادله یی رگرسیون یا معادله سنجش یاد می شود و این معادله را میتوان به روش کمترین مربعات محاسبه و ضرایب a و b را به کمک این روش به صورت ذیل به دست آورد.

$$(y = ax + b)$$

r : ضریب همبسته گی

$$a = r \frac{S_y}{S_x}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

✓ بهترین خط مناسب خطی است که مجموع مربعات خط هایش از بقیه خطوط ممکن دیگر کمتر باشد، چنین خط (خط رگرسیون) می گویند.

$$\begin{aligned} \text{مجموع توان های خط های دوم} &= \sum (y - \bar{y})^2 = \sum [y - (ax + b)]^2 = \sum (y - b - ax)^2 \\ &= (ax_1 + b - y_1)^2 + (ax_2 + b - y_2)^2 + \dots \end{aligned}$$

نتیجه: خط رگرسیون وسیله یا ابزاری است برای پیش بینی مقدار یک متحول بر حسب متحول دیگر که به آن وابسته است مورد استفاده قرار می گیرد.

توزیع تابع احتمال:


توزیع تابع احتمال که در احصائیه و احتمالات مورد بحث قرار می گیرد عبارت از تابع است که ناحیه تعریف آن فضای نمونه و ناحیه قیمت های آن اعداد حقیقی است.

⊕ اگر $P(x = x_i) = f(x_i)$ داشته باشیم در این صورت جوهره های مرتب $[x_1, f(x_1)], [x_2, f(x_2)], \dots, [x_n, f(x_n)]$ را تابع احتمال مجزا (گسسته) می گویند.

⊕ تابع احتمال پیوسته و تجمعی را میتوان به شکل $F(x) = P(x \leq x)$ ارائه نمود.

⊕ اگر $f(x)$ تابع احتمال و x متحول تصادفی باشد در این صورت احتمال اینکه x بین k_1 و k_2 قرار گیرد برابر است به:

$$P(k_1 \leq x \leq k_2) = \int_{k_1}^{k_2} f(x) dx$$



⊕ اگر x متحول تصادفی پیوسته و $k_1 < k_2$ باشد در این صورت:

$$P(k_1 \leq x \leq k_2) = F(k_2) - F(k_1)$$

⊕ اگر x متحول تصادفی گسسته باشد در این صورت اوسط *Expected Value* یک متحول تصادفی x که $E(x)$ نشان داده می شود برابر است به:

$$E(x) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \dots + x_n f(x_n) = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i)$$

$E(x)$ اوسط x نامیده می شود که آن را به $\bar{x}$ نمایش می دهیم و همچنان اگر x متحول تصادفی گسسته باشد در این صورت وریانس که به شکل S^2 نمایش داده می شود مساویست به:

$$S^2 = \sum_{i=1}^n [x_i - E(x_i)]^2 f(x_i)$$

✓ فرق بین متحول تصادفی در احصائیه و احتمالات با متحول در الجبر این است که متحول احصائیه و احتمالات از فضای نمونه و متحول الجبر از اعداد حقیقی انتخاب می شود.

✓ متحول تصادفی اصطلاح است که به عنوان یک تابع در احصائیه و احتمالات مورد استفاده قرار می گیرد.


- ✓ تابع احتمال یک متحول تصادفی گسسته ، تابعی است که ناحیه تعریف آن اعدادیست که متحول تصادفی می تواند اختیار کند و ناحیه قیمت های آن شامل احتمال های مربوط به عناصر ناحیه تعریف است.
- ✓ تابع احتمال تجمعی و پیوسته تابع است که ناحیه تعریف آن شامل آن اعدادیست که متحول تصادفی X اختیار می کند و ناحیه قیمت آن هم تصاویر $f(x)$ می باشد.

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i) = \bar{x} \dots$$

اوسط

$$V(x) = S^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - E(x_i))^2 \cdot f(x_i) \dots$$

وریانس تصادفی گسسته



آزمایش برنولی و توزیع دو جمله یی:

توزیع احتمال دو جمله یی یک توزیع گسسته است که برای توصیف حوادث مختلف به کار می رود ، بیشترین اتفاقاتی که در دنیا رخ می دهد دو حالت دارد. آزمایش برنولی یک آزمایش تصادفی است که نتیجه آن را میتوان به یکی از دو حالت کامیابی و ناکامی دسته بندی کرد.

توزیع برنولی را میتوان به صورت $P(x = m) = P^m (1 - P)^{1-m} = P^m \cdot q^{1-m}$ نشان داد. در حالیکه P احتمال کامیابی و $q = 1 - P$ احتمال عدم کامیابی می باشد. هرگاه یک آزمایش را n دفعه تکرار کنیم یک ترادف به دست می آید طوری که اگر احتمال کامیابی هر آزمایش P و احتمال ناکامی آن q باشد در این صورت احتمال m کامیابی در این n آزمایش عبارت از:

$$P(x \leq m) = \binom{n}{m} P^m \cdot q^{n-m} \quad 0 \leq m \leq n$$

رابطه فوق را میتوان به صورت $B(m, n, P)$ نیز ارائه نمود.

اوسط توزیع دو جمله یی $\bar{x} = n \cdot P$ و انحراف معیاری این توزیع $S = \sqrt{n \cdot P \cdot q}$ است.

توزیع احتمال پواسن:

فورمول پواسن می تواند برای محاسبه تقریبی m اشکال کامیابی از n آزمایش وقت که n بزرگ و احتمال کامیابی P کوچک باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

فورمول پواسن برای محاسبه تقریبی احتمال m اشکال در n آزمایش عبارت از:

$$P(x = m) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^m}{m!}$$

$$\bar{x} = n \cdot P, e = 2.718182$$

زمان که در توزیع دو جمله یی قیمت $P \rightarrow 0$ و $n \rightarrow \infty$ از توزیع احتمال پواسن استفاده می گردد.

یادداشت: فورمول پواسن را برای محاسبه احتمال تعداد مراجعات در زمان مشخص میتوان به صورت ذیل ارائه کرد.

λ : اوسط تعداد مراجعه ها در واحد زمان

t : نسبت زمان عنوان شده به کل زمان

$$P(x = m) = \frac{e^{-\lambda t} \cdot (\lambda \cdot t)^m}{m!}$$

توزیع نورمال:

منحنی های توزیع نورمال می تواند به چهار طریق با یکدیگر تفاوت داشته باشد. شکل ریاضی معادل توزیع نورمال که نشان دهنده تابع توزیع احتمال آن $f(x)$ است به صورت زیر نوشته می شود.

$$f(x) = N(x, \bar{x}, S) \quad S: \text{انحراف معیاری}$$

$$f(x) = \frac{1}{S\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{S}\right)^2} \quad f(x): \text{ارتفاع منحنی}$$

توزیع نورمال از جمله توزیع های پیوسته است، اختلاف در اندازه گیری ها را میتوان توسط توزیع به خوب تقرب نمود.

✓ شکل توزیع نورمال متناظر و شبه زنگوله است، در توزیع نورمال شاخص های مرکزی با هم برابر اند و متحول

های تصادفی پیوسته دارای ناحیه تعریف محدود می باشد، تابع احتمال آن:

$$f(x) = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{\delta}\right)^2} \quad \mu: \text{اوسط جامعه}$$

δ : انحراف معیار جامعه

مساحت تحت منحنی توزیع نورمال و استاندارد کردن آن:

برای محاسبه مساحت تحت منحنی تابع احتمال $f(x)$ در فاصله های a الی b میتوان از انتیگرال زیر استفاده نمود.

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{a}{\delta\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\delta}\right)^2}$$

✓ توسط رابطه $Z = \frac{x-\mu}{\delta}$ میتوان هر مجموعهٔ احصائیوی را که دارای توزیع نورمال است به نورمال معیاری استاندارد تبدیل کرد.

Z : متحول معیاری نورمال و منحنی را بنام منحنی نورمال معیاری یا منحنی احتمال نورمال یاد مینماید.
 بخاطر داشته باشید که متحول معیاری شده Z همیشه دارای اوسط صفر و انحراف معیاری 1 می باشد. همچنان مساحت بین منحنی نورمال و محور افقی برابر به واحد انتخاب شده می باشد. به صورت ساده:

$$f(z_1 < z < z_2) = \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{S\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \int_{z_1}^{z_2} N(z, 0, 1) dz$$

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{S}$$

نمونه گیری: نمونه به دو دسته تقسیم می شود ، نمونه ساده و نمونه تصادفی.

روش های نمونه گیری:

نمونه گیری تصادفی: عناصر جامعه همه برای انتخاب شدن هم چانس باشد.

نمونه گیری سیستماتیک: عناصر جامعه به صورت منظم شماره (Code) گذاری شده باشد.

نمونه گیری طبقه یی: جامعه به گروه های متجانس تقسیم شده باشند.

نمونه گیری خوشه یی: جامعه خیلی بزرگ باشد ، آن را به خوشه های مختلف تقسیم و از هر خوشه نمونه ای را انتخاب می کنند.

هر ویژه گی عددی یک جامعه (اوسط و انحراف معیار) را پارامتر جامعه می گویند.

هر ویژه گی عددی یک نمونه (اوسط و انحراف معیار) را آمار می گویند.

متحول های تصادفی $x_1, x_2, \dots, x_n$ را یک نمونه تصادفی از متحول تصادفی x می گویند. اگر تابع مربوط آن به صورت $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdots f(x_n)$ تعریف شده باشد.

✓ روش های نمونه گیری به صورت عموم عبارت است از:

▶ نمونه گیری تصادفی

▶ نمونه گیری منظم

▶ نمونه گیری گروهی

▶ نمونه گیری خوشه یی

✓ کمیت نمونه را اوسط نمونه و کمیت جامعه را پارامتر جامعه می گویند.

توزیع اوسط نمونه:

اگر $x_1, x_2, \dots, x_n$ یک نمونه تصادفی از جامعه تابع احتمال $f(x)$ باشد، در این صورت توزیع

احتمال نمونه تصادفی عبارت است از:

x	x_1	x_2	$\dots\dots\dots$	x_n
$f(x)$	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	$\dots\dots\dots$	$\frac{1}{n}$

$$E(\bar{x}_n) = \mu \quad \text{اوسط متحول } \bar{x}_n$$

$$V(\bar{x}_n) = \frac{1}{n} \delta^2 \quad \text{وریانس متحول } \bar{x}_n$$

$$S_n^2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{وریانس نمونه}$$

$$E(S^2) = \delta^2 \quad \text{اوسط وریانس نمونه}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{اوسط نمونه}$$

$$\delta^2: \text{وریانس جامعه } S^2 \text{ وریانس نمونه}$$

قضیه لمیت مرکزی:

اگر از یک جامعه بزرگ N با اوسط متناهی μ و وریانس متناهی δ^2 یک نمونه تصادفی n تایی انتخاب

کنیم، در این صورت اوسط نمونه یعنی $\bar{x}$ دارای توزیع تقریباً نورمال با اوسط $\mu_{\bar{x}} = \mu$ و وریانس $\delta_{\bar{x}}^2 =$

$\frac{\delta^2}{n}$ و متحول تصادفی $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\delta}{\sqrt{n}}}$ دارای توزیع نورمال معیاری است. در حالیکه ضریب $\frac{N-n}{N-1}$ برای قیمت های بزرگ N به عدد 1 نزدیک شود در حقیقت لمیت آن وقت که $n \rightarrow \infty$ مساوی به یک است.

توزیع نمونه نسبت:

اگر x متحول تصادفی، n مجموعه آزمایش های برنولی و P احتمال موفقیت هر آزمایش باشد در این صورت آماره نسبت نمونه $\bar{P} = \frac{x}{n}$ و اوسط $E(x) = n \cdot P$ و وریانس متحول تصادفی $V(x) = n \cdot P \cdot q$ می باشد.

$$f(n\bar{P}) = \binom{n}{n\bar{P}} P^{n\bar{P}} (1-P)^{n(1-\bar{P})} \quad \bar{P} = 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1$$

$$\mu_P = E(\bar{P}) = P \quad \text{اوسط}$$

$$\delta_{\bar{P}}^2 = V(\bar{P}) = \frac{Pq}{n} = \frac{P(1-P)}{n} \quad \text{وریانس متحول تصادفی}$$

$$Z = \frac{x - nP}{\sqrt{nPq}} = \frac{\bar{P} - P}{\sqrt{\frac{P \cdot q}{n}}} \quad \text{توزیع های نورمال معیاری}$$

فصل پانزدهم

احتمالات

- یک اتفاق را می توان به سه درجه حتمی – ممکن و ناممکن و یا کلمات معادل آن پیش بینی نماییم. برای پیش بینی یک اتفاق ، یک واقعه ناممکن را با 0% و احتمال یک واقعه مطمئن یا امکان پذیر قطعی را با 100% یا 1 نشان می دهند. احتمال واقعه های ممکن بین اعداد 0 و 1 واقع می گردد.
 - زمان که چانس یک حادثه را به عدد بیان نماییم به نام احتمال یاد می گردد.
- چانس:** حوادث که از نگاه عددی قابل نباشد ، در پیش بینی برای آنها از کلمه چانس استفاده می گردد.
- احتمال:** هرگاه چانس یک اتفاق با اعداد و ارقام پیش بینی گردد ، به نام احتمال حادثه اتفاقی یاد میگردد . احتمال یک واقعه ناممکن صفر و احتمال یک حادثه مطمئن یک است.
- حادثه اتفاقی :** تجربه که نتیجه ممکنه آن هنگام اجرا معلوم نباشد به نام حادثه اتفاقی یاد میگردد.
- تجربه تصادفی:** یک فعالیت که تا هنوز نتایج آن معلوم نباشد و یا حادثه به صورت تصادفی اتفاق افتد به نام تجربه تصادفی یاد می گردد.

احتمال تجربی: احتمال که توسط انجام تجربه به شکل عملی یا از روی تعداد نتایج یک تجربه به دست می آید ، احتمال تجربی یاد می‌گردد.

احتمال نظری: احتمال که از روی فضای نمونه از نسبت حالت مساعد بر تعداد کل حالات یک تجربه به دست می آید ، احتمال نظری یاد می‌گردد.

- حادثه که هنوز نتایج آن به صورت قطعی معلوم نباشد و حادثه به صورت تصادفی اتفاق افتد تجربه تصادفی یاد می‌گردد . برای حوادث که تصادفی و یا اتفاق می‌افتد ، پیش بینی معنی ندارد.
- تمام نتایج ممکن یک تجربه تصادفی را به یک مجموعه یا Set نشان داده می‌توانیم که به نام فضایی نمونه یاد می‌شود.
- هر عنصر فضایی نمونه ، یک نتیجه ممکن همان تجربه تصادفی بوده که به نام حوادث اولیه یاد می‌گردد.

کثرت نسبی و احتمال:

- احتمال ، قبل از وقوع حادثه برای پیش بینی یک حادثه ، مورد استعمال قرار گرفته ، اما کثرت نسبی بعد از انجام یک تجربه به اساس ارقام به دست آمده از انجام تجربه اتفاقی حساب می‌گردد.
- احتمال تجربی برای یک حادثه اتفاقی مساوی به کثرت نسبی حادثه می‌باشد.
- چون مجموع کثرت نسبی تمام حالات مساوی به یک است ، بنابر این مجموع احتمال همه حالات نیز مساوی به یک است.
- ❖ کثرت نسبی یک تجربه عبارت از نسبت کثرت مطلق نظر به تعداد کل دفعات انجام یک تجربه می‌باشد ، اما احتمال یک حادثه قبل از وقوع آن پیش بینی می‌گردد.
- ❖ کثرت نسبی حادثه A را به $h(A)$ نشان داده و $0 \leq h(A) \leq 1$ می‌باشد.

چانس برابر و نا برابر در یک فضایی نمونه:

تا به حل با حوادثی روبرو بودیم که احتمال عناصر اولیه فضایی نمونه با هم یکسان بودند ، که بر اساس آن تعریف احتمال صورت گرفته است.

احتمال را معمولاً به P نمایش داده و $P(A)$ احتمال حادثه اتفاقی A می‌باشد.

هرگاه یک فضایی نمونه ، n عنصر داشته باشد ، در این صورت احتمال هر حادثه اولیه E (غیر قابل تجزیه) مساوی به $P(E) = \frac{1}{n}$ می‌باشد.

❖ حوادث که در انجام یک تجربه تصادفی یکی بر دیگری هیچ گونه برتری و یا هم شرایطی برای وقوع چانس بیشتر آن در یک فضایی نمونه نداشته باشند، بنام حوادث با چانس برابر یاد می‌گردد.

حادثه اتفاقی یک فضایی نمونه:

هر ست فرعی یک فضایی نمونه بحیث حادثه اتفاقی، همان تجربه می باشد، ست خالی یک حادثه اتفاقی ناممکن و S یک حادثه اتفاقی مطمئن می باشد.

هرگاه تعداد عناصری یک فضا نمونه مساوی به n عنصر باشند، تعداد مجموع حوادث اتفاقی آن 2^n است.

قواعد احتمال:

- احتمال حادثه اتفاقی E همیشه بین 0 و 1 است. $0 \leq P(E) \leq 1$
- هرگاه S یک فضایی نمونه باشد، $P(S) = 1$ ، حادثه اتفاقی S به نام حادثه مطمئن نیز یاد می‌گردد.
- برای حادثه ناممکن داریم $P(\emptyset) = 0$

- ① $0 \leq P(E) \leq 1$
- ② $P(\{a_1, a_2\}) = P(\{a_1\}) + P(\{a_2\}) \quad a_1, a_2 \in E$
- ③ $P(\emptyset) = 0 \quad P(S) = 1$

دیاگرام درختی:

- هر تجربه تصادفی را میتوان توسط یک دیاگرام که از نقطه شروع یک تجربه آغاز می‌گردد، به تعداد نتایج ممکن شاخچه ها را ترسیم، برای انجام مرتبه دوم، تجربه را بار دیگر مانند قدم اول، به هر نتیجه ممکنه شاخچه ها ترسیم می‌گردد، گراف مذکور را که مانند درخت شاخ و پنجه می کند، به نام دیاگرام درختی یاد میکنند.
- ✓ حاصل جمع احتمالات در هر نقطه انتشار شاخچه ها حتماً مساوی به یک است.
 - ✓ حاصل جمع احتمالات تمام حوادث اولیه نیز مساوی به یک است.
 - ✓ هر تجربه تصادفی از نقطه شروع به شاخچه های حوادث ممکن اتفاقی جدا تقسیم می شوند، با انجام مرتبه دوم آن، مانند قدم اول به هر نتیجه ممکنه بحیث نقطه آغاز بار دیگر شاخچه های حوادث اتفاقی گراف رسم می‌گردد، به همین ترتیب روش ادامه می یابد، احتمال هر حادثه اولیه به دست آمده، عبارت از حاصل ضرب احتمالات هر بند شاخچه های که از نقطه آغاز روی مسیر مطلوب ما را به انجام آن می رساند می باشد.

قاعده اول مسیر (حاصل ضرب):

احتمال هر حادثه اتفاقی اولیه در پایان هر مسیر معین در گراف درختی مساوی به حاصل ضرب احتمالات هر شاخچه از طریق مسیر مطلوب می باشد.

- ## اتحاد حوادث اتفاقی:


○ هرگاه حادثه B حادثه A را در بر داشته باشد، پس $A \cap B = A$ می باشد.

ست کلی و مکمله :

هرگاه S یک فضایی نمونه و A یک حادثه اتفاقی آن باشد:

$\bar{A}$ حادثه اتفاقی یی است که همزمان با آن حادثه A اتفاق نمی افتد.

برای هر حادثه اتفاقی A صورت می گیرد:



$$A \cup A' = S \quad (a)$$

$$P(A \cup A') = P(S) = 1 \quad (b)$$

$$P(A') = 1 - P(A) \quad (c)$$

اصل شمارش:

در ترکیب عناصر دو ست ، تعداد امکانات کلی مساوی به حاصل ضرب تعداد عناصر هر یک از مجموعه های ترکیبی می باشد.

اگر تعداد امکانات و یا عناصر یک ست m عدد و تعداد عناصر ست دیگر مساوی به n عدد باشد ، در این صورت هر دو انتخاب با هم به تعداد $m \times n$ شکل امکان پذیر می باشند.

بیان حادثه اتفاقی	ارائه بیان توسط ست	دیاگرام venn حادثه اتفاقی	احتمال حادثه
تمام حوادث اتفاقی S که شامل حادثه اتفاقی A نباشد ، مکمله A و یا حادثه عکس A	$\bar{A} = S - A$ $S = A \cup A'$		چون $P(S) = 1$ است $P(A) = 1 - P(A')$
حادثه اتفاقی A و حادثه اتفاقی B واقع می شود	$A \cap B$		$P(A \cap B)$
حد اقل یکی از حوادث اتفاقی A یا B اتفاق می افتد	$A \cup B$		$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

ترتیب یا *Permutation*:

تعداد ترتیب تکرار وجود دارد که با دقت با حالت بدون تکرار تعداد مجموعی آن برابر است با

$$P_n^k = \frac{n!}{k!}, (k \leq n)$$

عنصر را به P_n نشان داده (در صورتیکه تکرار مجاز و یا ممکن نباشد) مساویست به

$$P_n = n!$$

و اما در صورتیکه تکرار مجاز باشد، تعداد ترتیب های با تکرار مساوی به P_n^k بوده و چنین معنی می دهد که k مرتبه در n ترتیب $\binom{n}{k}$ بالای k : طرز نوشته ای $\binom{n}{k}$ که بالای k خوانده می شود، در حقیقت ضریب باینوم که عدد k آن توان باینوم را مشخص میکند عبارت است از:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k, n \in N, \quad 0 \leq k \leq n$$

تعداد ترکیب r شی از یک ست n عنصری عبارت از $C_r^{(n)}$ بوده و مساوی است به:

$$C_r^n = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad r \leq n$$

ترکیب *Combination*:

تعداد ترکیب های r یک ست n عنصری عبارت از ترکیب یا r Combination شی از n بوده که C_r^n نشان داده شده است.

نتیجه: در انتخاب یک گروه k عنصره از یک ست n عنصره بصورت کل بدو شکل صورت گرفته که در یکی آن ترتیب در نظر بوده اما در دیگر آن ترتیب مهم نبوده صرف ترکیب آنها مورد علاقه می باشد، بدین ترتیب برای ترکیب k شی متمایز تعریف زیر را در نظر می گیریم.

تعریف: تعداد ترکیب k عنصر از n عنصر یک ست که معمولاً به $C_{(k)}^n$ نشان داده و عبارت از تعداد امکانات $\binom{n}{k}$ ترکیب از n عنصر مختلف که به تعداد k عنصر آن را بدون ترتیب انتخاب مینماییم عبارت است از:

$$C_{(k)}^n = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad 0 \leq k \leq n$$

تبدیل *Variation*:

تعداد ترکیب های که ترتیب مسلسل k عنصر انتخابی مورد نظر از n عنصر در آن مطلوب باشد مساوی به $V_n^k = k! \cdot C_n^k = k$ تبدیل یا وریشن یاد می شود.

$$V_k^n = k! \cdot C_{(k)}^n = k! \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

تعداد امکانات		شکل انتخاب و یا هم آمیختن k عنصر از n عنصر
با تکرار $k \leq n$	بدون تکرار $k \geq n$	
$P_k^n = \frac{n!}{k!}$	$P_n = n! , n = k$	ترتیب <i>Permutation</i>
$C_k^n = \binom{n+k-1}{k}$	$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	ترکیب <i>Combination</i>
$V_k^n = n^k$	$V_k^n = k! \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!}$	تبدیل <i>Variation</i>

$$(a+b)^n = C_r^n \cdot a^{n-r} \cdot b^r = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k \quad \text{یادداشت:}$$

$$P_{\text{خط آمدن}} = \frac{\binom{n}{k}}{2^n} \quad \text{احتمال خط آمدن } k \text{ مرتبه عبارت است از:}$$

قضیه بینوم:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k \quad \text{انکشاف دو جمله یی } (a+b)^n \text{ عبارت است از:}$$

در تکرار n بار تجربه تصادفی دو جمله یی که هر حالت دارای احتمال P و $q = 1 - P$ بوده احتمال k بار پیروزی یعنی P از n بار بقیه حالت ها که ناکامی یعنی $q = 1 - p$ بوده داریم:

$$\text{احتمال } k \text{ بار پیروزی و انجام } n \text{ بار تجربه} = \binom{n}{k} P^k (1-P)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

طرز نوشته $B(n, P, k)$ طرز ارائه بینوم یا احتمال پرابلم برنولی یاد گردیده عبارت است از:

$$B(n, P, k) = \binom{n}{k} P^k (1-P)^{n-k}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^k (1-P)^{n-k} \quad \text{بنابراین انکشاف بینوم را میتوان به شکل زیر بنویسیم.}$$

یادداشت:

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0 \quad \text{I.}$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n \quad \text{II.}$$

احتمال دو جمله یی:

هر تجربه تصادفی را میتوان به یک تجربه که دارای دو حالت باشد میتوانیم تقلیل دهیم.

هر فضای نمونه و یک تجربه دو حالت دارد اگر یکی از حالت ها بحیث پیروزی دارای احتمال P در نظر گرفته شود حالت دیگر آن عبارت از حالت ناکامی بوده که دارای احتمال $1 - P$ می باشد. با تکرار n بار تجربه ،

احتمال k بار پیروزی یعنی P از این n بار که بقیه حالت ها که باخت یا شکست یعنی $q = 1 - P$ بوده داریم:

$$\text{احتمال } k \text{ بار پیروزی در انجام } n \text{ بار تجربه} = \binom{n}{k} P^k (1 - P)^{n-k} \quad 0 \leq k \leq n$$

فضا نمونه گسسته و پیوسته:

فضا های نمونه ای یک تجربه اتفاقی عبارت از مجموع معین یا محدود و یا نامعین یا غیر محدودی اند که یک دسته آنها قابل شمارش *Countable* و دسته دیگر آنها غیر قابل شمارش *Uncountable* می باشد. فضای نمونه که عناصر آن ها قابل شمارش و تشخیص اند به نام فضای نمونه گسسته یا غیر متصل و فضای نمونه که عناصر آنها قابل شمارش نیستند به نام فضای نمونه متمادی یا پیوسته یاد می گردند.

فضای نمونه پیوسته به صورت یک انتروال روی محور اعداد حقیقی و یا اشکال و احجام هندسی در مستوی و فضا می توانند ظهور نمایند.

حوادث هم چانس:

حوادث ساده اولیه که احتمال وقوع آنها در اثر انجام یک تجربه با هم برابر باشد، به نام حوادث هم چانس یاد می گردد، مجموع احتمالات حوادث اتفاقی هم چانس یک تجربه مساوی به یک است.

احتمال فضاهای پیوسته:

فضای نمونه پیوسته مجموع نامحدود یا نامعین از نقاط می باشد، که به شکل محور اعداد حقیقی، سطح در مستوی و یا احجام در فضا می باشد، چون نمایش این نقاط ممکن نیست بنابر این برای پیدا کردن نسبت احتمال از طول قطعه خط ها، سطوح اشکال و یا حجم اجسام استفاده مینماییم. معمولاً برای استفاده از محور اعداد یک متحول X ، قسمت از یک مساحت از دو متحول X و Y و بالاخره برای احجام از متحولین X, Y و Z استفاده به عمل می آوریم.

احتمال مشروط:

هرگاه A و B دو حادثه اتفاقی یک فضای نمونه S باشد، طوری که $P(B) \neq 0$ در این صورت احتمال

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

به نام احتمال مشروط حادثه اتفاقی A نظر به حادثه اتفاقی B یاد میگردد.

یادداشت:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)$$

$$P(A) = P(B) \cdot P_B(A) + P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$


$$P_A(B) = \frac{P_B(A) \cdot P(B)}{P(B) \cdot P_B(A) + P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)}$$

فورمول عمومی


$$P_A(B_i) = \frac{P_{B_i}(A) \cdot P(B_i)}{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + \dots + P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)} = \frac{P(A \cap B_i)}{\sum_{k=1}^n P(B_k) \cdot P_{B_k}(A)}$$

اصل حاصل ضرب:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

این مطلب را برای سه حادثه اتفاقی A, B و C به شکل زیر توسعه می دهیم.

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P_A^{(B)} \cdot P_{A \cap B}^{(C)}$$

فورمول *Bays*:

$$P_A^{(B_i)} = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i) \cdot P_{B_i}^{(A)}}{\sum_{k=1}^n P(B_k) \cdot P_{B_k}^{(A)}}$$

استقلالیت حوادث اتفاقی:

دو حادثه اتفاقی A و B که بالای همدیگر تاثیر گذار نباشند به نام حوادث اتفاقی مستقل یاد می گردند.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \dots\dots\dots \text{(اصل حاصل ضرب)}$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) \dots\dots\dots \text{(اصل حاصل جمع)}$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

فصل شانزدهم

منطق ریاضی

استدلال درک شهودی:

در بسیاری حالتها ، استدلال درک شهودی باعث تلاش و پیگیری حل مسأله و ایجاد انگیزه یی می باشد که باعث طرح پرسشهای جدید تری می گردد.

مثال: با استدلال درک شهودی به سهولت می توان حکم کرد که دو خط موازی همدیگر را قطع نمی کنند. چون در پذیرش این مسأله استدلالی بکار نرفته و در واقع یک احساس است که بر اساس آن این حکم صورت می پذیرد. این گونه نتیجه گیری را به نام «درک شهودی» یاد می نمایم.

مثال: یک نقطه در خارج دایره یی به قطر 4 واحد قرار دارد ، برای مطالعه فاصله آن از مرکز دایره ، که بیش تر از 2 واحد است ، نمی توان گفت که استدلال مذکور یک درک شهودی است، زیرا برای وضاحت این مسأله لازم است تا استدلال نمایم چون فاصله مرکز دایره از محیط آن 2 واحد بوده و نقطه در خارج محیط قرار دارد ، بنابر این فاصله

نقطه از مرکز دایره از محیط آن 2 واحد می باشد ، یعنی با در نظر داشت یک دانش و یا احساس غریزه یی بدون استدلال نمی توانیم مسأله را درک و صحت آن را قبول نمایم..

استدلال تمثیلی یا قیاسی:

قیاس و یا تمثیل ، در حقیقت نوعی از یافتن تشابه بین مفاهیم گوناگون است ، بنابر این تمثیلهای می تواند در ایجاد یک زمینه شهودی برای درک بسیاری از مفاهیم یا قضایای ریاضی بکار رود. استدلال تمثیلی به حیث یک ثبوت حساب نمی شود. اما زمینه ساز آن است.

مثال: ضرب المثل عامیانه «مار گزیده از ریسمان ابلق می ترسد» یک استدلال قیاسی است ، زیرا ریسمان ابلق با مار مقایسه شده است و بین آنها شباهتی دیده شده است.

مثال: از تمثیل و یا قیاس برای درک این حقیقت که حاصل ضرب یک عدد منفی در عدد منفی ، یک عدد مثبت و حاصل ضرب یک عدد منفی در عدد مثبت ، یک عدد منفی است ، استفاده می کنیم.

هرگاه لایق بودن یک شاگرد را (+) و برای نیست (-) را در نظر گرفته ، آنها را ترکیب نماییم ، در نتیجه داریم.

لایق نیست = منفی

$\overbrace{(-)} \quad \overbrace{(-)} \quad \overbrace{(+)}$

لایق است = مثبت

$\overbrace{(+)} \quad \overbrace{(+)} \quad \overbrace{(+)}$

نالایق نیست = مثبت

$\overbrace{(+)} \quad \overbrace{(-)} \quad \overbrace{(-)}$

نالایق است = منفی

$\overbrace{(-)} \quad \overbrace{(+)} \quad \overbrace{(-)}$

استدلال استقرایی:

استدلال استقرایی عبارت از روش نتیجه گیری کلی بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهدات است. در واقع تعمیم دادن خاصیتی در مورد یک نمونه کوچک به نمونه بزرگ است.

مثال: «مشت نمونه خروار است» به استدلال استقرایی اشاره می کند، زیرا در این مثال از یک نمونه کوچک ، نتیجه گیری مشخص در مورد کل مجموعه گرفته می شود ، در واقع بر پایه تعدادی محدودی از مشاهدات ، از مسأله نتیجه گیری شده است بنابر این استدلال استقرایی بکار گرفته شده است.

مثال: یک شاگرد به طور اتفاقی در چندین مرحله، سه عدد متوالی را با هم ضرب نموده که حاصل ضرب هر سه عدد متوالی مضرب 6 است، بناً شاگرد مذکور استدلال استقرایی را بکار برده و چنین حکم می کند که حاصل ضرب هر «سه عدد متوالی» مضرب 6 است.

استدلال ریاضی (بازی دو مینو):

هرگاه $P(n)$ حکمی در باره اعداد طبیعی n داده شده باشد، با مطالعه حکم در برابر $n = 1$ ، یعنی اگر $P(1)$ درست باشد، در قدم دوم از درستی $P(k)$ ، درستی $P(k + 1)$ را به حیث نتیجه درست به دست آوریم در این صورت ادعای $P(n)$ برای هر عدد طبیعی n نیز درست می باشد.

مثال: نشان دهید که $P(n) = 4^{2n} - 1$ برای هر عدد طبیعی، قابل تقسیم بر 5 است.

حل: ادعا برای $n = 1$ درست است، زیرا که:

$$n = 1, \quad P(1) = 4^{2 \cdot 1} - 1 = 16 - 1 = 15$$

دیده می شود که عدد $P(1) = 15$ بر 5 قابل تقسیم است.

برای هر عدد طبیعی k قبول می کنیم، که ادعای فوق صدق می کند، یعنی $P(k) = 4^{2k} - 1$ بر 5 قابل تقسیم است بنابر این چون بر 5 قابل تقسیم است، می توان آن را به شکل زیر نوشت:

$$P(k) = 4^{2k} - 1 = 5r$$

برای $n = k + 1$ نیز ادعای مذکور درست است، یعنی:

$$n = k + 1, \quad P(k + 1) = 4^{2(k+1)} - 1$$

اطراف رابطه را ضرب 4^2 نموده داریم که:

$$4^2 (4^{2k} - 1) = 5r \cdot 4^2$$

$$4^{2k+2} - 4^2 = 5r \cdot 16$$

$$4^{2(k+1)} - 1 = 15 + 16 \cdot (5r)$$

$$4^{2(k+1)} - 1 = 5(3 + 16r)$$

طرف راست رابطه فوق $5(3 + 16r)$ نشان می دهد که طرف چپ مساوات بر 5 قابل تقسیم است.

رابطه اخیر نشان می دهد که $P(k + 1) = 4^{2(k+1)} - 1$ نیز بر 5 قابل تقسیم است، چون از صحت $P(k)$ صحت

$P(k+1)$ را نتیجه گرفتیم، بنا بر این نظر به اصل استقرایی ریاضی، ادعای $P(n)$ در برابر هر عدد طبیعی n نیز درست می باشد.

مثال: با استفاده از استقرای ریاضی ثبوت کنید که رابطه زیر برای هر عدد طبیعی n درست است:

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

حل: برای صحت رابطه فوق، در برابر $n = 1$ داریم:

$$P(1) = 1 \times 2 = \frac{1(1+1)(1+2)}{3} = \frac{1 \times 2 \times 3}{3} = 2$$

$$\Rightarrow 2 = 2$$

بنابر این، رابطه در برابر $n = 1$ صحیح بوده، حال اگر برای $n = k$ صحت آن را قبول نماییم، مسأله را برای $k + 1$ به اثبات می رسانیم، بنابر این داریم:

$$n = k$$

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

فرضیه استقرا: با فرض رابطه بالا برای $P(n)$ ، با در نظر داشت $n = k + 1$ می خواهیم صحت رابطه را نشان دهیم بنابر این داریم:

$$n = k + 1$$

$$P(k+1) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + (k+1)(k+2) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2)$$

حکم استقرا: با در نظر داشت فرضیه استقرا داریم:

$$\begin{aligned} P(k+1) &= 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2) \\ &= \frac{k(k+1)(k+2) + 3(k+1)(k+2)}{3} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

بنابر این رابطه برای $n = k + 1$ نیز درست بوده ، و به این ترتیب رابطه $P(n)$ در برابر هر n از اعداد طبیعی درست می باشد.

استدلال استنتاجی:

با استفاده از حقایقی که درستی آن را در قدم نخست پذیرفتیم نتیجه عمومی تری را به دست آورده که به نام «استدلال استنتاجی» یا روش نتیجه گیری یاد می گردد به عبارت دیگر ، استدلال استنتاجی روش نتیجه گیری با استفاده از حقایقی است که درستی آنها را ثبوت و یا پذیرفته باشیم . وقتی از استدلال استنتاجی استفاده می کنیم . مطمئن هستیم که نتیجه همیشه درست است.

مثال :

12	7	4	یک عدد را به صورت اختیاری انتخاب کنید.
17	12	9	به عدد مذکور عدد 5 را اضافه کنید.
34	24	18	نتیجه را دو چند نماید.
30	20	7	از نتیجه حاصله ، عدد 4 را کم نماید.
15	10	7	عدد را به 2 تقسیم نماید.
3	3	3	عددی را که در اول انتخاب کرده بودید ، از عدد کم نماید.

نکته اساسی ، که به نظر می خورد این است که ما در حقیقت بر مبنای عباراتی که درستی آنها را قبول کرده ایم ، نتیجه بعدی را به دست آوردیم، این مسأله ما را مطمئن می سازد که با انتخاب هر عدد اختیاری نتیجه همیشه یکسان و مساوی به 3 می باشد.

استدلال مثال نقض:

هرگاه با مثال نشان دهیم که نتیجه کلی نادرست و یا غلط است ، نادرستی ادعا را نشان داده که به نام مثال نقض یاد می گردد.

مثال: برای اثبات مسأله کافی است نشان دهیم که اعداد x و y وجود دارد که غیر ناطق بوده ، اما مجموع آنها $(x + y)$ ناطق است . برای این منظور هرگاه دو عدد $x = 1 + \sqrt{2}$, $y = 1 - \sqrt{2}$ را انتخاب نماییم ، داریم:

$$x + y = (1 + \sqrt{2}) + (1 - \sqrt{2}) = 1 + 1 = 2$$

دیده می شود که حاصل جمع آنها مساوی به 2، که یک عدد ناطق است، می باشد در حالی که x و y اعداد غیر ناطق است. بنابر این، ادعا کرده نمی توانیم که مجموع دو عدد غیر ناطق همیشه یک عدد غیر ناطق می باشد.

برهان خلف یا ثبوت غیر مستقیم:

هرگاه با فرضیه یا قبولی عکس ادعای یک قضیه یا مسأله به نتیجه خلف برسیم، در این صورت فرض ما نادرست بوده که خلاف آن درست است این گونه استدلال را به نام برهان خلف و یا ثبوت غیر مستقیم می نامند.

یادداشت:

به خاطر بسپارید که برای استفاده از برهان خلف یا ثبوت غیر مستقیم، گامهای زیر را در نظر می گیریم.

قدم اول- فرض می کنیم ادعای مطلوب درست باشد.

قدم دوم- نشان می دهیم که این فرضیه نتیجه یی به دست می دهد که حقایق دانسته شده را نقض می کند.

قدم سوم- حالا که نتیجه به یک تناقض رسیده است معلوم می شود که فرضیه قدم اول نادرست بوده بنابر این مطلب باید درست باشد.

مثال: نشان دهید که اگر n^2 یک عدد جفت طبیعی باشد، n نیز جفت است.

حل: به خاطر ثبوت مسأله فرض می کنیم که با وجود جفت n^2 ، n یک عدد طاق است، پس می توان آن را به شکل

$$n = 2k + 1 \text{ نوشت، در حالی که } k \text{ یک عدد تام است، در نتیجه برای مربع عدد مذکور داریم:}$$

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k^2 + k) + 1$$

$$\Rightarrow n^2 = 4(k^2 + k) + 1$$

رابطه بالا نشان می دهد که n^2 یک عدد طاق است، در حالی که خلاف فرضیه بوده و در نتیجه فرضیه گرفته شده در بالای این که n یک عدد طاق است، نادرست بوده و به این نتیجه می رسیم که n نیز یک عدد جفت می باشد زیرا فرض طاق بودن آن ما را به نتیجه یی می رساند که n^2 نیز باید طاق باشد.

منطق ریاضی و استنتاج بیان:

هر جمله نمی تواند یک بیان باشد ، یک جمله می تواند پرسشی ، امری ، تعجبی ، و یا خبری باشد. هر جمله خبری درست یا نادرست است.

یادداشت:

اگر یک بیان را P بنامیم در این صورت طر نوشتن $P \equiv T$ برای بیان درست و $P \equiv F$ برای بیان نادرست استعمال می گردد. بر علاوه $\sim P$ نفی بیان P می باشد.

جدولی که در آن ارزیابی یک بیان صورت گرفته باشد به نام جدول صحت یاد می کنند بنابر این برای هر بیان P داریم:

$$P \equiv T, \sim P \equiv T$$

P	$\sim P$
T	F
F	T

ترکیب بیان ها :

اگر دو بیان p و q داده شده باشد ، در این صورت :

1. ترکیب $p \wedge q$ به نام ترکیب عطفی («و» منطقی) بیانات p و q یاد می گردد. علامه $(\wedge)$ به معنای (و) بکار رفته است.

2. ترکیب $p \vee q$ به نام ترکیب فصلی («ی» منطقی) بیانات p و q یاد می گردد. علامه $\vee$ به معنای (ی) بکار رفته است.

3. ترکیب $p \Rightarrow q$ به نام ترکیب مشروط و یا «اگر p پس q خوانده شده» یاد می گردد. و علامه $(\Rightarrow)$ نشان می دهد که p اساس ترکیب شرطی می باشد که p از q آن نتیجه می شود.

4. ترکیب $p \Leftrightarrow q$ به نام ترکیب مشروط دو طرفه و یا «اگر و تنها اگر q خوانده شده» یاد می گردد. و علامه $(\Leftrightarrow)$ نشان می دهد که p اساس ترکیب شرطی می باشد ، q از آن نتیجه گردیده و اگر q اساس ترکیب شرطی باشد ، p از آن نتیجه می گردد.

به این ترتیب ، ترکیب «اگر و تنها اگر» بیانهای p و q را در جدول صحت زیر ملاحظه می نمایم.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
-----	-----	--------------	------------	-------------------	-----------------------

T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

مثال: با تشکیل جدول صحت نشان دهید که $p \vee (p \Rightarrow q)$ همیشه درست است.

حل:

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \vee (p \Rightarrow q)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	T	T

از جدول صحت در ستون آخر مشاهده می نماییم که بیان $p \vee (p \Rightarrow q)$ همیشه درست است.